

# أهم الآفات الفقارية وطرق مكافحتها



د عبد العليم سعد سليمان دسوقي

قسم وقاية النبات - كلية الزراعة - جامعة سوهاج

## أهم الآفات الفقارية وطرق مكافحتها

**مقدمة:** تشمل الآفات الزراعية كل الكائنات التي تعيق جهود الإنسان في إنتاج الطعام والأعلاف ومحاصيل الكساء وعلى ذلك فإن الآفات تضم الحشرات والقراد والأكاروسات والقوارض والحشائش والكائنات الممرضة من فطريات وبكتيريا وفيروسات ونيماطودا وأيضا القواقع والطيور والطحالب وغيرها من الكائنات التي تسبب أضرارا ينتج عنها نقص في المحصول أو نوعية المنتج الذي يعد للتسويق وذلك أثناء تواجده في الحقل أو ما بعد الحصاد، ويعنى بالآفة هنا أي كائن حي يسبب أضراراً للإنسان وممتلكاته. أو أي كائنات ضارة بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة أو يمكن أن تسبب إزعاجاً للإنسان أو الحيوان

ومن أمثلتها: (1) الحشرات" البعوض - الذباب - القمل - الصراصير... الخ " (2) العناكب " الاكاروسات والعناكب " (3) الحشائش " الأعشاب التي تنمو بين المحاصيل وتؤثر على نموها عن طريق منافستها على المواد الغذائية المتوفرة بالتربة أو تتطفل على أجزاء النبات. أو نباتات مائية مثل ورد النيل " (4) الفقاريات " الفئران - خفافيش - الطيور... الخ " (5) لافقاريات " قواقع - نيماطودا" (6) الكائنات الدقيقة "البكتريا - الفطريات- الفيروسات - بروتوزوا"

و تعتبر الآفات الزراعية أحد أهم المشاكل الزراعية التي تسبب انخفاض الإنتاج الزراعي على المستوى المزرعي أو على المستوى الوطني، بل وتشكل أكبر خطر مباشر على الإنتاج الزراعي عندما تصير وباء أو عندما تنتقل إلى بيئة جديدة فيها ظروف بيئية ملائمة لتكاثرها وخلو هذه البيئة من العوامل الطبيعية التي تحد من نموها وانتشارها. وتلحق هذه الآفات أضراراً اقتصادية كبيرة وخاصة بين المزارعين الفقراء. فقد قدرت منظمة الأغذية والزراعة إجمالي الخسائر التي تسببها الآفات الزراعية على المستوى العالمي بحدود 50 % من إجمالي الناتج الزراعي العالمي، هذه النسبة ترتفع في بعض البلدان في بعض المواسم فتسبب خسارة تصل إلى 80% بل وتتعداها إلى 100 % لبعض الحقول التي لم تتخذ فيها أساليب الوقاية وخاصة مع هجمات الآفات العابرة للحدود مثل الجراد و الطيور المهاجرة وغيرها من الآفات العابرة. و سوف نركز في هذا الكتاب على الآفات الفقارية:

### ما هو الفرق بين الفقاريات واللافقاريات؟

الفقاريات واللافقاريات جميعها حيوانات. مصطلح فقاريات هو الأكثر تحديداً، فهو يصف جميع الحيوانات تحت هذه الشعبة (الشعبة هي مستوى من مستويات نظام التصنيف البيولوجي الذي يقسم الكائنات الحية على أساس قواسم مشتركة) ويميزها عن اللافقاريات التي تشمل بقية الحيوانات.

تتضمّن الفقاريات مجموعات الحيوانات مثل الثدييات، والطيور، والزواحف، والبرمائيات، وأسماك القرش، والأسماك العظمية، بينما تتضمّن اللافقاريات العديد من أنماط الحيوانات الأخرى مثل الحشرات، والرخويات، والعناكب، والديدان، والقشريات، وقناديل البحر.

وكما هو متوقع عند مقارنة شعبة محددة مع بقية الحيوانات، فإنّ اللافقاريات أكثر من الفقاريات، وتشير التقديرات إلى أنّ هناك حوالي 1300000 من الأنواع اللافقارية وأنواع أخرى كثيرة غير مكتشفة غالبيتها حشرات، هذا بالمقارنة مع 65000 نوع فقاري حوالي 5000 منها ثدييات.

الخصائص البدنية: السمة المميزة للفقاريات هي وجود عمود فقري مجزأ ومتحرك، وعند الإنسان تتصل الفقرات الفردية مع بعضها لتشكل العمود الفقري، بينما تفتقر اللافقاريات لهذه الميزة على الرغم من أنّ بنيتها قد تظهر مماثلة. ميزة أخرى مرتبطة بالفقاريات هي وجود الخياشيم، ففي الفقاريات الدنيا تمّ الحفاظ عليها أثناء التطور وهي تعمل بشكل تام، أمّا في الفقاريات العليا تشكّلت الخياشيم خلال التطور لكنها تحولت إلى بني مختلفة كالفكين أو عظام الأذن.

بالإضافة إلى ذلك تُظهر معظم الفقاريات مجموعتين من الزوائد المتقرّنة وهذه أيضاً قد تتراجع وتختفي كما في الأفاعي، ولكن هذا ليس شرطاً في الفقاريات.

#### التناظر:

فرق رئيسي بين الفقاريات واللافقاريات هو التناظر الذي تظهره أجسامها، فجميع الفقاريات ذات تناظر ثنائي جانبي، ومعنى ذلك أنّها تُظهر شكل خارجي متماثل ومعكوس في الجانبين الأيمن والأيسر، أمّا الأعضاء الداخليّة فهي ليست متناظرة بالضرورة.

بينما في اللافقاريات يمكن أنّ يظهر التناظر بشكل قطري: يظهر الحيوان جهتين علوية و سفلية واضحتين لكن لا يظهر جهة يمينى أو يسرى، أو بشكل كروي: لا يظهر الحيوان جهة سفلية أو علوية واضحة ولا يظهر أيضاً جهة يمينى أو يسرى، أو بشكل ثنائي، وفي بعض الحالات كما في الإسفنج البحري أو الرخويات قد تظهر الحيوانات عدم تناظر.

#### الحجم:

كما أنّ هناك فرق آخر ملحوظ بين الفقاريات واللافقاريات وهو الحجم المتوسط، هناك بعض اللافقاريات الكبيرة مثل قنديل البحر العملاق، ولكن غالبيتها صغيرة وأصغر بكثير من الفقاريات.

فالعمود الفقري في الفقاريات هو المفتاح الذي يسمح لها بأنّ تنمو لأحجام أكبر بكثير، ويسمح الهيكل العظمي الداخلي الموجود حول العمود الفقري للأجهزة المتخصصة المطلوبة لدعم الجسم كبير الحجم مثل الجهاز التنفسي أو الهضمي بالتطور بدرجة كبيرة.

أما اللافقاريات فهي محدودة النمو وبسيطة ولن تكون قادرة على زيادة حجمها بشكل كبير، كما أنها تفتقر إلى النظم الداعمة التي تسمح لها أن تنمو وتكبر، فعلى الرغم من أن بعضها قد طور بعض الأنظمة البديلة التي سمحت لها بالنمو نسبياً، لكنها لاتزال محدودة مقارنة بالفقاريات. فقد طوّرت الحشرات والقشريات هيكلاً خارجياً يؤمن الحماية لأجهزتها الداخلية، كما يسمح بارتباط الأجهزة اللازمة للحركة، ولكن على كل حال، يسمح هذا الهيكل الخارجي بالنمو لنقطة معينة، إلى الحد الذي تصبح فيه الأجهزة اللازمة لتحريك الحيوان أكبر من أن تتسع ضمن الهيكل الخارجي. أما الفقاريات بوجود الهيكل الداخلي والعظام يمكنها أن تتطور لأحجام أكبر بكثير.

الفقاريات Vertebrate، وهي شعبة من الحيوانات لها عمود فقري وجمجمة، وتشمل الأغلبية العظمى من شعبة الحبليات نحو 64,000 نوع موصوف. تتراوح أحجام الفقاريات الموجودة من أصغرها كالضفدع من نوع ( Paedophryne amauensis ) الذي يبلغ حجمه 7.7 ملم، إلى الحوت الأزرق الذي يصل حجمه إلى 33 متراً. تشكل الفقاريات حوالي 4% من مجموع أنواع الحيوانات؛ والباقي من اللافقاريات التي تفتقر إلى العمود الفقري. ولعظم الفقاريات عمود فقري مكون من عظام تسمى فقرات. ولكن ليس لبعضها الآخر، كأسماك القرش مثلاً، عمود فقري عظمي. كما إن عمودها الفقري مكون من غضروف (نسيج شمعي). وتتميز كل الفقاريات بجسم ثنائي التماثل، وهذا يعني أن الجانب الأيسر من جسمها يشابه جانبها الأيمن. ويقسم جسم الفقاريات عادة إلى رأس وجذع. كما أن للفقاريات البرية الأعلى رتبة عنقاً. وينقسم جذع الثدييات، وهي حيوانات تتميز بغدد لبنية لإطعام صغارها، إلى صدر وبطن. وللفقاريات زوجان اثنان فقط من الأطراف.

تشمل الفقاريات اللافكيات والفكيات، التي تشمل الأسماك الغضروفية) القرش والشفنين (والأسماك العظمية. والنوع الفرعي للأسماك العظمية المعروفة باسم لحميات الزعانف تشمل رباعيات الأرجل والتي تنقسم إلى البرمائيات، الزواحف، الثدييات، والطيور.

وسوف نقوم بالقاء النظر على أهم الآفات الحيوانية الفقارية وهي ( القوارض- الخفافيش- الطيور-

الزواحف)

## 1- القوارض

مقدمة: تعتبر القوارض Rodents (الفئران) من أكثر الآفات ضرراً للمحاصيل الزراعية القائمة، الحقول والمخازن ومزارع الإنتاج الحيواني بالإضافة إلى الأضرار التي تحدثها بالمنزل والمباني والأجهزة والكابلات

الكهربائية و غير ذلك.. مما يؤدي الي تعطل الإنتاج أو التأثير علي الدخل من ناحية و من ناحية أخرى فهي تقوم بنقل الكثير من الامراض لكل من الإنسان والحيوان، فأكثر ما يميز الفئران أن لها قدرة فائقة علي توطيد نفسها في جميع البيئات، فنسلها الفائق العدد و طباعها التي تمتاز بالدهاء والخبث تجعلها أكثر الحيوانات التي تسبب مشاكل للإنسان.

إن مشكلة الفئران في مصر ليست وليده العصر الحديث ولكنها موجودة منذ القدم و قد وجدت لها نقوشا علي جدران المعابد الخاصة بالقدماء المصريين، وهي مشكلة ليست قاصرة علي مصر فقط ولكنها تشمل معظم بلدان العالم وكان العامل المشترك لإنتشارها هو الاخلال بالتوازن الطبيعي نتيجة الإسراف في إستخدام المبيدات علي نطاق واسع بداية من النصف الاول من القرن الماضي.

وكلمة قوارض مشتقة من الكلمة اللاتينية Roder بمعنى القرص أو النحر لأن ما تفعله القوارض دائما القرص لأي شيء، الحشائش أوراق الشجر و قلف وخشب الأشجار وأكياس القمح المخزون وهي لا تقرض لكي تتغذي فقط ولكن عليها أن تفعل ذلك لكي تحافظ علي تآكل قواطعها الأمامية، حيث تتميز أفراد هذه الرتبة بأن أسنانها تتكون من قاطعين علويين وآخرين سفليين وعدم وجود أنياب كما يوجد من 3-6 أضراس Cheek molars ويغلف الأسنان مينا قوية خاصة الحواف القاطعة ويستمر نمو الأسنان طوال حياة الحيوان بصفة خاصة للقواطع إلا أن عادة أفراد الرتبة في القوارض تحفظ لهذه الأسنان طولها الطبيعي الذي يمكنها من التغذية ويحفظها من الهلاك بالجوع وفي حالة تركها تنمو بدرجة تعوق الحيوان من تناول الطعام، وتضم هذه الرتبة ما يزيد علي ثلث الثدييات في العالم ومعظمها ثدييات صغيرة الحجم وهي واسعة الانتشار في البيئات المختلفة حيث تضم الجرذان Rats والفئران Mice والسنجاب Squirrels و الأرانب Rabbits، و يقصد بكلمة فأر كائن صغير قارض يسرع الفرار عند الشعور بالخطر و يطلق علي الأنواع الصغيرة بالفئران و الأنواع الكبيرة منها الجرذان وباللغة العامية يطلق عليها الفئران.

### الأهمية الاقتصادية للقوارض

تعتبر القوارض من أخطر الحيوانات التي تؤثر في الإقتصاد العالمي فهي تسبب فقد وإتلاف المواد الصناعية والمحاصيل في الحقل والأجران والمخازن، وهي تستطيع أن تحيل عشرة أمثال ما تستهلكه من حبوب إلى مالا يصلح للإستهلاك الآدمي. وفضلا عن ذلك فان الفئران والجرذان تقرض كل ما يصادفها من غذاء أو ملابس أو مفروشات أو أثاث أو غير ذلك. وتنقسم الخسائر التي تسببها القوارض الي:

- الأهمية الاقتصادية للقوارض "من الناحية الزراعية"

1- مباشرة (فقد للمحاصيل في المخزن)

يستهلك الفأر غذاء يومي يعادل 10% من وزنه مما يسبب خسائر عالية لمخزون الحبوب والمواد التمويينية .



"أضرار الفئران المباشرة"

2- غير مباشر (قرض الحبوب - بول - ذبل - شعر - مسببات امراض)



"أضرار الفئران الغير مباشرة"

وهو عبارة عن التلوث الذي تحدثه للمخزون الغذائي + نمو بعض الفطريات الرمية على بقايا أكل القوارض. ونذكر أمثلة متعددة لبعض الخسائر التي تسببها الفئران:

- تلوث المواد الغذائية و تكاليف إصلاح أدوات الانسان المدمرة.




"تلوث الفئران للمواد الغذائية"

- إتلاف الأثاث الخشبي والبلاستيكي والأدوات المنزلية والملابس.



"إتلاف الفئران للخشب والادوات المنزلية"

- قرض مواشير الرصاص، والألومنيوم، وكل ما هو قابل للقرض.



"إتلاف الفئران لمواسيروكابلات الكهرباء"

- في مصر بلغت نسبة الإصابة في مصر عام 1982 في بعض محاصيل الحبوب النجيلية حوالي 30% و بلغت نسبة الخسائر في محافظة المنيا بمحصول القصب 50% عام 1982 وفي قرية طوخ الخيل مركز المنيا في نفس الفترة فإن الفئران كادت تقضي علي المحصول تقريبا.
- بالنسبة للمحاصيل الحقلية القائمة في الحقل فان الفئران تهاجمها في جميع مراحل نموها منذ وضع البذور في التربة حيث تقوم بالحفر عليها والتهاجمها مما يؤدي إلي إعادة زراعتها مرة ثانية وتأخير نضج هذه المحاصيل وبعد ذلك تقوم بتقطيع السيقان والتغذية عليها وتستطيع النباتات في هذه المرحلة ان تقوم بعمليات التجديد وتظهر ثمرات حديثة تعطي محاصيل ضعيفة عرضة للإصابات الحشرية وعندما تصل النباتات الي طور النضج فإنها تلتهم الحبوب حيث تقوم بتقطيع سنابل القمح والشعير والأرز والتغذية على الحبوب وفرطها في الأرض مما يؤدي الي ضياع حوالي 15% من المحصول قبل حصاده.

- ولقد وصلت نسبة الإصابة في عام 1982 في بعض محاصيل الحبوب النجيلية الي حوالي 30% وقيل ان المشروع المصري الألماني لمقاومة جرد الحقل في تولي مهامه في القضاء على الفئران . أما بالنسبة لمحصول قصب السكر فان الفئران تبدأ في مهاجمته منذ بدء الزراعة حيث تقوم بالنبش على العقل المزروعة والتهامها كما تقوم بمهاجمة النموات الحديثة والقضاء عليها وحين وصول القصب الي مرحلة نموه الأخيره وفي اوائل شهر اكتوبر فإنها تسكن داخل زراعات القصب وتعمل أعشاش من القش وجحور وتهاجم السلميات العليا والسفلي مما يؤدي الي ضياع نسبة كبيرة من المحصول تؤثر على كمية السكر الناتجة.
- وقد وجد أيضا في بعض المحافظات مثل المنيا أن نسبة الخسائر في بعض الحقول وصلت الي 50% حيث لوحظ عام 1982 في قرية طوخ الخيل بمركز المنيا أن الفئران قد قضت تقريبا على المحصول.
- بالنسبة لحدائق الفاكهة فان الفئران تهاجم قلف الأشجار ويقف سريان العصارة مما يؤدي الي موت النموات الحديثة كما تهاجم الثمار وتؤدي الي فقد نسبة كبيرة من المحاصيل فعلي سبيل المثال وجد أن هناك بعض مزارع العنب في محافظة بني سويف والمنيا قد قضت عليها الفئران تقريبا وذلك عام 1982 ، 1983 حيث كانت تقوم بتقطيع عناقيد العنب والتغذية عليها وتفريطها في الأرض وكذلك كان الحال في حدائق النخيل في محافظة الجيزة والفيوم وأيضا في مزارع الموالح والتفاح والكمثري كانت الخسارة كبيرة في العديد من المحافظات.



### "أعراض الإصابة بالقوارض في مشاتل الفاكهة"

- بالنسبة للخضر فان الفئران تهاجم المحاصيل وهي في طور النضج حيث كانت الخسائر عالية في محاصيل الطماطم والفراولة والبطيخ والشمام وغيرها.





"أعراض الإصابة بالقوارض على ثمار الكوسة"



"أعراض الإصابة بالقوارض على ثمار الخضروات"

- بالنسبة لمخازن الغلال والشون فان الفئران تهاجم الحبوب سواء كانت معبأة في زكائب أو مكومة على الأرض وتؤدي إلي نسبة فقد كبيرة قد تصل 5 % علاوة على تلوث هذه الحبوب ومنتجاتها ببول وبراز الفئران مما يفقدها الكثير من قيمتها الاقتصادية وقد تصبح غير صالحة للاستعمال الأدمي.



"أعراض الإصابة بالقوارض في مخازن الغلال"

- و يقدر الفقد الحادث في الحبوب و منتجاتها في مصر بحوالي 45000 طن أي ما يوازي 0.5 % من المستهلك و يصل هذا القدر الي 5.3 مليون طن في الولايات المتحدة

- الامريكية و هو ما يعادل 3 % من الانتاج ويصل الي 10.5 مليون طن وتقدر هيئة الصحة العالمية الفقد العالمي في تلك المواد بحوالي 33 مليون طن.
- وقد قدر انه لو ترك زوج من الفئران النرويجي ليتجول بحرية تامة داخل احد مخازن الحبوب فانه يستهلك حوالي 12 كيلو جراما خلال فصل الخريف و الشتاء علاوة علي انها تودع نحو 25000 بغيره (ذبل الفار) ، 1.5 لتر من البول و كثير من الشعر مما يسبب تلفا كبيرا لمحتويات المخزن.
- ففي القرن الماضي قد قدر الباحثون في مدينة بومباي بالهند ان مقدار ما تخزنه الفئران في جحورها كافي لغذاء 300000 مواطن من سكان المدينة البالغ عددهم في هذه الفترة 4.5 مليون نسمة.
- و في القرن الحالي تستهلك القوارض سنوياً أكثر من 42.5 مليون طن من الحبوب علما أن هذه الكمية تكفي لإطعام 130 مليون شخص. بلغت الخسائر في إحدى المدن الفلبينية إلى ما يقارب 90% من الإنتاج الكلي للرز و80% من الإنتاج الكلي للذرة وان 20% من الإنتاج الكلي للحنطة يفقد بسبب القوارض.



### "أعراض الإصابة بالقوارض في مخازن الغلال"

- و في مزارع الدواجن فان الفئران تهاجم عنابر البيض والتربية وتلتهم البيض وصغار الدواجن و الامهات وتقوم بنشر العديد من الامراض بها ، كما تهاجم ايضا مخازن العلف
- تخريب السدود الترابية، وقنوات الري نتيجة للأنفاق التي تحفرها القوارض تحت التربية.

- الإضرار بالغابات، حيث تقوم القوارض بالتهام البذور والبراعم وقرض الشتلات وتقشير الأشجار الكبيرة.
- احتمالية تقدير 15-20% من مواد الطعام المزروع لا تؤكل بواسطة الانسان و ذلك بسبب الضرر الناتج من الفئران




"أعراض الإصابة بالقوارض في مخازن الغلال"

- بالنسبة للمنشآت العامة والمصانع فان الفئران تقوم بقرض الأخشاب وأنابيب المياه والكابلات الكهربائية وصفائح الألمونيوم والحديد في مصانع الحديد والألمونيوم وكذلك تعمل على تلف الكثير من قطع الغيار في المطارات والمصانع.




"أعراض الإصابة بالقوارض في المنشآت العامة"

- إحداث حرائق بالمنازل أو المصانع، نتيجة لقيام الفئران بقرض أسلاك الكهرباء المغطاة، وقد يحدث الحريق نتيجة قيام الفئران بقرض أنابيب الغاز المطاطية. وفي المصانع ذات الضغط العالي تقرض الفئران أسلاك الكهرباء فتحدث الأعطال مما يسبب خسائر كبيرة في الإنتاج، ويكفي أن نذكر أن قيام الفئران بقرض عوازل الكابلات الكهربائية يشكل السبب الرئيسي لنشوب 15-20% من الحرائق في اليابان وهو رقم أعلنته شركة "ايكاري" أكبر شركات مكافحة القوارض هناك.



"أعراض الإصابة بالقوارض في المنشآت العامة"

- 25% من الحرائق تقريبا بسبب الفئران في الولايات الأمريكية عن طريق قرض أسلاك الكهرباء.



"أعراض الإصابة بالقوارض في اسلاك الكهرباء"

- وقوع حوادث قطارات مروعة، بسبب قضم أسلاك الكهرباء، مما يؤدي إلى تعطيل أجهزة الحاسوب التي تعتمد عليها حركة هذه القطارات.
- النقود و العمالة التي تبذل في عمليات المكافحة الفئران.

الأهمية الاقتصادية للقوارض من الناحية الصحية ( أهم الامراض التي تسببها القوارض )

من أهم الأمراض التي تسببها الفئران:

لم تكن الهواجس من انتقال الأمراض من القوارض للإنسان حديثة العهد، بل كانت قديمة جدا، فكان الفراعنة يرسمون القط كعدو للقوارض وصديق للإنسان ويتعاملون معه بقدسية عالية. كما أن هناك في العقائد الهندية القديمة بأن القوارض هي مخلوقات لها صفات الآلهة، ولا يزال الآن في معبد (دشنوك) في الهند يعيش أكثر من عشرة آلاف من الجرذان داخل المعبد، يقدم لها الطعام وتكرم، وهذا سلوك وثني واضح. أما في التاريخ

البابلي القديم فقد وجد العلماء أن سكان العراق القديم، كانوا يستخدمون القير والزفت في البناء، لا لربط مواد البناء ببعضها، بل لمنع دخول القوارض. أثبت العلم الحديث أن هناك مجموعة من الأمراض تنتقل عن طريق الجرذان، إما عن طريق تناول المواد الغذائية الملوثة بالبراز والأتربة التي تختلط ببول وبقايا القوارض، أو عن طريق التنفس، من خلال تلوث الهواء بذرات الغبار الملوثة ببقايا القوارض، أو عن طريق كائنات حية وسيطة كالقمل والبراغيث والأكاروسات التي تمتص دم القوارض وتعود لامتصاص دم الإنسان والحيوان. ومن الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان عن طريق القوارض.

### 1- الطاعون: Plague



#### "أعراض الإصابة بمرض الطاعون"


عرف الإنسان مرض الطاعون منذ أكثر من خمسة آلاف عام، ولكن إحصائيات الموتى منه التي دونت، كانت في عام 522 أو 542 ميلادي، حيث انتشر من مصر إلى ما حولها واستمر ستين عاما قضى خلالها على مائة مليون ضحية. كما أنه انتشر في أوروبا الغربية لمدة خمسة سنوات بين عامي 1345 و 1350م وأطلق عليه اسم الموت الأسود وراح ضحيته 43 مليون إنسان. وفي عام 1660م كان عدد الوفيات في مدينة لندن كل أسبوع عشرة آلاف. وفي موسكو عام 1700 كانت الوفيات مشابهة لوفيات لندن، وفي مارسيليا قتل عام 1720 ما يزيد عن 68 ألف إنسان. وفي اسطنبول قتل الطاعون عام 1802 ما يقارب 150 ألف نسمة. وفي الهند عام 1896 انتشر من مدينة بومباي واستمر عشرة سنوات فقتل 3.5 مليون إنسان.

في عام 1894 اكتشف عالمان أحدهما ياباني (Kitazato) والآخر فرنسي (Yersin)، لكن كل على حدا، ودون التنسيق فيما بينهما، بأن هناك علاقة بين الطاعون وبكتيريا اليرسينيا الطاعونية أو سابقاً باستوريل طاعونية (*Yersinia pestis* (*Pasteurella pestis*)) التي وجدت في دم وإدرار وبراز القوارض المريضة. وفي عام 1897 وجدت العلاقة للبرغوث كناقل للمرض من القوارض للإنسان. لقد وجد أن هناك 200 نوع من القوارض في العالم تنقل الطاعون، وأهمها الجرذ الأسود والجرذ النرويجي. وتستطيع جرثومة الطاعون البقاء حية لعدة شهور في أعماق الجحور حيث تتلاءم الظروف هناك.

يطلق عليه الطاعون الأسود (الموت العظيم أو الموت الفظيع أو الموت الأسود)، للإشارة إلى وباء الطاعون. الطاعون Plague مرض بكتيري معدي حاد ويُعد من مجموعة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. ويُصنف كأحد الأمراض المحجرية الخطيرة التي تسبب أوبئة في حالة عدم السيطرة عليها.

تسبب الطاعون في ذعر ورعب أكثر من أي مرض معدي آخر، وقد تسبب في وفاة ما يقرب من 200 مليون شخص، وقد وضع هذا المرض علامة لنهاية العصور المظلمة وسببا من أسباب تقدم البحث الطبي، وقد تسبب الطاعون في نفثى عدة أوبئة epidemics كما تسبب في ثلاثة أوبئة ضخمة وشهيرة pandemics شملت مناطق كبيرة وممتدة من العالم.

- الأول انتشر من منطقة الشرق الأوسط إلى حوض البحر المتوسط خلال القرن الخامس والسادس وتسبب في مقتل نصف سكان هذه المناطق.
- و الثاني ضرب أوروبا ما بين القرن الثامن والرابع عشر، وتسبب في وفاة حوالي 40% من شعوب أوروبا
- و الثالث بدأ من الصين عام 1855 ميلادي وانتشر إلى القارات الأخرى.



"وباء الطاعون"

وقد نجح ألكسندر يرسن Alexandre Yersin في عزل الميكروب المسبب للطاعون واستحدث علاجاً كمصل مضاد للمرض, antiserum وهو أول من توقع أن تكون البراغيث fleas والفئران هي سبب الوباء وذلك أثناء انتشار وبائي للطاعون عام 1894 وقد سُمي الميكروب العصوي الشكل المسبب للطاعون باسم *Yersenia pestis* وقد انتشر الوباء في كل القارات عدا قارة أستراليا.



وهو من أهم الأمراض التي تنتقل للإنسان تلعب القوارض الدور الرئيسي فيها مرض الطاعون الذي يعتبر من أخطر الأمراض حيث أهلك الملايين في العالم والذي أصيبت به مصر منذ عام 1899 - 1940 بصورة متقطعة ثم أقتصر حدوثه منذ عام 1941-1947 في بعض المناطق الساحلية ويسبب هذا المرض بكتيريا *Yersinia pestis* وينقلها أساسا برغوث الفأر الشرقي.

- الوضع التقسيمي لبرغوث الفأر الشرقي

شعبة مفصليات الأرجل Phylum: Arthropoda

طائفة الحشرات Class: Insecta (Hexapoda)

رتبة خافية الاجنحة Order: Siphonoptera

برغوث الفأر الشرقي *Xenopsylla cheopis*

الشعرة تخرج من امام العين



"برغوث الفأر الشرقي"



"بكتيريا *Yersinia pestis* العصوية"

ينتقل الميكروب إلى الإنسان من خلال عض حيوان مصاب مثل الفئران أو من خلال لدغ البراغيث التي تعيش على أجسام الحيوانات المصابة والتي تشمل أنواع متعددة منها الفئران و القطط و الكلاب المستأنسة و السنجاب و الأرانب و الجمال و الخرفان و يطلق على الحيوانات المصابة لفظ العائل للمرض

أما الحشرات الناقلة فيطلق عليها لفظ الوسيط وهو في العادة البراغيث التي تعيش على أجساد الفئران وتوجد حشرات أخرى من الممكن أن تنقل العدوى منها القمل والقراد. كما يمكن انتقال العدوى عن طريق الاستنشاق سواء كان الاستنشاق للرزاذ الصادر من الأشخاص المصابين بالطاعون الرئوي أثناء السعال، أو للهواء الملوث بالميكروب الذي يطلق أثناء حوادث إرهاب وفترة حضانة الطاعون بين 15-67 يوماً في الطاعون الذي يصيب الغدد الليمفاوية والنوع التسممي، وما بين 2-4 أيام في الطاعون الرئوي. الطاعون مرض معد حاد يتميز بحمى مرتفعة مع أعراض تسمم بالدم وصدمة مع هبوط في ضغط الدم وسرعة في النبض مع عدم انتظامه والقلق والإعياء والهلوسة والغيبوبة وكثيراً ما يحدث احتقان في ملتحمة العين وقد يصل إلى درجة النزف. ويظهر مرض الطاعون في ثلاثة صور وهي:

#### أ- الطاعون الدملي Baboeic plague

وهو أكثر شيوعاً وفيه تستقر الميكروبات في بعض الغدد الليمفاوية في الأرب والإبط والعنق ويؤدي هذا إلى التهاب هذه الغدد وتعمق نوعاً ويمتد الالتهاب لما حول الغدد فيتكون ما يشبه الدمامل وقد ينصرف أو يتقيح ويحتاج لفتح وقد تسوء حالة المريض ويتحول إلى طاعون تسممي أو طاعون رئوي.

#### ب- الطاعون التسممي Septicaemic plague

وهو نادر الحدوث عن الدملي وفيه تستمر الأعراض العامة السابق ذكرها دون ظهور التهاب الغدد الليمفاوية وتنتهي الحالة غالباً بالغيبوبة والوفاة.

#### ج- الطاعون الرئوي Pneumonic plague

وغالباً ما يحدث كمضاعف للطاعون الدملي أو التسممي . ويسمى في هذه الحالة طاعون رئوي ثانوي ونادر ما يحدث كإصابة أولى للمرض ويسمى طاعون رئوي أولى وأهم أعراضه المميّزة الالتهاب الشديد والبصاق المدمم. ويتأكد تشخيص الطاعون باكتشاف المسبب النوعي وهو باسيل الطاعون Yersinia في عينات من الدمامل أو الدم أو البصاق حسب الطاعون.

مستودع العدوي ومصدرها:

المستودع الطبيعي للطاعون هي القوارض البريه Wild rodents وتحدث بينها أو بينه دورية وقد تنقل العدوى. ومنها الفئران المنزلية في الريف أو الحضر، حيث تلتقي بالقوارض البريه ومصدر العدوى المباشر للطاعون الدملي هو البرغوث المعدي وللطاعون الرئوي الرزاذ والبصاق المتطاير من المرضى بطاعون رئوي.



**طرق نقل العدوى:**

عندما ينتشر الطاعون بين الفئران فإنه يؤدي إلى وفاة عدد كبير منها فتترك البراغيث أجسام الفئران وتبحث عن مضيف مناسب فتهاجم الإنسان ويتم نقل العدوى بالطاعون الدملي في الإنسان بواسطة لدغة برغوث الفأر المصاب بانسداد في معدته نتيجة تكاثر باسيلات الطاعون التي كانت موجودة في الدم الذي سبق وامتصه من فأر مريض بالطاعون ونتيجة لهذا الانسداد يرتد جزء من الدم ثانية محملاً بميكروبات الطاعون من معدة البرغوث إلى داخل جسم الإنسان. أما في الطاعون الرئوي فتتم العدوى من المريض إلى مضيف جديد بواسطة الرذاذ الرئوي 3 إلى 4 أيام أو أقل. والطاعون الدملي لا ينتقل من شخص لشخص إلا بعد تحوله إلى طاعون رئوي وتستمر البراغيث معدية لأيام وأسابيع وفقاً للظروف ولا تعيش البراغيث المصابة بانسداد في معدتها إلا من 3 إلى 4 أيام – أما الطاعون الرئوي فهو شديد العدوى وخاصة في الأماكن شديدة الازدحام وسيئة التهوية.

**العوامل التي تزيد من خطر التعرض للإصابة بالطاعون Risk factors**

- العيش في المناطق الريفية و خاصة الأماكن التي ينتشر بها الطاعون.
- العيش بأماكن بها فئران مصابة أو حيوانات أخرى من القوارض والتي تشكل عائلاً للمرض.
- المشاركة في أنشطة بالبراري مثل المعسكرات والتنزه سيراً على الأقدام لمسافات بمناطق الإصابة و النوم بهذه المناطق أو الصيد.
- التعرض للدغ البراغيث.
- مخالطة مرضى الطاعون.
- العمل بمجال الطب البيطري.

**أعراض وعلامات الطاعون**

- ارتفاع بالحرارة
- قشعريرة و ارتعاش
- آلام و أوجاع بالجسم
- ألم بالزور
- صداع بالرأس
- ضعف عام
- شعور عام بالمرض والإعياء
- ألم بالبطن
- شعور بالغثيان و حدوث قيئ
- إسهال أو إمساك و براز ذو لون أسود

- ألم بمنطقة المعدة
- سعال
- قصور بالتنفس
- تصلب بالرقبة
- عدم انتظام بضربات القلب و هبوط بضغط الدم
- تشوش الذهن و حدوث تشنجات
- وجود غدد ليمفاوية ملتهبة و متضخمة بالمناطق من الجسم القريبة من مواضع لدغ البراغيث
- في مناطق النزف بالجلد يتغير لون الجلد إلى اللون الأسود كما بالصورة



### "تشخيص الطاعون"

للتأكد من التشخيص يطلب الطبيب عمل اختبار مزرعة لعينات من الدم أو البصاق أو الغدد اللمفية . وقد يطلب الطبيب عمل أشعة على الصدر لمعرفة هل هناك إصابة للرتتين . وعند ثبوت التشخيص يحتاج المريض مساعدة الطبيب المتخصص في علاج الأمراض المعدية ، كما يتم إبلاغ المراكز المتخصصة في السيطرة والوقاية من الأوبئة والتي تهتم بأخذ عينات للفحص بالمختبرات وتتعبق مصدر المرض وتتعرف على منبعه وتقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمنع الخطر الكامن والذي قد يتسبب في انتشار وباء الطاعون.

### خطورة الطاعون

قد يصاب مريض الطاعون بالالتهاب السحائي meningitis كأحد المضاعفات وقد يصاب أيضا بهبوط شديد بضغط الدم والناشئ من العدوى بميكروب الطاعون septic shock كما قد يحدث موت للأنسجة و نزف أو التهاب الأغشية حول القلب pericarditis وكل ذلك قد يؤدي للوفاة.

### الوقاية من الطاعون

- يجب تجنب أماكن تواجد الحيوانات العائلة للمرض - وأهمها الفئران- ويجب التخلص منها ومن الحشرات الناقلة - وأهمها البراغيث- عند تواجد الطاعون.
- العزل الإجباري للمريض في أماكن خاصة في المستشفيات حتى يتم الشفاء التام.
- يجب تطهير إفرازات المريض ومتعلقاته والتخلص منها بالحرق.

- يتم تطهير أدوات المريض بالغلي أو البخار تحت الضغط العالي يتم تطهير غرفة المريض جيدا بعد انتهاء الحالة.
- يجب تدقيق ملاحظة المخالطين للمرضى وعند ظهور أي أعراض عليهم - مثل ارتفاع الحرارة أو تورم بالغدد الليمفاوية - يجب البدء في إعطائهم المضادات الحيوية كما يمكن إعطاء المخالطين المضادات الحيوية كإجراء وقائي. و في النهاية الطاعون مرض مميت ينتشر بصورة وبائية، ولكن من المهم أن يعلم الناس الاحتياطات الوقائية لأي مرض قبل حدوثه.

### علاج الطاعون

- حين يتوقع الأطباء أن أحد المرضى مصاب بالطاعون فإنهم يتخذون الاحتياطات اللازمة لعدم انتقال العدوى إليهم من لبس قفازات ومرايل و أقنعة ,كما تتخذ كل الاحتياطات الخاصة بعزل المريض ومنع انتقال العدوى إلى الغير، كما يتم الاستمرار في عزل المريض عن الآخرين لمدة يومين أو ثلاثة بعد إعطاء المضادات الحيوية أو حتى تزول العدوى.
- قد يحتاج المريض إلى أكسجين لمساعدته في التنفس.
- أغلب المرضى يعانون من انخفاض شديد بضغط الدم بسبب العدوى بميكروب الطاعون مما يتطلب متابعة المتخصصين لهم في وحدة العناية المركزة.
- يشمل العلاج أدوية متعددة أهمها المضادات الحيوية تأخذ تحت اشراف الاطباء المختصين

### هل يمكن استئصال الوباء

وهذا الوباء على خلاف الجدري ليس من الممكن إزالته أو القضاء عليه أو استئصاله، حيث يوجد الميكروب حيا في ملايين الحيوانات وبلابين البراغيث التي تعيش على أجسام تلك الحيوانات وأيضا لتواجد الطاعون في الصحراء و السهول أو الوديان والمرتفعات الجبلية و الغابات. وهذا المرض يصيب الحيوان العائل للمرض ويسبب وفاته وبعد وفاته تخرج البراغيث من جسمه لتكون معدية لمدة أشهر لاحقة.

- وفي الولايات المتحدة يصاب كل عام حوالي 18 شخص بالطاعون وتكون أغلب هذه الحالات في ولايات الغرب الجنوبي مثل نيو مكسيكو و أريزونا و كلورادو و كليفورنيا و يرجع ذلك إلى وجود نوع من السنجاب بهذه المناطق وهذا السنجاب يسهل إصابته بميكروب الطاعون.
- وخارج الولايات المتحدة يصاب حوالي 1600 شخص كل عام ,ومعظم هذه الحالات تكون في تنزانيا ومدغشقر وبيرو وزائير وبورما والبرازيل وأوغندا والصين وفيتنام.

### -2 التولاريميا Tularemia



"أعراض الإصابة بمرض التولاريميا"

التولاريميا ويسمى أيضا ب (داء توليري- حمى الأرانب - حمى ذبابة الغزلان- الحمى المتماوجة deerfly fever) وهو أحد الأمراض المعدية النادرة تسببه بكتيريا الفرنسيسلة التولارية (*Francisella tularensis*) اكتُشِف عام 1911 بين السنجاب الأرضية و تشمل الأعراض الحمى وقرحة الجلد وتضخم الغدد الليمفاوية من حين لآخر، وقد يحدث نوع من الالتهاب الرئوي أو التهاب في الحلق.

يؤثر المرض بشكل رئيسي على الثدييات، وخاصةً القوارض والأرانب والأرانب البرية، على الرغم من أنه يمكن أن يصيب الطيور والأغنام والحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط والهامستر. وتعد القوارض والأرانب من أهم الخازنات للبكتيريا المسببة وينتشر هذا المرض في كل أنحاء العالم، وهو مرض مميت ، وأكثر فترات تناقله تحدث بين شهري حزيران/يونيو الى أيلول/سبتمبر وتستطيع البكتيريا المسببة للمرض أن تحتفظ بحيويتها بين 530.247 يوما، وأكثر الإصابات تحدث عند السكان القريبين من البساتين والمساحات المائية. تنتقل التولاريميا إلى البشر بطرق متعددة، من بينها لدغات الحشرات والقراد والتعامل المباشر مع الحيوانات المصابة وتتسم التولاريميا بأنها مرض شديد الخطورة والعدوى ويُحتمل أن يكون مميتًا، وعادة ما يمكن علاجه بفاعلية باستخدام مضادات حيوية معينة إذا تم تشخيصه مبكرًا تحت إشراف الطبيب المختص.

#### الأعراض

معظم الأشخاص المعرضين للإصابة بداء التولاريميا يمرضون عادة به في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام، على الرغم من أن الإصابة قد تستغرق مدة تصل إلى 14 يومًا. يوجد العديد من أنواع التولاريميا، ويعتمد

النوع الذي يصيبك على كيفية دخول البكتيريا إلى جسمك وموضع دخولها إليه. لكل نوع من التولاريميا مجموعة من الأعراض الخاصة به.

### \*\* التولاريميا الغدية التقرحية

وهذا النوع الأكثر شيوعاً من المرض . تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

- قرحة جلدية تتكون بموضع العدوى، تكون عادة نتيجة لدغة حشرة أو حيوان
- تورم الغدد اللمفاوية ووجود ألم بها
- الحمى
- قشعريرة
- الصداع
- الإرهاق

### \*\* التولاريميا الغدية

يعاني الأشخاص المصابين بالتولاريميا الغدية من علامات وأعراض التولاريميا الغدية التقرحية نفسها، لكن بدون قرح جلدية.

### \*\* التولارمية العينية الغدية

يصيب هذا النوع العينين وقد يسبب:

- ألم العين
- إحممرار العين
- تورم العين وخروج إفرازات منها
- قرحة على الجزء الداخلي من الجفن
- حساسية للضوء

### \*\* التولاريميا فموية بلعومية

عادةً ما تحدث نتيجة لتناول لحوم الحيوانات البرية التي لم يتم تسويتها بشكل جيد أو شرب ماء ملوث، ويصيب هذا النوع الفم، والحلق والجهاز الهضمي. تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

- الحمى
- ألم الحلق
- قرح الفم
- قيء
- إسهال
- التهاب اللوزتين
- تورم العقد اللمفاوية في العنق

**\*\* التولاريميا الرئوية**

يسبب هذا النوع من التولاريميا العلامات والأعراض التالية النموذجية في حالات التهاب الرئة:

- سعالًا جافًا
- ألم الصدر
- صعوبة في التنفس

يمكن أن تنتشر أشكال أخرى من داء التولاريميا إلى الرئتين.

**\*\* التولارمية الخطيرة**

يسبب عادة هذا النوع النادر والأكثر خطورة من المرض:

- حمى مرتفعة الحرارة
- إنهاكًا شديد
- قيئًا وإسهالًا
- طحالًا متضخمًا (تضخم الطحال)
- تضخم الكبد
- الالتهاب الرئوي

متى تزور الطبيب: إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لعدوى التولاريميا، لا سيما إذا لدغك حشرة أو قراد (اكاروس) أو تعاملت مع حيوان بري في منطقة ينتشر بها داء التولاريميا وتعاني حمى، أو قرحًا جلدية أو غدًا متورمة، فيتعين عليك زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

**الأسباب**

لا يحدث داء التولاريميا بشكل طبيعي في البشر ومن غير المعروف ما إذا كان ينتقل من شخص لآخر أم لا ومع ذلك يحدث داء التولاريميا في جميع أنحاء العالم، لا سيما في المناطق الريفية، لأن العديد من الثدييات والطيور والحشرات تصاب بالفرنسيسيلة التولارمية.

قد يعيش هذا الكائن الحي لأسابيع في التربة والمياه والحيوانات الميتة وعلى عكس بعض الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر عبر مسار واحد، فإن داء التولاريميا لديها عدة طرق للانتقال. تحدد كيفية إصابتك بالمرض عادة نوع الأعراض وشدتها. بشكل عام، يمكنك الإصابة بداء التولاريميا من خلال:

- لدغ الحشرات والاكاروسات. على الرغم من أن العديد من الحشرات تحمل التولاريميا، فإنه من المحتمل أن تنقل الذباب والغزلان المرض إلى البشر. تسبب لدغات القراد نسبة كبيرة من حالات التولاريميا غدية تقرحية.

- التعرض للحيوانات المريضة أو الميتة. قد تنجم التولاريميا الغدية التقرحية أيضًا عن طريق حيوان مصاب، غالبًا ما يكون أرنبًا أو أرنبًا بريًا أو فئران. تدخل البكتيريا إلى الجلد عبر الجروح

الصغيرة أو السحجات أو لدغة، وتشكل قرحة في مكان الجرح، قد يحدث شكل التولاريميا العينية عند فرك عينيك بعد لمس حيوان مصاب.

- البكتيريا المحمولة جواً. قد تصبح البكتيريا في التربة محمولة في أثناء البستنة أو البناء أو الأنشطة الأخرى التي تزعج الأرض. قد يؤدي استنشاق البكتيريا إلى تولاريميا رئوية. يعتبر عمال المختبر الذين يعملون على تولاريميا أيضاً عرضة لخطر العدوى المحمولة جواً.
- الطعام أو الماء الملوث. على الرغم من أنه غير شائع، فمن الممكن الإصابة بالتولاريميا من تناول اللحوم غير المطبوخة من الحيوانات المصابة أو شرب المياه الملوثة. تشمل العلامات قيئاً وإسهالاً ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي (تولاريميا فموية بلعومية). تقتل الحرارة الفرنسيسيَّة التُّولاريَّة، لذلك قم بطهي اللحم إلى درجة الحرارة المناسبة بحد أدنى 165 درجة فهرنهايت (73.8 درجة مئوية) ل اللحم لجعلها آمنة للأكل.

- الصيد ووضع الفخاخ. لأن الصيادين يتعرضون لدم الحيوانات البرية وقد يأكلون لحمها، فإنهم معرضون لخطر الإصابة بالتولاريميا.
- أعمال البستنة وتنسيق المناظر الطبيعية. يمكن أن يتعرض العاملون في أعمال البستنة وتنسيق المناظر الطبيعية إلى خطر الإصابة بالتولاريميا. فمن المحتمل أن يستنشق العاملون في البساتين البكتيريا التي تثار أثناء العمل في تنظيف الاعشاب و التربة .
- العمل في مجال الطب البيطري أو إدارة الحياة البرية. يزداد خطر الإصابة بالتولاريميا لدى العاملين في خدمات الحياة البرية.

### المضاعفات

- قد تكون التولاريميا قاتلة في حالة عدم معالجتها. تتضمن المضاعفات المحتملة الأخرى الآتي:
- التهاب الرئتين (الالتهاب الرئوي). قد يؤدي الالتهاب الرئوي لفشل تنفسي — حالة لا تأخذ فيها الرئتان ما يكفي من الأكسجين.
  - التهاب حول الدماغ والحبل الشوكي (التهاب السحايا). التهاب السحايا هو التهاب خطير يلحق بالسائل والأغشية (السحايا) المحيطة بالمخ والحبل الشوكي وقد يكون مميتاً في بعض الأحيان.
  - تهيج حول القلب (التهاب غشاء التامور). وهو تورم التامور، وهو الغشاء الرفيع المحيط بالقلب، وتهيجه. قد يتحسن التهاب غشاء التامور الطفيف بدون علاج، ولكن قد تتطلب الحالات الأكثر خطورة علاجاً بالمضادات الحيوية.
  - التهاب العظام (التهاب العظم والنقي). تنتشر بكتيريا التولاريميا أحياناً في العظام.

### الوقاية

لا يوجد لقاح متاح علنيًا لداء التولاريميا إذا كنت تعمل بمهنة محفوفة بالمخاطر أو تعيش في مكان يوجد به التولاريميا، فيمكن لهذه الإجراءات مساعدتك في خفض فرص العدوى:

- الوقاية من لدغ الحشرات والأكاروسات
- استخدم مواد طاردة للحشرات والأكاروسات ولكن اتبع تعليمات جهة التصنيع بحرص و استخدم طارد الحشرات باعتدال ثم افحص نفسك كثيرًا خشية وجود الحشرات وأبعدها فورًا إذا وجدت أي منها.
- توخى الحذر عند القيام بأعمال البستنة. يجب على القائمين بأعمال البستنة وعاملي المساحات الخضراء مراعاة ارتداء قناع للوجه عند حفر التربة أو إزالة الأعشاب الضارة أو تنظيفها أو قص الأعشاب.
- تعامل مع الحيوانات بحرص. إذا كنت تصطاد الأرانب البرية أو تتعامل معها، فارتدِ قفازات ونظارات واقية واغسل يديك جيدًا بالصابون والماء الدافئ بعد لمس الحيوان. اطه كل اللحوم البرية جيدًا وتجنب سلخ أو إعداد أي حيوان يبدو مريضًا.
- الوقاية من الحيوانات الأليفة. يمكن إصابة الماشية والحيوانات الأليفة بداء التولاريميا في حالة تناولها جزء من أرنب مصاب أو عند لدغها بواسطة قراد مصاب
- للمساعدة في سلامة الحيوانات الأليفة، تجنب تركها في الخارج دون إشراف وتزويدها بحماية ضد الحشرات والقراد ولا تسمح لها بالاقتراب من الحيوانات البرية أو الميتة.

### 3- اللشمانيا: Leishmaniasis

المسبب طفيل اولي (Protozoa) يسمى اللشمانيا Leishmania يتبع طائفة السوطيات الحيوانية اللشمانيا Leishmaniasis مرض جلدي معروف في العراق باسم (حبة بغداد)، منه الرطب والجاف، والمرض منتشر في ايران وآسيا الوسطى وروسيا. وتعتبر القوارض خازنا للطفيل لهذا المرض والإصابات السنوية فيها تزيد 40% وتنتقل الى الإنسان عن طريق اللسع في الأذان والمناطق الحساسة المكشوفة في الإنسان بواسطة الذباب.

تتطفل اللشمانيا على الخلايا للجهاز الليمفاوي للعديد من الفقاريات بما فيها الانسان و الزواحف والثدييات. التواجد عادة في الخلايا المبطنة للأوعية الدموية والطحال والعقد اللمفاوية حيث تؤدي الإصابة الى تمزق هذه الخلايا .

تعتبر اللشمانيا مرضا طفيلي المنشأ ينتقل عن طريق بعض الذباب ك ذبابة الرمل. وهي حشرة صغيرة جدا لا يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية لونها أصفر وتنتقل قفزا ويزداد نشاطها ليلا ولا تصدر صوتا لذا قد تلسع الشخص دون ان يشعر بها . وتنتقل ذبابة الرمل طفيلي اللشمانيا عن طريق مصه من



دم المصاب (إنسان أو حيوان كالكلاب و القوارض) ثم تنقله إلى دم الشخص التالي فينتقل له المرض ويزداد انتشارها في المناطق الزراعية و الريفية .

. تظهر الليشمانيا الجلدية بعد عدة أسابيع من لسعة ذبابة الرمل على شكل حبوب حمراء صغيرة أو كبيرة ثم تظهر عليها تقرحات ويلتصق على سطحها إفرازات متبسة ولا تلتئم هذه القروح بسرعة ، تكبر القرحة بالتدريج وخاصة في حالة ضعف جهاز المناعة عند الإنسان وتظهر عادة هذه الآفات في المناطق المكشوفة من الجسم . تتراوح مدة الشفاء من ستة أشهر لسنة . ومن اهم الانواع L. Tropica ليشمانيا تروبيكا الذي يسبب مرض الليشمانيا الخلوية التي تسمى قرحة الشرق Oriental Sore يسبب تقرحاً بالجلد وهو شائع في كثير من انحاء العالم و مصر و المخزن الطبيعي هو القوارض



"أعراض الإصابة بمرض الليشمانيا"

#### الوقاية والمكافحة

- الحيلولة دون وصول الناقل (ذبابة الرمل) للعائل انساناً كان او حيوان .
- مكافحة هذا الناقل في اطواره المختلفة بالمبيدات الحشرية .
- التخلص من مصادر توالده .
- الابتعاد إن امكن عن مخازن العدوى من الحيوانات البرية .
- مكافحة القوارض
- استعمال العقاقير للتخلص من الطفيل في مراحل المرض الاولى دون تأخير تحت اشراف الطبيب.

#### 4- التهاب الكبد المعدي

( داء البريميات- مرض اللبتوسبيرا- مرض اللبتوسبيروزيس ) Leptospirosis:

ينتشر هذا المرض في أنحاء عديدة من العالم. ويصيب الإنسان والقوارض

والمواشي والكلاب ويعيش ميكروب هذا المرض و اسمه ( Leptospira )

icterohaemorrhagiae في (كلى) الجرذان ويطرح مع الإدرار، فيصاب الإنسان إذا

ما لامس الماء أثناء السباحة في مناطق ينتشر بها المرض، أو من خلال غبار المخازن المتواجد داخلها الجرذان المصابة، أو تناول أغذية مرت عليها الجرذان. ومن أعراضه الحمى والقشعريرة وآلام الجسم والتقيؤ، وهناك أعراض أخرى غير مباشرة كاليرقان والتهاب السحايا وأنزفة الجلد المخاطية. ويجب التذكير بأن المواشي والخنازير والكلاب أكثر أهمية من القوارض في نقل المرض للبشر.

✓ مرض اللبتوسبيرا من أهم الأمراض المعدية المشتركة التي تصيب الحيوانات والإنسان والفئران والكلاب وتعتبر القوارض أهم العوائل الحيوانية الناقلة للعدوى عن طريق تلويث ماء القنوات والترع والبحيرات ويتميز المرض بحمى- بول داكن- صفراء- نزلة معوية – التهاب رمدي- وآلم عضلية وهزال. وقد سمي المرض بأسماء عديدة مشتقة من أعراضه التي يسببها  
حمى السبعة أيام  
الصفراء المعدية  
أو من البيئة التي تحيط بالمرض  
حمى المستنقعات حمى الطين  
حمى الحصاد  
حمى الفار  
وسمي بمرض ويل  
(نسبة للعالم الذي اكتشف مسبب المرض)  
(Weil's disease)  
وفي ذلك الوقت تم تسمية الميكروب باسم  
(*Spirochaeta icterohaemorrhagiae*).  
وبعد ذلك تم تعديل الاسم إلى  
(*Leptospira icterhaemorrhagiae*)

الانتشار في الطبيعة:

إن ميكروبات اللبتوسبيرا لها انتشار واسع في الطبيعة وتعتبر الفئران والحيوانات البرية هي العائل الحامل لهذا المرض.

## ✓ العوائل الناقلة للعدوى:

تعتبر كل الثدييات تقريبا قابلة للعدوى خصوصا الفئران بجميع أنواعها والكلاب والأرانب وحيوانات المزرعة وكذلك الحيوانات البرية مثل الوعل- الغزال-الشمبانزي- الأسد-والنمر. كما ينتقل المرض بالطرق المباشرة وغير المباشرة بالإنسان. ولكن يعتبر الفار النرويحي والذي يعيش في الأماكن الزراعية وعلى ضفاف الترع والقنوات هو أهم حامل للعدوى حيث ثبت إن 30-90% من أفرادها تكون حاملة للمكروب (ولا تظهر عليها أي أعراض) وتفرضه مع بولها لتلوث البيئة. أعراض المرض والصفة التشريحية:

أولا- الإنسان:

فترة حضانة المرض في الإنسان 7-12 يوما

ويمر المرض بمرحلتين

المرحلة الأولى:

ويكون الميكروب خلالها نشطة وتسمى هذه المرحلة التسمم الدموي البكتيري تدعى Septicemic or Bacteremic وتدوم من ثلاثة إلى سبعة أيام وتكون أعراض المرض تشبه أعراض الأنفلونزا وتتميز الأعراض بارتفاع درجة الحرارة- رعشة- صداع شديد ومستمر-آم حول العينين- عرق غزير وغثيان - التهاب رمدي مع تضخم للغدد اللمفاوية بالرقبة والزرور- مع ضعف عضلي واضح وآم بالبطن

- وفي نهاية هذه المرحلة يكون البول لونه اصفر داكن أو احمر مصفر أو بني داكن .

وهذه المرحلة يتكاثر الميكروب في الدم والسائل الشوكي للمريض .

المرحلة الثانية:

تسمى المرحلة المناعية

وتحدث مباشرة بعد فترة من 1-3 أيام بعد المرحلة الأولى

ويمكن أن تدوم في حدود شهر واحد وتحدث في هذه المرحلة أعراض المرض الأخرى

كالتهاب السحايا والتهاب أنسجة الدماغ والحبل الشوكي كما تزداد أعراض الصداع الشديد. وقد لوحظ

إن المعالجة بالمضادات الحيوية أثناء الأيام القليلة الأولى

تساعد على تثبيط سرعة انتشار الميكروب داخل الجسم ، أما في المراحل التالية تقل درجة كفاءة


المضادات الحيوية في العلاج. وهذه البكتيريا تؤدي إلى خسارة في الأرواح وموت بعض الأدميين نتيجة

مضاعفات الفشل الكلوي الحاد.

### العوامل التي تساعد على انتشار المرض لدى الإنسان

- 1- مستوى المعيشة المتداني في البلدان التي تنتشر بها أعداد كبيرة من القوارض
  - 2- تلوث الماء والغذاء بالبول الملوث بالبكتيريا
  - 3- ملامسة المياه الملوثة بخدوش الجلد والأغشية المخاطية
  - 4- نوع الأعمال التي يقوم بها الإنسان كالأطباء البيطريين والأشخاص الذين يقومون برعاية الحيوانات مباشرة وخاصة المصابة وعمال المناجم والذين يعملون في المجاري والمصارف .
  - 5- شرب اللبن الغير مغلي الملوث بالبكتيريا.
- ويجب التذكير بأن المواشي والخنازير والكلاب أكثر أهمية من القوارض في نقل المرض للبشر.

### 5- التيفوس:



"أعراض الإصابة بمرض التيفوس"

مرض التيفوس (Typhus) (الحى النمشية) هو واحد من مجموعة من الأمراض المعروفة التي تسببها أنواع مختلفة من بكتيريا الريكيتسيا (Rickettsia) يعرف التيفوس أيضا باسم "حى السجين"، إذ في عام 1759 -وبحسب تقدير السلطات- فإن حوالي 25% من السجناء الإنجليز قد ماتوا بسبب ذلك المرض؛ ومن هنا اكتسب هذا الاسم، ويعتقد أن غرف السجن القذرة والمكتظة ساهمت في انتشار القمل بسهولة بين السجناء.

وبعد عام، بدأ مصطلح "التيفوس" يستخدم لوصف هذا المرض، وهو مشتق من كلمة يونانية تعني "دخاني" أو "ضبابي"، تعطي انطباعا عن حالة الهذيان التي يختبرها المصاب بالمرض.

ويسمي بالحمي النمشية نسبتا الي طفح جلدي في الجسم كله تقريبا مع حبوب حمراء صغيرة بشكل نقاط بدون شكل محدد

### الأعراض

يبدأ التيفوس ملى شكل زكام قوي. ويبدأ ارتفاع الحرارة بعد أسبوع أو أكثر مع رجفة أو رعشة وصداع وألم في العضلات والصدر.  
-بعد مضي بضعة أيام على ارتفاع الحرارة يظهر طفح جلدي مميز لحى التيفوس، يبدأ في وسط الجسم ثم ينتشر بعد ذلك على الأطراف لكن الوجه والكف وبطن القدم تبقى خالية منه. ويبدو الطفح وكأنه رضوض صغيرة كثيرة.

-يدوم ارتفاع الحرارة مدة أسبوعين أو أكثر. ويكون التيفوس عادة خفيف عند الأطفال وشديد. عند الكبار في السن.  
-التيفوس الناتج عن القراد يسبب في كثير من الحالات التهابا واسعا ومؤلما في مكان اللسعة، يصاحبه انتفاخ وألم في الغدد اللمفاوية القريبة منه

### العدوى

تنتقل هذه الأمراض إلى البشر عن طريق بعض المفصليات (الحشرات) مثل: القمل (Lice)، والبراغيث (Fleas)، والعث (Mites)، والقراد (Ticks).



وقد تنتقل المفصليات المصابة من شخص إلى آخر مباشرة، أو يتم جلبها عن طريق نواقل كالقوارض والماشية وغيرها من الحيوانات.

وعندما تعض هذه الحشرات المصابة شخصا ما (للحصول على وجبة من دم الإنسان)، فإنها إما تحقن الضحية بسائل معد أو تترك وراءها برازها المليء بالبكتيريا التي تسبب التيفوس. وعند حك مكان العض يفتح الجلد ويسمح للبكتيريا بدخول مجرى الدم، فتتكاثر.

## الأنواع

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من التيفوس، وهذا التصنيف معتمد على نوع البكتيريا المسببة بالإضافة لجنس الناقل (مفصليات الأرجل):

أولاً. التيفوس الوبائي أو التيفوس المنقول بالقمل (Epidemic "or louse-borne" typhus)

تسبب في حدوث هذا النوع بكتيريا ريكتيسيا بروفاتسيكيا (*Rickettsia prowazekii*) التي يحملها قمل الجسم. يتواجد هذا النوع في جميع أنحاء العالم، ولكن عادة ما يوجد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وسوء الصرف الصحي، حيث تشجع هذه الظروف على انتشار القمل. وعادة ما تظهر أعراض التيفوس الوبائي بشكل مفاجئ وتشمل: الصداع الحاد، وارتفاع درجة الحرارة، والطفح الجلدي الذي يبدأ على الظهر أو الصدر ثم ينتشر، والتشوش والارتباك والهذيان، وانخفاض ضغط الدم، وحساسية العين للأضواء الساطعة، والألم الشديد في العضلات.

ثانياً. التيفوس المستوطن (Endemic typhus)

كان يعرف هذا النوع في السابق بتيفوس الفئران (*Murine typhus*). تسببه بكتيريا الريكتيسيا التيفوئيدية (*Rickettsia typhi*)، وتحملها براغيث الفئران. يمكن العثور على التيفوس المتوطن في جميع أنحاء العالم، خاصة بين الناس القريين من الفئران أو المناطق التي تعيش فيها الفئران. أعراض التيفوس المتوطن تستمر مدة 10-12 يوماً، وهي مشابهة جداً لأعراض التيفوس الوبائي ولكنها عادة ما تكون أقل حدة. وتشمل: السعال الجاف، والاستفراغ والغثيان، والإسهال.

ثالثاً. التيفوس الأكلالي (Scrub typhus)

هذا النوع سببه بكتيريا أورينتيا تسوتسوغاموشي (*Orientia tsutsugamushi*) ويحملها العث. وهذا النوع من التيفوس أكثر شيوعاً في آسيا وأستراليا وبنابوا غينيا الجديدة وجزر المحيط الهادئ. ويسمى أيضاً مرض تسوتسوغاموشي.

وتشمل الأعراض التي تظهر على الأشخاص المصابين بالتيفوس الأكلالي: تورم العقد اللمفاوية، والتعب، والتهاب الجلد في موضع لدغة، والسعال، والطفح الجلدي.

تشمل بعض مضاعفات التيفوس ما يأتي:

- التهاب الكبد.
- الزيف في الجهاز الهضمي.
- الالتهاب الرئوي.
- تلف الجهاز العصبي المركزي.
- الانخفاض في حجم الدم.

وقد يكون تشخيص التيفوس صعباً في بعض الأحيان، وذلك لتشابه أعراضه مع أعراض بعض الأمراض الأخرى، بما في ذلك: حمى الضنك والملاريا وداء البروسيلات (*Brucellosis*).

وتشمل الاختبارات التشخيصية لوجود التيفوس ما يأتي:

- خزعة الجلد: حيث تؤخذ عينة الجلد من مكان الطفح ليتم فحصها في المختبر والتعرف على البكتيريا المسببة له.
- الاختبار المناعي باستخدام الأصباغ الفلورية (Immunofluorescence test): وذلك للكشف عن التيفوس في عينات البلغم.
- صبغة الأنسجة المناعية (Immunohistological staining): يمكن لهذه الطريقة الكشف عن البكتيريا داخل الأنسجة المصابة، والتي عادة ما تكون أنسجة الجلد.
- اختبار الدم الذي يمكن أن تشير نتائجه إلى وجود العدوى.

### العلاج والوقاية

- يستعملون لقاحات أعدت خصيصاً للوقاية من هذه الأمراض.
- وللسيطرة على انتشار المرض خاصة في ظروف الانتشار الوبائي فإن العاملين في الحقل الطبي كثيراً ما يستخدمون المبيدات الحشرية، إذ يقومون برش الناس وملابسهم بهذه المبيدات التي تقتل الحشرات الحاملة للمرض
- يستخدم المضادات الحيوية والادوية اللازمة بعد اجراء الفحوصات المطلوب تحت الطبيب المختص
- العلاج المبكر بالمضادات الحيوية فعال جداً، والانتكاسات ليست شائعة عندما يلتزم المريض بجرعة العلاج.
- ويمكن الوقاية من التيفوس عن طريق الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة، وتجنب السفر إلى المناطق التي وقع فيها هذا المرض أو إلى البلدان المعرضة لمخاطر عالية بسبب نقص المرافق الصحية، وتجنب الاتصال بناوقل التيفوس كالقمل والبراغيث والقراد، وكذلك تجنب فضلات القوارض.
- وفي حال تم العثور على العدوى، يمكن اتباع تدابير خاصة للتخلص من النواقل، مثل: الاستحمام، وغلي الملابس، واستخدام المبيدات الحشرية.

### 6- السالمونيلا: Salmonellosis



## Salmonella infection

Almost any kind of food or beverage can carry the bacteria that causes salmonella infection, although meat and eggs the most are common sources.

Contaminated food or drink

### How salmonella progresses

Bacteria travel to small intestine, adhere to lining; begin life cycle

In severe cases, bacteria break through intestinal wall to bloodstream; can be deadly if not properly treated

© 2009 MCT  
Source: U.S. Food and Drug Administration, Current Medical Diagnosis & Treatment, Mayo Clinic

### Symptoms


Within 12-72 hours  
Nausea, vomiting, fever, diarrhea, abdominal cramps

4-7 days illness ranges from mild to severe; most people recover without treatment

Severe cases More likely with infants, elderly, people with impaired immune systems

### Treatment

Oral or injected antibiotics, usually for 2 weeks



## "أعراض الإصابة بالسالمونيلا"

السالمونيلا هي بكتيريا تعيش في الأمعاء الحيوانية والبشرية ويتم إراقمتها عبر البراز، ويصاب بها الإنسان من خلال تناول المياه أو الطعام الملوث أو أطعمة غير مطهية جيداً، ويصاب آخرون بالإسهال والحمى والتشنجات البطنية في غضون ثمانية إلى 72 ساعة. ويتعافى معظم الأشخاص الأصحاء خلال بضعة أيام دون علاج محدد. بعض القوارض تحمل بكتيريا السالمونيلا في الجهاز الهضمي الخاص بها، مما يسهل نقل مسبب المرض إلى الإنسان.

من أهم الأعراض التي تميز الإصابة بالسالمونيلا ما يلي:

تراوح فترة حضانة بكتيريا السالمونيلا من عدة ساعات إلى يومين، وتشمل العلامات والأعراض، ما يلي:

- غثيان.

- قيء.

- مغص.

- إسهال.

- حمى.

- قشعريرة.

- صداع الرأس.

- براز دموى.

وعادة ما تظهر العلامات والأعراض ما بين يومين إلى سبعة أيام، وقد يستمر الإسهال لمدة تصل إلى 10 أيام وقد يستغرق الأمر إلى عدة أشهر قبل عودة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي.

يضم جنس السالمونيلا حوالي 600 نوع من البكتيريا الممرضة للإنسان والحيوانات (المواشي و الخنازير و القوارض والطيور)، وتُعد أنواع هذه المجموعة من البكتيريا من مسببات التسمم الغذائي الذي يصل حد الإصابة المميتة. وتحدث الإصابة عن طريق تناول غذاء ملوث بتلك البكتيريا. وقد شخّصت القوارض



كناقل للمرض عن طريق البول والبراز الذي تضعه في الحقول والمخازن قرب المواد الغذائية. ودور فأر البيت هو أكثر خطورة من جرذان الحقل.  
ماهي طرق الوقاية من السالمونيلا؟  
يمكن تجنب الإصابة بالسالمونيلا، من خلال اتباع عدة طرق للوقاية منها غسل اليدين، تجنب استخدام المراحيض العامة، غسل اليدين بعد تغيير حفاظات الأطفال وكذلك بعد تنظيف الحيوانات الأليفة.  
ماهو علاج السالمونيلا؟  
يعتمد علاج مرض السالمونيلا على تناول أدوية التي تعمل على تخفيف الأعراض مثل المضادات حيوية تحت إشراف أطباء متخصصين.

### 7- حمى عضبة الجرذ (Rat bite fever)

كما يشير اسم المرض، الناتج عن تلوث الجروح بأنواع من الميكروبات من فم الفئران في حال أصبت بعضة من جرذ مصاب بالمرض.  
لذا من المهم التوجه إلى الطبيب في حال التعرض لذلك، بغض النظر عن ظهور هذه الأعراض أو عدمها:

- الحمى
- طفح جلدي
- صداع وألم في الرأس
- قيء
- ألم في العضلات.

### 8- التهاب السحايا والمشيمات اللمفاوي: Lymphocytic choriomeningitis

التهاب السحايا والمشيمات اللمفاوي هي عدوى يسببها فيروس التهاب السحايا والمشيمي، وتنتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض. الحاضن الأساسي للفيروس هو الفأر المنزلي، ولكن القوارض الأخرى قد تكون حواضن للفيروس. يشيع هذا الفيروس بشكل أساسي في الولايات المتحدة ولكنه لا يقتصر عليها؛ بل يمتد ليشمل أجزاء من أوروبا، وشرق آسيا، وأستراليا، واليابان.

- مرض فيروسي يصيب فئران المنازل، ولم تكتشف علاقة الفأر إلا من وقت قريب بعد أن عزلت فيروسات من أحشاء فأر المنزل، فوجد أن 50% من مسببات المرض تصل عن طريق فئران المنزل.

الإصابة بالعدوى عند الحوامل تؤدي أحياناً إلى إصابة الجنين بالتخلف العقلي، والاستسقاء الدماغي، والتهاب الشبكية المشيمي.

## نقل العدوى:

تنتقل العدوى إلى الإنسان بعد تناوله أطعمة أو مشروبات ملوثة بفضلات القوارض المصابة. من الممكن أيضاً نقل العدوى عن طريق تلوث الجروح بهذه الفضلات، أو إذا قام القارض بعض الإنسان، ولم تثبت إمكانية نقل العدوى من إنسان إلى آخر.

- يبدأ المرض بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ثم تظهر أعراض المرض بعد عدة أيام، حيث تبدو على المريض حالات عدم اتزان ردود فعله والخمول (النعاس) وأحياناً الشلل، يشفى أكثر المرضى بعد عدة أسابيع من إصابتهم ولكن هناك حالات مميتة. وتكون الإصابة به عن طريق مرحلتين أساسيتين تبدأ بالشعور بالغثيان والقىء والصداع وألم العضلات وقلّة الشهية، وتكون المرحلة الثانية من الإصابة بمزيد من تضرر العضلات والتهاب الدماغ.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى:

- هذه العدوى تصيب كل الأعمار ومن كلا الجنسين، ولكنّ الإصابات تتركز عند مربي القوارض
- تزداد حالات العدوى عند العاملين في المختبرات الطبية.
- من الممكن الوقاية عن طريق ارتداء الملابس المناسبة للعمل في المختبرات، واتباع الإجراءات الاحترازية للسلامة في بيئة العمل.

9- فيروس هانتا HantaVirus :

- هو فيروس خطير يصيب القوارض كالفئران وينتقل للبشر عن طريق ملامسته لبول القوارض أو لعابها
- يصيب فيروس هانتا الرئتين
- يسبب امراضاً قاتلة للإنسان مثل الحمي النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة فيروس هنتا الرئوية وكلاهما مميت للإنسان
- نسبة معدل الوفيات للمصابين تتراوح بين 30-50% وهي نسبة مرتفعة للغاية

أعراضه تبدأ تشمل أعراض الإصابة بفيروس هانتا:

التهاب المفاصل الروماتويدي المميت.

التعب وصداع.

الحمي.

ألم العضلات خاصةً في الفخذين والظهر والوركين وأقل من الكتفين.

الشعور بالدوار والصداع والقشعريرة والقىء والإسهال وآلام المعدة.

بين 4 إلى 10 أيام بعد المرحلة الأولى ، يمكن أن يصاب الشخص بضيق في التنفس ، وسعال ، وقد تمتلئ رئته بالسوائل. ثم تتحول الي الم عضلي وضيق تنفس يتحول لفشل حاد في الجهاز التنفسي يتطور الي استسقاء رئوي ثم الي الوفاة

- مصدره الفئران ولا يوجد علاج فعال حتي الان لفيروس هانتا ولكن يتم

استخدام علاجات داعمة للمناعة للمساعدة علي مقاومة الفيروس او

استخدام تهوية ميكانيكية للتنفس في الحالات الحرجة منه

- وطبقا للمراكز العلمية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن حالات "فيروس هانتا" نادرة، وتنتشر عادة في المناطق الريفية حيث توفر الغابات والحقول والمزارع موطنًا مناسبًا لمضيفات القوارض للفيروس.
- كذلك فإن المناطق المحيطة بالمنزل أو العمل التي قد تعيش فيها القوارض (على سبيل المثال، المنازل والحظائر والمباني الملحقة والمظلات) هي مواقع محتملة قد يتعرض فيها الناس للفيروس.
- وتنجم العدوى نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، ويمكن أن تحمله أنواع معينة من الجرذان والفئران..
- وأوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض أن كل سلالة من "فيروسات هانتا" مرتبطة بأنواع مضيضة من القوارض، وأن هذه الفيروسات تنتقل في ما يعرف بـ"الانتقال الجوي"، أي بواسطة الهواء المحيط، عندما تنتقل جزيئات الفيروس من بول الحيوان أو البراز أو اللعاب في الهواء وتصيب الفرد. وفي حالات نادرة، قد يصاب الشخص بفيروس هانتا، إذا عضه حيوان مصاب.

#### 10- السعار (داء الكلب):

في بعض الحالات نتيجة لعضة القوارض.

#### 11- التسمم الغذائي:

الذي يحدث نتيجة تلوث الغذاء ببراز القوارض التي تكون مصدر الإصابة بمسببات التسمم: الدوسنتاريا الباسلية والأميبية ومسببات التيفود عن طريق براز القوارض.

#### 12- الإلتهاب السحائي وشلل الأطفال نتيجة بعض الفيروسات:

#### 13- نقل بعض الأمراض الطفيلية

مثل الديدان الورقية من جنس Heterophus وديدان البلهارسيا من جنس Schistosoma والديدان الأسطوانية من جنس Trichynella spinalis التي لم يثبت وجودها في مصر كما

تنقل الفئران أمراض أخرى مثل Rickettsia pox وهي نوع من التيفوس يقوم حلم القوارض بنقلها للإنسان.


وفي كثير من الحالات تكون الفئران مصدر خطر على الصحة، لذا حاول الابتعاد عنها قدر الإمكان وتجنب تناول أي طعام قد تشك أنه ملوث بإفرازاته.

### فوائد القوارض

و بالرغم من كل هذه الاضرار التي تسببها الفئران علي اختلاف انواعها الا ان لها بعض الفوائد تلخصها فيما يلي:

1- تعتبر عنصر أساسي في السلسلة الغذائية الطبيعية حيث تكون الفئران غذاء لمعظم الحيوانات

البرية المفترسة



"السلسلة الغذائية"

تستخدم في اختبار الأدوية والعقاقير الطبية المختلفة و معرفة كفاءتها و اضرارها فهي تعتبر صاحبة الفضل في تطوير الأغلبية الساحقة من الأبحاث الطبية و التأكد من أمان الأدوية قبل تجربتها على البشر.



"اهمية القوارض في تقييم الادوية والعقاقير"


أسباب اختيار الفئران في معظم البحوث الطبية

تستخدم الفئران في الاختبارات السلوكية والحسية والشيخوخة والتغذية والدراسات الجينية، بالإضافة إلى اختبار الأدوية المضادة للرغبة القادرة على إنهاء إدمان المخدرات، كما أن استخدام الحيوانات في البحوث أمر بالغ الأهمية، ويساعد على فهم علي للأنظمة الطبية الحيوية، ويؤدي إلى اكتشاف أدوية وعلاجات مفيدة، ومن أهم أسباب إختيار الفئران في معظم البحوث الطبية هي:

- حجمها صغير، حيث يمكن الحفاظ عليها وحمايتها بشكل أكبر مقارنةً من باقي الحيوانات
  - الفئران لا تتأثر سلوكياتها بتغير البيئة المتواجدة في نطاقها بعكس غيرها من الحيوانات، فهي سريعة التكيف مع أي بيئة جديدة تتواجد في نطاقها، وهو ما يضمن للعلماء أن تكون نتائج تجاربهم صحيحة بنسبة كبيرة أيضاً لسهولة التعامل معها
  - يمكنها التكاثر بسرعة كما أن عمرها قصير من 2 إلى 3 سنوات، لذلك يمكن الوصول إلى تأثير العلاج و الأدوية على أجيال كثيرة من الفئران في فترة قصيرة.
  - يتم شراء هذه الفئران بسعرٍ رخيص، وكمياتٍ كبيرة، من قبل المتخصصين في بيعها للأبحاث، وتكون معظم الفئران المستخدمة في التجارب متطابقة وراثياً بشكل كامل تقريباً، وهذا ما يجعل نتائج التجارب أكثر نجاحاً
  - الفئران تتشارك مع البشر في العديد من الجينات (DNA)، و الكثير من الخصائص الوراثية، ومع تطور العلم تمكن العلماء من إنتاج جينوم للفئران يشبه كثيراً الجينوم البشري، و تسمى هذه السلالة باسم "فئران معدلة وراثياً" وهي بها جينات تشبه بشكل كبير الجينات المسؤولة عن إصابة البشر بالأمراض الوراثية.
  - للفئران خصائص بيولوجية وسلوكية تجعل بحوثها فعالة؛ لأن علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الوراثة مفهومة جيداً من قبل الباحثين، كما أن الفئران تولد طبيعياً بدون جهاز مناعي، وبالتالي يمكن أن تكون كنماذج لأبحاث الخلايا البشرية العادية والخبيثة.
  - الفئران والبشر معرضين للإصابة بالأمراض نفسها تقريباً، لأسباب وراثية كما أن الفئران يمكن التلاعب بها وراثياً لمحاكاة الواقع وإيجاد أسباب للأمراض التي تصيب البشر وتعتبر الفئران على نطاق واسع أفضل نموذج للأمراض الوراثية البشرية وتتشارك بنسبة 99٪ من الجينات الخاصة بها مع البشر
  - يتم تشريح الفئران بكل سهولة و ذلك لأن تركيب أجهزتها الداخلية أمر بسيط و يمكن تتبع مسار الأدوية في أجسامها ببساطة.
- واكبر دليل علي ذلك متابعة العالم بأكمله لاستخدام الفئران في معظم المعامل البحثية العالمية وسباق من الزمن لإجراء التجارب السريرية للبحث عن لقاح ضد "فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)" الذي أجتاح العالم من فترة قصيرة منذ ظهوره اخر ديسمبر 2019 بمدينة Wuhan الصينية، الذي تمكن من

اكتساح كل قارات الكرة الأرضية، وغزو معظم ما فيها من دول ومناطق وجزر من خلال حصد آلاف ارواح البشر في كل بقاع الأرض واصبح يهدد البشرية جمعاء بين عشية وضحاها فهو يعتبر اكبر ازمة صحية تعرض لها العالم طبقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، فيمكن القول بان حقوق الإنسان في عالم الحيوان أكثر أهمية من حقوق الحيوان بدليل موت فئران التجارب لأجل الإنسان!

## 2- تستخدم القوارض كأحد عناصر الاختبار البيولوجي الذي يستدل علي درجة التلوث البيئي



### "أهمية القوارض في تقييم درجة التلوث البيئي"

عن طريق استخدام القوارض كمؤشر بيولوجي لتقييم الأضرار التي تحدث للبيئة نتيجة عوامل التلوث و من المعلوم أن تلوث البيئة قد يكون سببا في حدوث تغيرات عديدة علي البيئة المحيطة من مزروعات وحيوانات برية التي سببها الانسان.

وتتلخص تلك المؤشرات الحيوية في الاتي

○ دراسة وتتبع الكثافة العددية للقوارض في المنطقة.

• دراسة التغيرات المورفولوجية مثل الظواهر الطفرية التي تحدث علي فراء الفئران.

• دراسات باثولوجية للقوارض مثل ( الكلية والرئة والكبد وغير ذلك) نتيجة وجود مواد سامة في البيئة.

• دراسة التشوهات النسيجية لبعض الاحشاء الداخلية مثل الخصية و القنوات المنوية في الذكور.

• دراسة مخلفات المواد المشعة نتيجة لإقامة محطات نووية في بعض البلدان و مدي ما تحدثه تلك المخلفات من تأثيرات علي الحيوانات بصفه عامة.

• دراسة تشوهات عظام الجمجمة.

## 3- تستخدم بعض الانواع الصحراوية في الزينة لجمال منظرها وهدوء طباعها



"القوارض الصحراوية"

4- بعض الشعوب في منطقة جنوب شرق اسيا يأكلون اجزاء منها و خاصة الارجل الخلفية



"القوارض كغذاء"

5- دبغ جلودها واستعمالها في بعض الصناعات مثل (استيك ساعة)

6- تستخدم في نشر الامراض الوبائية الخطيرة مثل الطاعون وقت الحرب بين افراد قوات العدو فتعمل علي أضعافه

7- تستخدم في الكشف عن المتفجرات

- تمكن مجموعة من العلماء من تدريب فئران على كشف رائحة المخدرات والقنابل وتنبية رجال الأمن. وذلك بتركيب أجهزة استشعار بيولوجية على الفئران المدربة، لتتمكن من تسجيل رد فعلها عند شم المواد المحظورة. وتسجل هذه الأجهزة التغييرات التي تحدث في دقات قلب الفئران وتنفسها، حسب ما ذكر. وترسل هذه الأجهزة المعلومات التي سجلتها إلى جهاز كمبيوتر، الذي يحلل بدوره هذه البيانات وينبه رجال الأمن. وقال أحد المسؤولين في إنه من الممكن أن توضع هذه الفئران عند نقاط التفتيش في المطارات لمساعدة رجال الأمن على اكتشاف المتفجرات.



"إستخدام القوارض اكتشاف المتفجرات"

#### 9- تدريب الفئران على ضبط الممنوعات

- تستعد شركة الامن العالمية لإحداث ثورة في عمليات الكشف عن الأسلحة والمخدرات والأموال المهربة عبر المطارات باستخدام فئران مدربة لهذا الغرض عن طريق إجبار المسافر على الوقوف في حجرة محكمة الإغلاق وتسليط شحنة من الهواء باتجاهه، ثم شطف الهواء باتجاه حجرة أقل حجما، حيث تكون مجموعة من ثمانية فئران في الانتظار. ومن المفترض أن تتضح نتيجة الفحص خلال ثمانى ثوان، حيث يضاء ضوء أخضر في حال عدم وجود ما يثير الشبهة، ويسمح للمسافر بمواصلة سفره.

أما إذا ظهرت رائحة مريبة لدى الفئران المدربة، فإنها تتجمع في إطار ما يعرف بالبلاغ الجماعى، وهو ما يؤدي إلى قرع جرس الإنذار.

#### 10- استخدام الفئران في الارصاد الجوية

- جرد الأرض الأكثر شهرة في الولايات المتحدة يتوقع حلول الربيع قريبا في احتفال تقليدي ينظم في الولايات المتحدة في الثاني من شباط/فبراير من كل سنة، توقع جرد الأرض (المرموط) الأكثر شهرة في البلاد حلول فصل الربيع قريبا.





"جرذ الارض (المرموط)"

### الوضع التقسيمي للقوارض

Kingdom: Animalia المملكة الحيوانية  
 Phylum: Chordata شعبة الحبلية  
 Sub phylum: Vertebrata الفقاريات  
 Class: Mammalia الثدييات  
 Sub class: Eutheria ذوات المشيمة  
 Order: Rodentia رتبة القوارض

ويتبع هذه الرتبة علي مستوي العالم 32 عائلة منتشرة منها في مصر 4 عائلات لها أهمية اقتصادية وهي تقسم القوارض الى مجموعه من العائلات بناء على مجموعه من الصفات المورفولوجية والتشريحية الهامة والتي منها:

#### • الصفات المورفولوجية الظاهرية External characters

##### 1. اللون

ويختلف اللون باختلاف الانواع المختلفة من القوارض وأنواع البيئات التي تعيش فيها ويتراوح لون الظهر من الرمادي الداكن والبني على الناحية الظهرية من الجسم ويتراوح بين اللون الابيض والرمادي على البطن ولا يمكن الاعتماد على صفة اللون بشكل أساسي في التصنيف وذلك لأن البيئة تؤثر على درجة اللون . ويتحكم في اللون ستة جينات يختلف اللون باختلاف عدد الجينات السائدة

##### 2. مقاييس الجسم وتشمل :

- أ- طول الذيل بالنسبة لطول الرأس والجسم معا. ويقاس الذيل من نهاية العمود الفقري وحتى نهاية جلد الذيل ولا يدخل في القياس طول الفرشة . اما طول الرأس والجسم معا فيقاس من بداية الأنف الى نهاية العمود الفقري.
- ب- طول الرجل الخلفية ويقاس من الكعب حتي نهاية اطول صباع قدم بدون المخلب
- ت- طول الأذن ويقاس من نقطة اتصال صوان الأذن بالرأس الى نهاية صوان الأذن
- ث- وزن القارض : حيث يشكل عنصر هام في التفرقة بين الفأر والجرذ حيث ان الفأر يقل وزن الحيوان البالغ فيه عن 100 جرام وان كان لا يتجاوز 30 جرام في بعض الانواع مثل الفأر السيسي *Mus musculus*. بينما يزيد وزن الجرذ البالغ عن 100 جرام.
- ج- عدد الوسائد القدمية *Foot pods* حيث ان معظم القوارض لديها ستة وسائد قدميه على اخص القدم الخلفية ماعدا *Water vole, Musk rat* فإن لها خمسة وسائد قدميه فقط
- ح- عدد حلقات الثدي في الإناث البالغة والموجودة علي الناحية البطنية والتي توجد في مجموعتين الأولى بالقرب من الارجل الأمامية والثانية بالقرب من الأرجل الخلفية ويختلف عدد هذه الحلقات باختلاف الأنواع فمثلا الجرذ المتسلق 3+2 والفأر المنزلي 2+3 و الجرذ النرويحي 3+3 وجرذ الحقل النيلي 2+2 و *Neosokia* 2+2
- وللحرص على الدقة يجب ان تؤخذ هذه المقاييس من الأفراد البالغة حتى تعطى مقاييس دقيقه لأن الأفراد الصغيرة تكون ذات ذيول وآذان اطول نسبيا من الأفراد البالغة. وبالرغم من كل الصفات الكلية المورفولوجية التي يمكن الاعتماد عليها في تصنيف الانواع الا انه قد يتطلب الامر دراسة الصفات الداخلية *Internal characters* مثل طول وعرض الجمجمة و مساحة ال *diastema* (الفجوة بين القواطع والضروس) وطول الفك ولأسنان العلوية وقطر مقلة العين و طول البوز وطول وعرض العظام الانفية وغير ذلك من الصفات الداخلية اذا تم الاضطرار الي ذلك فهي ياخذ بها في عمليات التصنيف.
- وفيما يلي عرض لأهم عائلات القوارض الشائعة:

#### 1- عائلة العضلان *Family: Muridae*

وتضم اهم اجناس القوارض ذات الاهمية الاقتصادية الكبيرة داخل جمهورية مصر العربية وهي

1- جنس *Arvicanthis niloticus* ( جرذ الحقل النيلي- فأر الحشائش- جرذ الغيط)

Field rat, grass rat, Nile rat, Kusu rat



### "جرذ الحقل النيلي"

- هو متوسط الي كبير قد يصل وزنه لا أكثر من 200 جرام
- طول الذيل أقصر من طول الجسم والرأس معاً
- الأذن قصيرة مستديرة ذات لون طوبي
- لون الفراء مبرقش (شعر اصفر+ اسود)
- لون البطن بيضاء تميل الي الرمادي
- الجهة الظهرية من الذيل عليها خط اسود من بداية الذيل الي نهايته
- يعيش هذا النوع في جحور يحفرها في باطن الأرض مفضلاً جسور الترع والمصارف ويهاجم الحقول.
- يفضل التغذية علي جميع محاصيل الحقل و النجيليات ويتغذي علي الحبوب و الخضروات والبذور وقصب السكر و قلف الاشجار و يلجأ أحيانا الي الهجرة داخل المنازل والمنشآت في حالة عدم وجود غذاء بالحقول
- إنتشاره
- ينتشر في معظم نواحي الدلتا و الصعيد و الساحل الشمالي ويعيش علي جسور الترع والمصارف والقنوات المائية و البتون وفواصل الحقول
- نشاطه ليلا ولكن في بعض الاحيان يري نهارا متجولا بين قنوات الري و الزراعات
- انسب فترات التكاثر له في شهري يونيو ونوفمبر حيث وجد ان 60% من الحوامل كانت في شهر اكتوبر، فترة الحمل 20 يوما و تبلغ الفئران بعد ثلاث شهور و تستطيع ان تعيش تحت الظروف الطبيعية ثلاث سنوات
- هذا الجرذ عدواني الميول، و لايمكن مسكه باليد حيث يقوم بعض الانسان اثناء ذلك

Rattus-2

و يقع تحت هذا الجنس نوعين هما

أ- الجرذ النرويجي *Rattus norvegicus*

ويسمى فأر النرويجي القذر، فأر المجاري أو الجرذ البني أو جرذ الأماكن الرطبة

Norway rat, Sewer rat, Brown rat

ينتشر في جميع أنحاء العالم، يتواجد بكثرة في المدن،

- أكبر أنواع الجرذان حجماً، إذ يتراوح وزنه ما بين (200 - 500 جم) وفي بعض الأحيان قد يصل لا  
كثير من ذلك

- قوي البنية ويعتبر اشرس انواع القوارض وفي بعض الاحيان قد يهاجم الانسان

- الذيل اقصر من طول الراس و الجسم معا ويوجد عليه حراشيف ونهايته غير مدببة وسميك

- الاذن قصيرة وسميكة ومغطاة بالشعر

- ذو رأس مدبب و انف مببط،

- الظهر لونه بني و البطن رمادية

- ذيل سميك طويل (15 - 21 سم) عار من الشعر مغطى بقشور، اقصر من طول الجسم و الرأس

معا، لونه رمادي مشوب باللون البني والبطن باهت، و قد يكون لونه أسود أو بنيا فاتحا، يتراوح

طوله بما في ذلك الذيل بين 32.5 و 46 سم،

- هو من الأنواع صانعه الأنفاق يفضل الأماكن الرطبة

- يحفر أنفاقه تحت سطح التربة على عمق غير بعيد من 30 إلى 40 سم، في المطاحن ومخازن

الغلال والمجاري ومخازن الآلات الزراعية، قدرته على التسلق محدودة ولكنه قادرا على العوم

شديد الحذر لأي تغير في البيئة المحيطة يفترس صغار الفئران

- يفضل التغذية علي المواد ذات المحتوي البروتيني الحيواني

- قطع البراز (البعيرات) متناثرة اسطوانية الشكل.

- يعيش من 2-3 سنوات، وتبدأ الإناث في التوالد بعد 3-4 أشهر وتتراوح مده الحمل بين 21-25 يوما

وتلد الأنثى 4-6 مرات في السنة وقد يصل عدد الولادات إلى 12 مرة ويصل عدد ما تضعه الأنثى من

صغار 8 في كل مره وتصل الصغار إلى تمام نضجها بعد 4 أشهر.

- انتشاره

ينتشر في معظم انحاء الجمهورية وخاصة الاماكن الرضبة كضفاف النيل و في الاماكن التي تتوافر فيها المادة العضوية مثل مزارع الالبان والدواجن والانتاج الحيواني كما ينتشر في الاسطبلات وينتشر في الدلتا و الصعيد ومدن القناة



### "الجرذ النرويجي"

ب-الجرذان المتسلقة *Rattus rattus*

- أصغر حجماً من الجرذ النرويجي قد يصل الي 250 جرام
  - الجسم رشيق
  - الذيل اطول من الجسم والرأس معاً
  - الذيل عليه حلقات غضروفية ونهايته مستدقة
  - الأذن طويلة نسبياً والبوذ مستدق والعيون أكبر من النرويجي ويعيش معيشة اجتماعية أيضاً ويقطن الأدوار العليا ويجيد التسلق أكثر من السباحة .
  - البطن بيضاء كريمي – رمادي- سوداء
  - الارجل طويلة بالنسبة للجسم
  - يفضل التغذية علي المواد ذات المحتوي السكري
  - انتشاره
- ينتشر في الموانئ و المنازل و الحقول و الحدائق علي مستوي الجمهورية في الوجه البحري والقبلي والساحلي و مدن القناة و يتغذي علي المواد المخزونة وعلي الحبوب

وتشمل الجرذان المتسلقة بمصر 3 أنواع هي:

- الجرذ المتسلق ذو البطن البيضاء (جرذ النخيل) R.r. frugivorus

الظهر لونه مائل للرمادي ، شعر البطن ابيض ينتهي بقمه صفراء او لون كريمي ويطلق عليه جرذ النخيل لان اغلبية مأواه التفضل ببناء عشوش بأشجار النخيل اذا توافر ذلك.



"جرذ النخيل"

الجرذ المتسلق ذو البطن الرمادية (الجرذ السكندري) R.r. alexandrines

الظهر اسود مائل للرمادي وشعر البطن لونه رمادي ويطلق عليه الجرذ السكندري



"الجرذ السكندري"

الجرذ المتسلق الأسود R.r. rattus

الظهر لونه اسود مائل للبي و البطن والاقدام سوداء تميل للرمادي ويطلق عليه (الجرذ ذو البطن السوداء Black rat ، فأر العض- جرذ المراكب- فأر السفن)



"الجرذ الاسود"

### 3 - جنس Mus

- أهمها الفأر المنزلي Mus Musculus واسمه الشائع House mouse

- فأر صغير الحجم قد يصل وزنه الي 30 جرام

- الذيل أقصر قليلا من طول الجسم والرأس معاً

- الاذن طويلة وشفافة

- البوز مدبب وقصير

- الجمجمة أكثر ضيقاً إذا ما قورنت بجمجمة الجرذان الصغيرة

البطن مائلة للرمادي والفرو بني احيانا يميل للرمادي والشعر ناعم من الظهر والبطن.



- نهاية الذيل مدبب

- يتغذي علي البذور ويفضل الحبوب ويأكل في الحقل محاصيل الحبوب والتجليلات

- يعيش هذا النوع ايضا في المنازل و الخيام ومخازن الغلال و الحدائق

انتشاره

يكثُر في الدلتا و الوجه القبلي و مدن القناة ويعيش اينما وجد الانسان في المنزل و في الحقل ويكثُر في مخازن الحبوب والدقيق.



"الفأر المنزلي"

### 4 - جنس Acomys

فئران حجمها ما بين الصغير و المتوسط ن يختلف لون الظهر ما بين اللون المحمر و البني او المسود تبعا

للنوع ، فروة الظهر شوكية الملمس ، الذيل عليه حلقات عريضة عليها اشواك ويقع تحت هذا النوع

الانواع التالية:

• الفأر الشوكي القاهري - Acomys cahirinus

واسمه الشائع Egyptian spiny mouse

- لون راحة اليد و اخمس القدم و الذيل غير مسودة

- أكبر حجماً من الفأر المنزلي قد يصل الي 40 جرام
- الأذن كبيرة مستديرة عارية والجمجمة ذات سطح منبسط
- لون الظهر اسود ويتميز بوجود شعيرات شوكية في الربع الاخير من الظهر ذات لون اسود او رمادي او بني شاحب(أردوازي) و البطن اردوازية اللون ويتميز باللمس الشوكي بالظهر وهو منزلي.
- الذيل اطول بقليل من طول الراس و الجسم معا
- الذيل عليه حلقات خشنه

#### انتشاره

ينتشر علي جانبي وادي النيل حتي اسوان و قناة السويس و الواحات البحرية و نادار ما يوجد في الزراعات ويتغذي علي الحبوب و البذور.



"الفأرقاهري الشوكي"

- *Acomys dimidiatus* الظهر لونه بني شاحب، الذيل ذو لونين
- *Acomys russatus* لون الظهر برتقالي محمر، لون البطن ابيض مصفر شاحب، لون اخمص القدم و راحة اليد و الذيل اسود، الذيل اقصر من طول الراس والجسم معا، الفروة الشوكية موجودة علي الراس و الظهر و الجوانب والسنام، الذيل غير ملون بلونين ويوجد عليه حلقات واشواك والاسم الشائع Golden spiny mouse
- *Acomys viator* الظهر بني غامق، البطن بيضاء
- *Avomys hunter* بني غامق، البطن بيضاء
- *Acomys helmyi* الظهر بني شاحب، الذيل لا يوجد عليه اللونين بوضوح

5-جرذ أبو عنف (التزوكيا) *Nesokia indica*

الاسم الشائع له *Bandicoot rat, Girodi, Abu Afan*

- جرد كبير يشبه النزويجي قد يصل وزنه لأكثر من 250 جرام لكن يختلف عنه في
- الذيل اقصر بكثير من طول الراس والجسم معا ونهايته مستدقة وعليه حلقات حلزونية ولكنه يتميز بالحراشيف التي توجد علي ذيله



- البطن كريهي والفرو لونه بني محمر او مائل الي البني
  - البوز غير حادة، و الاذن كبيرة عليها بعض الشعر
  - الاقدام لونها ابيض
  - الارجل قصيرة نسبيا
  - له القواطع العليا ممتدة للأمام
  - له رائحة الخاصة التي تفرزها غدد شرجية.
  - يعيش في الاماكن الرطبة المزروعة وغير المزروعة
  - انتشاره
- ينتشر في الجزء الشمالي الغربي في الدلتا ووادي النطرون و الواحات ويعتبر هذا الجرذ من الانواع الشائعة و المنتشرة في شرق اسيا و من الكائنات الضارة جدا بمحصول الارز



"جرذ ابو عفن"

و علاوة علي الانواع السابقة يوجد بعض الانواع الصحراوية المنتشرة في صحراء مصر الشرقية والغربية و شبه جزيرة سيناء و الاماكن المستصلحة حديثا و يوجد منها:

## 2- عائلة الجرابيع (Family: Dipodidae)

من اهم خواص هذه العائلة: يختلف الحجم بين الصغير و الكبير باختلاف الانواع وكذلك يختلف اللون من البني المسود الي البرتقالي ، الارجل الخلفية طويلة ، الساق و الرسغ بالرجل الخلفية مندمجة. الاصابع العاملة بالرجل الخلفية عددها ثلاثة، طول الذيل يساوي تقريبا مرة ونصف طول الجسم والراس معا و ينتهي بفرشاه سوداء اللون قمتها بيضاء و يوجد من اجناس *Allactaga, Jaculus* وسوف نقوم بشرح اهم الاجناس *Jaculus* ويتبعه الانواع الاتية:

### أ- الجربوع المصري الكبير (جاكلوس) *Jaculus orientalis*



### "الجربوع المصري"

ويتميز بالآتي:

- كبير الحجم قد يصل الي 150 جرام
- ارجله الخلفية طويلة تشبه ارجل الكنجاو
- الذيل اطول من طول الراس والجسم بكثير
- الذيل ينتهي بريشة من الشعر الابيض و الاسود
- هاديء الطباع
- لو الظهر بني برتقالي والبطن بيضاء
- يتغذي علي البذور و الحشائش الصحراوية الجافة وجذور النباتات

### ب- الجربوع الصغير *Jaculus jaculus*



### "الجربوع الصغير"

- صغير الحجم قد يصل الي 60 جرام
- لونه بين البرتقالي والبني الفاتح
- ينتشر هذا النوع في مصر بسيناء والجزء الشمالي من الصحراء الشرقية

تعيش هذه الانواع في جحور في الارض الصلبة علي عمق 2 متر و يوجد لها انفاق للهروب منها و تتغذي علي البذور و الحشائش الصحراوية الجافة و جذور النباتات

### 3- عائلة كريستيدي (الجربلس) Family Cricetidae

ينتشر معظم افراد هذه العائلة في الاراضي الصحراوية الحديثة الاستصلاح و خاصة في منطقة الصالحية و النوبارية و يتبع هذه العائلة الاجناس الاتية:

1- اذا كان شكل الذيل اسطواناني و اطول من طول الراس و الجسم معا

- اخصص القدم يغطيها الشعر كاملا و شعر البطن ليس له قاعدة رمادية Genus Gerbillus

- اخصص القدم تغطي جزئيا بالشعر و قاعدة شعر البطن لونها رمادي Genus Meriones

- اخصص القدم عارية والذيل ليس غزير الشعر Genus Dipodillus

- اخصص القدم عارية والذيل غزير الشعر Genus Sekeetamys

2- اذا كان الذيل سميك و اقصر من طول الراس و الجسم معا

- شكل الذيل عادي له قمة سوداء ، لون شعر البطن مصفر

Genus psammomys

- الذيل ياخذ شكل الهرهه بدون قمة سوداء ، لو شعر البطن ابيض Genus Pachyramys

و فيما يلي شرح لاهم الانواع:

أ- جنس الجربلس Gerbillus

1- جربوع الهرم Gerbillus pyramidum



"الجربلس"

- الحجم قد يصل الي 60-70 جرام

- لون الفرو برتقالي والارجل مغطاة بشعر

- طول الذيل اطول من طول الراس والجسم معا
- نهاية الذيل بها خصله من الشعر المائل الي الاسود
- ينتشر هذا النوع في سيناء و الكثبان الرملية و وادي النطرون والفيوم في المناطق الصحراوية
- 2- جربوع الصغير *Gerbillus gerbillus*
- صغير الحجم قد يصل الي 30 جرام
- 3- لون الفرو برتقالي مصفر او محمر و خاصة في المنطقة الظهرية
- 4- طول الذيل اطول من طول الراس والجسم معا
- 5- تتغذي الجرابيع علي بذور و جذور النباتات و الحشرات و تنتشر في المناطق الصحراوية و خاصة في منطقة سيناء.

ب- جنس الماريونس *Meriones*

صفاته:

- تتراوح اوزانه بين 30: 90 جرام
- غالبا ما يكون الذيل اقصر من الراس و الجسم معا ما عدا *Meriones libycus* فالذيل اطول
- لون الفرو مصفر او بني مصفر والفرو ناعمة
- البطن بيضاء
- يتغذي علي جذور النباتات و الحشائش الصحراوية واصبح الان ذو اهمية اقتصادية في المناطق الجديدة حيث يتغذي علي المحاصيل التي بها.
- ينتشر في سيناء و الصحراء الشرقية والغربية بالقرب من الاسكندرية



"الماريونس"

ويوجد منه في مصر عدة انواع هي

- *Meriones crassus* (Silky jird, Sundevalls jird)

الفروة من الناحية الظهرية ذات شعر ناعم طويل ولونه بني مصفر شاحب ينتهي بلون اسود، والبطن والاقدام الخلفية لونها ابيض ، الذيل ذلونين وينتهي بفرشاة واضحة

- يعيش هذا النوع في المناطق الساحلية و الوديان في سيناء و الصحراء الشرقية وتوجد الجحور بين الصخور و الاحجار حول المباني و الخيام و اكوام القش و حول الشجيرات، الجحور سطحية ذات فتحات متعددة ويعمل جحوره في الارض الصلبة.

-Meriones shawi

فئران ذات حجم كبير ، الفروة ناعمة ولونها بني مصفر من الناحية الظهرية مع وجود خط لونه مصفر او برتقالي علي الجانبين يمتد حتي الكعب، البطن لونها ابيض، الاذن ملونه، الذيل لونه باهت من الناحية الظهرية وياخذ لون القرفة من الناحية البطنية وينتهي بفرشاة لونها اسود.

-يعمل هذا النوع جحوره في الارض الثقيلة علي الساحل الغربي تحت الاشجار، وديع الطبع يمكن مسكه بسهولة، الجحور متعددة الفتحات.

ينتشر هذا النوع في مصر بالقرب من الاسكندرية و السلوم وليبيا و الجزائر والمغرب.

-Meriones libycus (Libyan jird) -الجيرد الليبي

فئران ذات حجم كبير ، لون الظهر اصفر غامق مع وجود خط برتقالي واضح علي الجوانب ، البطن لونها ابيض، الاذن غير ملونه، لون الذيل برتقالي من الناحية الظهرية وينتهي بفرشاه سوداء. هذا النوع عدواني الميول و من الصعب مسكة باليد ويعيش في اكوام الرمال

يعيش هذا النوع في الصحراء الغربية بالقرب من الاسكندرية و في ليبيا والعراق وسوريا والاردن واسرائيل وتوجد انواعه اخري مثل Meriones tristrami, Meriones sacramenta

خ- جنس السامومي

الفئران من النوع القصير الممتلئ ، يختلف لون الظهر من البرتقالي المحمر الي الاسود، لون البطن والجوانب مصفرة، الاذن صغيرة ومدورة ، طول الذيل اقصر من طول الجسم والراس معا وعلية شعر كثيف ينتهي بفرشاه لونها اسود، راحة اليد خالية من الشعر ، اخمص القدم عليه بعض الشعر



"جرذ السامومي"

و يوجد منه فار الرمل السمين واسمة الشائع الجرادة او فار الرمل السمين (fat sand rat jarade) و  
يمتاز بما يلي :

- الجسم من النوع القصير الممتليء
- لون الظهر من البرتقالي المحمر الي الاسود
- طول الذيل اقصر من طول الراس والجسم وعليه شعر كثيف
- يتغذي علي مواد البيئة الصحراوية
- ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من الدلتا و في شمال الصحراء الغربية

4- عائلة الاسبليكس Emily: Spalacidae

يتبع هذه العائلة جنس Spalax و التي من اهم خصائصه

- عدم وجود ذيل او عيون او اذن خارجية
- الفرو ناعمة ذات لون غامق
- يتغذي علي الدرناات والبصيلات وجذور النباتات المختلفة  
و من اهم الانواع  
Spalax ehrenbergi واسمه الشائع جرذ ابو عماية (Mole rat, Abu Amma)



"جرذ ابو عماية"

- يعيش في انفاق تحت سطح التربة بعمق يصل الي 50 سم في المناطق الصحراوية و في اعماق الاراضي الرملية
- هذه الانفاق متشعبة و تحتوي علي العديد من الحجرات للمعيشة و تخزين المواد الغذائية ويعمل جحوره بواسطة مخالبة الامامية التي يحفر بها التربة ثم يقوم بدفع التراب للأمام بواسطة الراس وقد يستخدم القواطع في حفر الارض الصلبة
- هذا النوع نشيط الحركة، عدواني الميول و يعض بسرعة عند امساكه ويزداد نشاطه في فصل الشتاء والربيع أي في مواسم المطر ونادرا ما يشاهد في الفصول الجافة، وبالرغم من ان هذا النوع متأقلم للمعيشة تحت سطح التربة الا انه قد ينشط ليلا او نهارا فوق سطح التربة و ذلك للحصول علي غذائه او للتزاوج و يتغذي هذا النوع علي الدرنتات والبصيلات و جذور النبات المختلفة و يمكن اصطياد هذا النوع مصائد خاصة تسمي Macabee Pocket gopher
- ينتشر في الجزء الشمالي من الساحل الغربي للبحر الابيض المتوسط ملاحظة: أكثر انواع القوارض انتشارا بجنوب صعيد مصر هو الجرذ المتسلق ذو البطن البيضاء (جرذ النخيل) و الجرذ المتسلق ذو البطن الرمادي (الجرذ السكندري) و جرذ الحقل النيلي (جرذ الغيط) و الجرذ النيرويجي و الفأر المنزلي وبعض الانواع الصحراوية بالمناطق الصحراوية. و يمكن تقسيم القوارض الي:

1- عن طريق الحجم (ما هو الفرق بين الفأر و الجرذ)


جرذ	فأر	وزن الحيوان البالغ
اكبر من 50 جم	اقل من 50 جم	

طول القدم الخلفية	أقصر من 3 سم	أطول من 3 سم
طول علبة الرأس	أقصر من 3 سم	أطول من 3 سم
مثال	الفأر المنزلي الفأر القاهري الشوكي	الجرذ النيروبيجي وجرذ الحقل النيلي والجرذان المتسلقة

## 2- عن طريق الشكل الظاهري و السلوك

الذيل	قوارض متسلقة	قوارض حافرة
الذيل	اطول من الرأس والعنق والجذع	اقصر من طول الرأس والعنق والجذع
البوذ	مسحوب	عريض
صبيوان الاذن	طويل يغطي فتحة العين	قصير
بطن القدم	توجد مخدات اسفل القدم	لا توجد مخدات
مكان المعيشة	عشوش اعلى سطح الارض	جحور تحت سطح الارض
امثله	الجرذ السكندري Raatus rattus (ذو البطن الرمادي) alexandrinus	الجرذ النيروبيجي Rattus norvegicus
	جرذ النخيل (ذو البطن الابيض) Raatus rattus frugivorus	جرذ الحقل النيلي Arvicanthus nilotcus





### "الفرق بين الجرذان المتسلقة والحافرة"

اخيرا يمكن القول بان

- القوارض الحافرة أي التي تعيش في جحور هي ( الجرذ النرويجي- جرذ الحقل النيلي- جرذ النوزكيا- الفار المنزلي)
- القوارض المتسلقة أي التي تعيش في عشوش ( جرذ السكندري – جرذ النخيل- الجرذ الاسود) وفي كثير من الاحيان تعيش الانواع المتسلقة في جحور لكن بعد تجهيزه كعش
- 3 عن طريق الظروف البيئية للمعدشة ومعظم الفئران تشترك في هذا السلوك ولكن بدرجات مختلفة

- قوارض منزلية: تعيش في المنازل ولا تغادرها " الفأر المنزلي، الشوكي القاهري ، الجرذ المتسلق الرمادي، احياناً المتسلق ذى البطن الابيض "
- قوارض شبه منزلية " مشاركة" يمكنها المعيشة في المنازل وخارجها " الجرذ المتسلق ذى البطن الابيض، جرذ الحقل النيلي، الجرذ النرويجي "
- قوارض برية " حقلية" تعيش في الحقول ولا تدخل المنازل الا في حالة عدم توفر الطعام في الحقول " الجرذ المتسلق ذى البطن الابيض، جرذ الحقل النيلي، الجرذ النرويجي "
- قوارض صحراوية تعيش في الصحراء ولا تدخل المنازل وتتخذ من النباتات الصحراوية غذاء لها " جرذ ابو عمايه ، اليرابيل "

### حيوانات شبيهه بالقوارض

1- ابن عرس (العرسة)



"ابن عرس"

ابن عرس أو الدلق أو الرغوب *Mustela nevalis* هو جنس من الحيوانات يتبع الفصيلة العرسيات *Mustelidae* من رتبة اللواحم *Carnivora* فهو ليس من القوارض يخرج عادة في الليل للبحث عن غذائه وقد يخرج بالنهار أيضاً. وبالرغم من أن هذه الحيوانات هي أصغر أنواع اللواحم، فهي بالغة الجرأة مقدامة غير هيابة، حيث يهاجم الثدييات الصغيرة بجرأة،

ولابن عرس حاسة شم قوية وحاسة بصر حادة، وله قوة تثير العجب بالنسبة لحجمه حيث يفترس الفئران والسناجب. وهو يعض الفريسة عادةً في رقبتها أو في أسفل الجمجمة. ويأكل ابن عرس كذلك ديدان الأرض والحشرات والضفادع والسحالي والأرانب والدُّباب والحيّات والطيور. وجسم ابن عرس النحيل يمكنه من أن ينفذ بسهولة إلى جحور الفئران وشقوق الصخور وأعشاش السناجب. وكثيراً ما يقوم ابن عرس باجتياح المزارع ويقتل من الدجاج أكثر مما يحتاج إليه في طعامه. ونتيجة لذلك يناصر كثير من المزارعين ابن عرس العداء رغم أنه يقضي على حشرات المزرعة. وقد جرت العادة على تسميته في الريف المصري بـ«خناق الكتاكيت» لقدرته الفائقة على التخلص من أعداد كبيرة من الكتاكيت، فالعرسة الواحدة يمكنها امتصاص دماء أكثر من مائة كتكوت في اليوم، ولهذا فوجوده في الأماكن القريبة من مزارع الدواجن أو منازل الفلاحين يعدّ خسارة فادحة تلحق بأصحابها، وقد عبر المثل الشعبي المصري القائل «اللي يخاف من العرسة ما يربيش كتاكيت» عن مدي الخوف من هذا الحيوان دقيق الحجم، والذي يتسم جسمه بالرشاقة والسرعة ولهذا تصاب الدواجن عند رؤيته بهلع شديد. ايضاً العرسة المصرية تهاجم الفئران بشدة وتعتبر مسئولة عن القضاء على نسبة منها.

\* نبيذه عن طرق مكافحة إبن عرس

- الحفاظ على النظافة دائماً والحرص على التخلص من القمامة والكراكيب بشكل مستمر

- إضاءة المكان المحتمل وجود ابن عرس لانه يحب الظلام
- المكافحة الحيوية عن طريق تربية الكلاب لانه يخشي المكان اللى فيه رائحة الكلاب.
- استخدام مصائد الفئران و يوضع بها كبده غير مطهية او صغار الطيور او احشاء داخلية للطيور او اي شئ به دم طازج لان ابن عرس ينجذب نحو الطعوم التي بها دم طازج ويوضع بداخله سم (مبيد) مثل اللانيت او فوسفيد الزنك مثلا.

## 2- القنفذ



"القنفذ"

القنفذ أو الدعلج Hedgehog حيوان صغير من الثدييات ينشط صيفا فهو ينام شتاء ويستيقظ في ربيع ويتعاش على أكل الحشرات يأكل الديدان والزواحف والفئران الصغيرة وبيض الطيور التي تعيش في البراري كما يأكل النباتات والثمار. والقنفذ اسم لاثني عشر نوعاً من الثدييات الليلية الصغيرة التي لها غطاء شائك كثيف. وتبحث القنفاذ عن طعامها ليلاً. وتأكل الحشرات، والرخويات والديدان والثدييات الصغيرة والثعابين والطيور وبيض الطيور، وعندما يبدأ الطقس البارد، تكمن القنفاذ في السبات. ويبلغ طول القنفذ الأوروبي الشائع 25سم. وله أذنان قصيرتان وأرجل قصار، وذيل قصير وأنف طويل. وتنمو على ظهره أشواك صلبة لتحمي الحيوان من أعدائه. وعندما يتعرض القنفذ للخطر، فإنه يكور نفسه على هيئة كرة. وهو يبني عشه من الحشائش وأوراق الشجر الجافة. ويولد الصغير مع وجود الأشواك تحت الجلد لتجنب أذى الأم. وتحفر القنفاذ طويلة الأذن والقنفاذ الصحراوية الإفريقية والآسيوية جحوراً لتقيم فيها تقيها من حر النهار.

يلد ويرضع صغاره وله رأس بدون رقبة ظاهرة وأذنين صغيرتين وفم مستطيل وذو أرجل قصيرة يغطي كل جسمه أشواك حادة وعند شعوره بأي خطر يكور جسمه على شكل كرة شوكية تقيه شر أعدائه. يستطيع معاركة الأفاعي والثعابين والحيات وذلك بتكوره ومحاولة التقاط ذنها بفمه المختبئ وكل حركة للحية تزيدها ألماً وضرراً. ينشط ليلاً في الأيام المقمرة باحثاً عن ما يقتات عليه.

الدعلج حيوان بري من الثدييات ، يصل وزنه إلى بضعة كيلوجرامات، تغطي ظهره أشواك أو سهام مجوفة تتراوح أطوالها بين 10 ال 35 سم تكون منسدلة على جسمه وما أن يحفز او يستفز ويشعر بالخوف تراه ينفذ جسمه بحركة قوية فينطلق معها أحد السهام بإتجاه العدو.


يبنى الدعلج عشا وثيرا له في الجحر الذي يعيش فيه يبطنه بالقش والجذور والاوراق الجافه ويعدده للتكاثر خلال فصل الربيع ، وتلد أنثى الدعلج بعد فترة حمل تبلغ ستون يوما من 2 - 4 جراء صغيرة تخرج كامله النمو وأشواكها قصيره لينه، وترضع الام صغارها لفترة طويلة نسبيا تنتهي عندما تعتمد الصغار على نفسها، و متوسط عمر الدعلج حوالي 20 سنه.

يعتبر الدعلج حيوانا ليليا حيث يخرج ليلا ليبحث عن غذائه. ويتم صيد الدعلج لغرض الاستفادة من لحمه ضمن وصفات الطب الشعبي التي تلقى رواجا في بعض المجتمعات الاسوية ، وهو ليس من القوارض

### طبائع وسلوكيات وغرائز الفئران

#### 1. لماذا سميت الفئران بالقوارض

تتميز بزوج من القواطع لكل فك تنمو بصفة مستمرة قد تصل إلي أكثر من 12 سم في العام والنمط العام لأسنانها (3001/3001) لكل فك أي لا توجد أنياب أو ضروس أمامية و يوجد بين القواطع والضروس الخلفية فراغ يسمى " فراغ الديستيما " وفي هذا الفراغ تنثني القوارض شفيتها للداخل فتمنع دخول الشظايا الحادة (أخشاب أو أي مواد أخرى تحتوي علي شظايا حاده) إلي الفم عند إجراء عملية القرص أو بري القواطع و السماح لها بالخروج عن طريق فراغ الديستيما لذلك تلجأ إلي قرص الأخشاب و الأسلاك و المواد الأخرى لتقليم أو بري قواطعها باستمرار لوقف نموها فإن تركتها بدون بري تموت. لكن هذا السلوك أثر علي الفئران فهي تقرض كل ما يقابلها حتي لو كانت مواد لا تساعد في عملية البري كالأوراق و الصابون وغير ذلك ، معتقدة أنها تقوم بعملية البري أو التقليم ولهذا سميت بالقوارض.



"القواطع في القوارض"

## 2. اللون والحجم والوزن

يختلف اللون باختلاف انواع الفئران وكذلك باختلاف البيئات التي تعيش فيها الفئران وتتراوح ألوان الفئران ما بين البني الي الرمادي على الناحية الظهرية اما على الناحية البطنية فيتراوح اللون بين الابيض الي الرمادي الخفيف وعموما فانه لا يمكن الاعتماد على الالوان في تمييز الانواع حيث ان اللون كباقي الصفات المورفولوجية الخارجية التي تتغير بتغير المناطق الجغرافية ويتحكم في صفة اللون 6 ازواج من الجينات وعلي حسب عدد الجينات السائدة الموجودة في الفرد يظهر اللون اي انها وراثية كمية اما بالنسبة للوزن فيتراوح وزن الفأر ما بين 100 : 500 جرام وقد يصل الوزن 25 جم في الفأر المنزلي .

## 3. الحواس

أ- حاسة الإبصار: هي أضعف الحواس في الفئران حيث تقوم الفئران فقط بتحديد الشكل الخارجي للأشياء ولا تستطيع الفئران ان تميز من الالوان المختلفة اي انها لديها عي الوان Colorblind ، لكن اللون الرمادي و الاحمر أكثر جاذبية يفضلان في تحضير الطعام السامة.

لايتعدى مدى الرؤية في الجزد النرويحي 9 متر ولكن يميز الهيئات البسيطة الأشكال ومدى الرؤية في الفار المنزلي 13 متر.



"الإبصار في القوارض"

ب- حاسة اللمس: من أقوى الحواس لدي الفأر وذلك عن طريق الشوارب الطويلة الموجودة في الوجه قرب الانف وكذلك عن طريق هذه الاجزاء تستطيع الفئران ان تتحسس طريقها وتصل الي جحورها وكذلك ان تتعرف على الاشياء المحيطة بها .



"الشوارب في القوارض"

ت - حاسة التذوق: تماثل حاسة التذوق في الانسان حيث انها تستطيع ان تميز الكيماويات ضعيفة التركيز وعن طريق هذه الحاسة تستطيع ان تتحري بدقة عن المواد الغير مألوفة في غذائها دون ان تتناولها وإذا ابتلعت شيء منها فانه لا يمكن اعادتها والتخلص منها من معدتها حيث لا تستطيع أن تتقيأ . أما إذا اكتشفت هذه المواد الغير مألوفة وما زال الطعام في الفم قبل دخوله المعدة فتستطيع ان تلفظه عن طريق الفجوة الموجودة بين القواطع والضروس.



"التذوق في القوارض"

ث - حاسة السمع: قوية جدا وتتفوق حاسة السمع في الفئران عنها في الإنسان وتستطيع الفئران ان تكشف اي ضوضاء عن طريق حاسة السمع القوية فتفر هاربة من اي خطر يقترب منها و هي تستطيع تمييز الاصوات التي يزيد ترددها عن 20 الف ذبذبة في الثانية الواحدة. وهناك العديد من الأجهزة التي تحدث أصوات ذات تذبذب عالي ( موجات فوق صوتية ) تستخدم في طرد الفئران نتيجة لفرعها ولقد أجريت العديد من الدراسات لدراسة مدي تأثير الفئران بالصوت الناتجة من هذه الأجهزة و أثبتت هذه الدراسات عدم جدوي مقاومة الفئران بهذه الوسيلة حيث قد اعتادت الفئران على هذه الأصوات بعد مدة وأقبلت على المواد الغذائية القريبة من هذه الأجهزة دون ان تؤثر عليها بشيء.



"قوة السمع في القوارض"

ج- حاسة الشم: قوية جدا وتلعب دورا هاما في حياة هذه الحيوانات وهناك بعض الشواهد التي تدل على أن تستطيع أن تميز وتتجنب رائحة الإنسان ولكن استجابتها لرائحة الإنسان لا تستمر طويلا حيث إنها لا تستطيع ان تميز رائحة الإنسان عن طريق اليد في الطعوم والمصايد بعد مدة ، أيضا تستطيع تمييز رائحة المصائد المستتاده فئران من قبل، ولذلك يجب الاهتمام بعمليات غسل المصائد للتخلص من رائحة الإنسان بها او غيرها ولقد أثبتت المشاهدات الحقلية أثناء استخدام المصايد في عمليات المكافحة والتجارب العملية ان الفئران تقبل على المصايد المغسولة أكثر من المصائد الغير مغسولة.



"حاسة الشم في القوارض"

د- الاختباء

تتميز القوارض بظاهرة الاختباء خوفا من الانسان او الاعداء الحيوية فتتخذ الاغراض المنزلية مخبأ لها لتبدأ بناء مأواها للتحرك منه للبحث عن الغذاء او الماء.



"حاسة الاختباء في القوارض"

## 4. القدرة على التسلق

جميع أنواع الفئران والجرذان لها القدرة على تسلق الحوائط رأسياً إذا كان سطحها خشناً ويعتبر الجرذ المتسلق *Rattus rattus* من أقدر الأنواع على التسلق فهو نشط الحركة ولا يجد صعوبة في التنقل عن طريق المواسير حيث يتسلق الأسلاك والمواسير سواء من داخلها أو خارجها . وجدير بالذكر أن الفئران المتسلقة تتميز بطول الذيل عن الجسم كما شرح سابقاً وذلك ليساعد الجسم في عمل إتيان أثناء التسلق كما أنها تمتاز بوجود وسادة في الناحية البطنية للأرجل، هذه الوسادة تساعد في تفرغ الهواء بين الأرجل والمبني فتعمل على إلتصاق الأرجل



"القدرة على التسلق في القوارض"

## 5. القدرة على القفز



يعتبر الجرذ المتسلق *Rattus rattus* من أقدر الأنواع على القفز حيث يمكنه القفز لمسافة 1 متر رأسياً ويقفز أفقياً لمسافة 1.2 متر على السطوح المستوية أمام الفار النرويجي فيستطيع ان يقفز رأسياً لمسافة 60 سم وتقفز الفؤيرات رأسياً لمسافة 30 سم .



### "القدرة علي القفز في القوارض"

#### 6. القدرة علي العوم

تختلف مقدرة الفئران علي العوم باختلاف الانواع حيث يعتبر الفار النرويجي اكثر الانواع مقدرة علي العوم حيث يستطيع ان يعوم لمسافة 800 متر ، يليه الفار المتسلق و فار المنزلي ويمكن للفئران النرويجي ان يدخل المنازل عن طريق مواسير المياه والمراحيض.

#### 7. عادات التغذية

اغلب أنواع الفئران تعتبر كائنات التغذية Omnivorous حيث تأكل اي نوع من أنواع الغذاء الذي يصادفها و ان كل نوع من الفئران له ما يفضله من بعض أنواع الأغذية. فمثلاً

- الفأر النرويجي يفضل الطعوم الحيوانية و مخلفات و بقايا أطعمة الإنسان
- الفأر المتسلق والنيلي يفضل الأطعمة النباتية والحبوب والثمار و الخضروات
- الفأر المنزلي يأكل كل ما يقابله مع الميل للتغذية علي الحبوب



## "قدرة القوارض علي التغذية"

### 8. النشاط العدواني للفئران

تتصف الفئران بأنها عدوانية وشرسة حتي مع الأفراد من نفس نوعها وخاصة عندما يتزايد أعدادها وتصبح في حالة تنافس على الغذاء والمأوي فقد تقتل بعضها البعض وتصبح عصبية ويقوم الذكور المتسلطة بطرد الذكور الأخرى المفضلة لهم وقت ما يشأون بينما يتناول الفئران الأقل قوة طعامهم في غياب الفئران الأكثر قوة .



"النشاط العدواني للقوارض"

### 9. التكاثر

هل تعلم ان الزوج الواحد من الفئران له القدرة علي التكاثر بمعدل 2000 فار وهذا العدد الذي يكون خياليا ينتج عن الحقائق التالية :  
يعمر الفأر حوالي سنه و نصف.  
يتكاثر الزوج الواحد من الفئران حوالي 5- 8 مرات في السنة.  
بعد ثلاثة اسابيع ينتج عن هذا التكاثر عشرة فئران صغيرة و تشكل الاناث عادة نصف هذا العدد.

بعد سعة سبعة اسابيع من ولادة الفار تصبح له القدرة علي التكاثر.  
وعلي هذا النحو من التصاعد الهندسي يمكن للزوج الواحد من الفئران ان ينتج اكثر من الفين فرد خلال عام واحد و تعتبر الفئران من الد اعداء الانسان و التي يمكن ان تقضي عليه لولا وجود اعدائها في الطبيعية كالققط و الكلاب و العصافير و الافاعي و كذلك ارتفع نسبة الوفيات الناتجة من الانقراض و الامراض

يقدر تعداد الفئران بالدول المتقدمة بفار لكل شخص وقد يصل هذا التعداد الي الضعف او اكثر في بعض الدول الأخرى اذ يصل في الهند الي اكثر من 5 فئران لكل شخص هذا في نهاية القرن الماضي و في القرن الحالي تقدر أعداد القوارض بأنها أكثر من عدد نفوس البشر اذ يعتقد انه في الهند يوجد أكثر من 5 مليار قارض وفي البرازيل أكثر من 3 مليار قارض ويوجد في شبكات الأنفاق تحت الأرض في المدن الألمانية 120 مليون قارض وفي مدينة نيويورك لوحدها 8 مليون قارض كما يقدر عدد الجرذان والفئران ب 17 مليار قارض أي بمعدل 4 قوارض لكل إنسان.



### "التكاثر في القوارض"

ويتأثر نشاط الفئران البيولوجي وتكاثرها بالاتي:

- التغيرات الموسمية: حيث يبدأ التكاثر عقب موسم معين فنجد مثلا الفار النيلي ينمو و يتكاثر بشدة حيثما وجد الطعام المناسب و الماء والمأوي و ذلك خلال موسم الربيع والخريف ويقل تعدادها في الشتاء
- مراحل نمو النباتات: حيث نجد مثلا يزداد تكاثر الفئران و تعدادها في مرحلة نضج حبوب القمح وتكوين الحبوب و بمجرد الحصاد تظهر اعداد كثيفة من الفئران لتهاجم المحاصيل الصيفية التي سوف تزرع بعده.
- العمليات الزراعية: حيث تعتبر الفئران سريعة الاستجابة لأي تغير يطرأ علي المنطقة أو البيئية المحيطة بها، فمثلا عمليات النظافة أثناء الزراعة قد تكون من اهم العوامل التي تحد من تكاثر الفئران ، حيث أنها تؤدي الي حرمان الفئران من الغذاء و المأوي فنجد مثلا ان عمليات التخلص من سفير القصب من اهم العوامل التي تحد من تكاثر الفار المتسلق داخل حقول القصب

- نوع المحصول: حيث وجود أكثر من نوع من المحاصيل التي تنضج في اوقات مختلفة تهيئ بيئة مناسبة للفئران حيث يؤدي ذلك الي توفير الغذاء دائما حيث تهاجر الفئران عقب حصاد محصول معين الي محصول اخر
- نوع الغذاء بالمنطقة
- وجود أكثر من نوع للفئران في المنطقة الواحدة في نفس الوقت و مع اتباع طريقة معينة في عمليات المكافحة المتخصصة لنوع معين قد تؤدي الي زيادة اعداد الانواع الأخرى المنافسة له في المنطقة.

#### 10. ظاهرة التجنب

شديدة الحذر حتي لا تقبل علي الأكل الجديد في جماعة و لكن يقبل أكبرها في الغالب ( لأنه أكثر جوعا بسبب كبر حجمه) أو أشدها تضحيه و ذلك بعد مناورات كثيرة ، وينتظر الباقيون قليلا حتي تتأكد من الأمان، أما إذا مات الفأر المقدم فإنها تقرر عدم الإقتراب من هذا الطعم و تبقي رائحته في ذاكرة الفأر لمدة 6 أشهر (قوة ذاكرة الفأر 6 أشهر) لذلك نضع الطعم أولا بدون مبيد ثم نضع نفس الطعم بالمبيد في الليلة التالية ولذلك لا يفضل إستخدام المبيدات سريعة المفعول إلا في حالة الكثافة العالية.



"ظاهرة التجنب في القوارض"

#### 11. إنقلاب الفئران الدموي

- تحفر الفئران البرية جحور ذا منعطفات كثيرة يمينا ويسارا وصعودا ونزولا، و بجحورها ابواب كثيرة وللفئران رئيس يخرج من البيت اولا ويرى الفضاء فاذا لم يكن عدو صاح حتى تخرج الفئران كلها. والعجيب انه اذا رأى الرئيس عدوا صاح بأعلى صوته حتى ترجع الفئران الي بيوتها فان حدث وغفل الرئيس حتى اتى العدو واخذ منها او اطاح منها ، اجتمعت الفئران كلها على الرئيس واكلته ( انقلاب دموي )



"كثافة العشيرة وشراستها في القوارض"

## 12-المدى الحركى للفئران

- تتجنب الفئران الاماكن المكشوفة حيث يكون مسارها في الأماكن المختبئة وبجوار الحوائط و تحت العوائق و يختلف المدى الحركى للفئران للبحث عن الغذاء باختلاف أنواعها و لكل نوع من الفئران مجاله الحركى و عموماً فإن الفأر النيرويجي يتحرك في حدود دائرة قطرها 15 متر و هو المدى الحركى من الجحر إلي أماكن وجود الغذاء. و يقل المدى الحركى لفأر المنازل عن ذلك أما الفأر النيلى فقد يصل المدى الحركى له أكثر من 27 متر كما أن الفأر المتسلق يعتبر من الفئران الرحالة للبحث عن الغذاء و المأوى فيمكنه أن يتجول أكثر من ذلك. و على كل فإنه تحت ظروف معينة يكون فيها الفأر مجبراً على الهجرة نتيجة حدوث فيضانات أو كوارث أو عندما يخرج الفأر البالغ ليبحث لنفسه عن موطناً آخر فيمكنه في هذه الحالة أن يتحرك لمسافات أبعد من ذلك.




"المدى الحركى في القوارض"

## 13-الهجرة

تهاجر هذه الحيوانات على هيئة تنقلات كلية وجزئية في بعض مواسم السنة و حسب درجة توافر الغذاء في المكان الذي تعيش فيه.

## 14-المسكن

يعيش الفأر في جحور في التربة و حول الأجران و المخازن و تحت أجوله الحبوب في الشون و المستودعات و المخازن أو في أسقف المنازل الريفية و تصنع الفئران مخازن لنفسها تخزن فيه ما تحصل عليه من غذاء و تحتفظ به لفصل الشتاء أو للأيام التي تسوء فيها الظروف الجوية أو في حالة عدم توفر الغذاء. وتتكون مساكن الفئران من ممرات تحت سطح الأرض و حجرة للمعيشة و حجرة لتخزين الطعام، فلو أخذنا مثال لجحر الفأر النيلي نجد أنه يتكون عادة من عدة مداخل للاختباء السريع و الهروب و أنفاقه يتراوح طولها ما بين 2-8 متر بقطر 4سم و حجرة للمعيشة بعرض حوالي 25 سم علي عمق 50 سم في الشتاء و 15 سم في الصيف ثم يليها حجرة لتخزين الغذاء.



### "توزيع الجحور في القوارض"

15. اماكن تواجد الفئران

تختلف انواع الفئران باختلاف الاماكن فمثلا

- الفأر المتسلق يتواجد في حدائق الفاكهة و مزارع النخيل و حقول الخضروات و مزارع الدواجن و كذلك حقول القصب و خاصة قبل كسر القصب مباشرة حيث يعمل عشوش من سفير القصب، علاوة علي تواجده في المخازن و الشون و المنازل
- الفأر النرويحي يتواجد غي الاماكن الرطبة الغني بالمواد العضوية مثل مقالب القمامة و في مزارع الانتاج الحيواني وكذلك في مزارع الدواجن و المذابح و بجانب ضفاف نهر النيل احيانا.
- الفأر النيلي و يكثر انتشاره بجوار قنوات الري و الجسور و الترع المطهرة حيث يسكن المناطق العشبية
- الفأر الشوكي و يكثر تواجده في المباني و المنازل و الشون و المخازن وقد يتواجد احيانا في المناطق الصحراوية و المقابر و الكهوف

- الفأر المنزلي يكثر تواجدها في المنازل و الشون و المخازن و قد لوحظ تواجدها في

مزارع قصب السكر في الوجه القبلي وكذلك بعض الزراعات الحقلية و الخضار في الوجه  
البحري


- ويسكن الفار النرويجي و النيلبي الجحور ، اما الفار المتسلق فيصنع اعشاشا يعيش فيها و تصنع  
فؤيرة المنازل اعشاش علي هيئة كرات مجوفة من الاوراق و الاقمشة في الاماكن المختبئة و  
المظلمة

- اما الفأر الشوكي فيعيش في سراديب تحت سطح التربة.

#### التعرف على وجود الفئران واستكشافها

ان عملية الفحص التي تجري قبل البدء في وضع اي برنامج مكافحة للفئران في مكان ما من  
العمليات الضرورية والتي عن طريقها يمكن التعرف على أنواع القوارض الموجودة في المكان  
ومدي كثافة الفئران الموجودة ونظام توزيعها في المكان وهناك العديد من الطرق والعلامات  
التي يمكن بواسطتها الاستدلال على ذلك ومنها :

- (1) مشاهدة الفئران نفسها : متجولة وعلى الترع والمصارف والجسور وهذا يستلزم مراقبتها  
بعد الغروب مباشرة او في الصباح الباكر حيث كان يلاحظ تجوال الفئران في هذه  
الفترات.



"مشاهدة القوارض"

- (2) جحور الفئران

تحفر القوارض الجحور لتأوي إليها وتختبئ عن عيون أعدائها وتخزن قوتها وتتخذ هذه  
الجحور حوالي المباني والمستودعات أو الحقول أو حواف الأنهار والقنوات ، وتتكون من

نفق رئيسي وقطره يناسب حجم الحيوان ويتفرع عن النفق الرئيسي أنفاق جانبية يؤدي بعضها إلى تجاويف مستديرة أو بيضاوية تستخدم لوضع الصغار أو للراحة والنوم والاختباء. ويحفر الفأر جحره بواسطة القواطع الأمامية ومخالب الطرفين الأماميين ويستخدم الأطراف الخلفية لدفع التراب إلى الخلف. أما جرد الموائ أو جرد الأسقف فيبني أعشاشه على السقوف وتكون مؤلفة من بقايا المواد المهترئة كالملابس الممزقة والورق والقطن.

وتختلف شكل وطبيعة هذه الجحور باختلاف أنواع الفئران وكذلك المحاصيل القائمة كالآتي:

- أ. بالنسبة للفأر النيلي فيقوم بحفر جحور على حافة الترع والمصارف والجسور المجاورة للمحاصيل الزراعية وقد يقوم بعمل الجحور على حافة المساقى الصغيرة والتي تتخلل الأراضي الزراعية أو تحت أشجار النخيل داخل الأراضي الزراعية وأحيانا يقوم بعمل هذه الجحور داخل الأراضي الزراعية على حافة البتون وقد لوحظ في مزارع القصب ان الفأر النيلي يصنع أعشاشا من السفير داخل هذه المزارع .
- ب. الفأر النرويجي يعمل جحور في مستوي سطح التربة ويكون قطر الجحور حوالي 8 سم وتوجد هذه الجحور في مقالب الزباله والمناطق التي يكثر بها المواد العضوية مثل مزارع الدواجن وحظائر الحيوانات فقد لوحظ ان الفئران تعمل جحور حول أسوار هذه الحظائر وكذلك حول أماكن تخزين العلف .
- ت. الفأر المتسلق يصنع أعشاش من القش وسفير القصب وأوراق النخيل وكذلك يعمل هذه الأعشاش من الورق ومخلفات مزارع الدواجن داخل حوائط الألمونيوم الموجودة داخل العنابر .
- ث. الفأر المنزلي يصنع أعشاش على هيئة كرات مجوفة من الأوراق والأقمشة وذلك داخل الحوائط والأرضيات والحواجز الخشبية .
- ج. الفأر الشوكي يعيش في سراديب تحت سطح الأرض.





"شكل الجحور في القوارض"

(3) الممرات والعلامات التي تتركها الفئران Run & Smears



"علامات تسببها القوارض"

تصنع الفئران ممرات وطرق معينة وذلك أثناء خروجها وعودتها من والى الجحور الخاصة بها تاركة علامات وراءها مثل آثار أقدامها وعلامات الذيل ويمكن من هذه الممرات إلى حد ما تمييز أنواع الفئران كآتي :

أ. الفأر النيلبي ممراته تكون واضحة فوق الحشائش و بالقرب من الجحور ويسهل تمييزها

ب. الفأر النرويحي يعمل ممرات مميزة خارج المباني سواء على الأرض او على النخيل وهذه الممرات غالبا ما تكون قريبة من اي غطاء او تحته ويمكن الاستدلال على هذه الممرات من بعض العلامات التي تتركها الفئران مثل اللطخات الدهنية السوداء  
Black greasy smear

ت. الفئران المتسلقة يصعب على هذه الانواع من الفئران تمييز ممراتها حيث تميل الى التنقل عن طريق المواسير والكابلات وان كان من السهل تمييزها على النخيل أثناء تسلقها حيث يلاحظ وجودها على ساق النخيل والأشجار  
ث. الفأر المنزلي ويمكن تمييز ممراته عن طريق البقع السوداء التي توجد على الأسطح التي تعترض سير الفئران .

ملحوظة :

أ. يوجد على جسم الفئران غدد مسئولة عن إفراز البقع الدهنية السوداء وتسمى هذه الغدد Loop smear.

ب. يمكن إظهار آثار الفئران بعمل جينات صناعية وذلك بنثر التراب الناعم او بودرة التلك أو الرمل الناعم او مسحوق الفحم على الأرض لإظهار آثار الارجل والذيل حيث يظهر الأربع أصبع الخاصة بالقدم الأمامية والخمسة أصبع الخاصة بالقدم الخلفية .


(4) براز الفئران Droppings

يعتبر براز الفئران من الاشياء الهامة للاستدلال على وجود الفئران في الجحور او في اي منطقة معينة فعن طريق هذا الذيل يمكن معرفة اذا كانت الجحور عمالة او غير عمالة فإذا كان البراز طرى لامع يدل على ان الفئران ما زالت تعيش في هذه الجحور اما اذا كان البراز جاف ولونه قاتم فيدل على ان هذه الجحور غير عمالة .

كما انه يمكن تمييز انواع الفئران عن طريق البراز حيث يختلف البراز باختلاف أنواع

الفئران فمثلا:

- 1) الفأر المتسلق : يبلغ طول البعيره حوالي 0.5 بوصة ويأخذ شكل موزة تكون مقوسة.
  - 2) الفأر النرويجي : يبلغ طول البعيره حوالي 4/3 بوصة أنبوبي الشكل وغير مستدقة.
  - 3) الفأر النيلي : كبيرة الشكل ومغزلية ومستدقة من الأطراف وفي مجاميع.
  - 4) الفأر المنزلي : بعيراته صغيرة جدا حوالي 4/1 بوصة غير منتظمة الشكل .
- وجود احجام مختلفة من البعيرات من نفس الشكل يدل على وجود اعمار مختلفة من الفئران وعدد البعرات الموجودة لا يعطي في اغلب الاحيان على تعداد الفئران في المنطقة وكذلك فان عدم وجودها لا يدل على عدم وجود اصابة



### "انواع البراز في القوارض"

- 5) علامات التلف التي تحدثها الفئران أثناء تغذيتها : Signs of damage

قرض الاشياء والأكياس وتمزيقها وبعثرة محتوياتها، تناثر قطع من البراز و وجود آثار بول و وجود رائحة مميزة.

يختلف مظهر التلف الذي تحدثه الفئران على الحبوب والثمار باختلاف انواع الفئران والمحاصيل المختلفة فمثلا التلف الذي تحدثه الجرزان يمكن تمييزه بسهولة عن التلف الذي تحدثه الفئران الصغيرة حيث ان فؤيرة المنازل تقترض الحبوب حول محورها الطولي تاركة أجزاء صغيرة كالفتات بجانب المقروضة اما الجرزان تؤكل أنصاف الحبوب تاركة الأنصاف الاخرى مختلطة بأجزاء صغيرة من الحبوب او وجود قروض في الصناديق أو الأثاث أو الأعمدة

- 6) أصواتها خاصة أثناء القرض

(7) وجود لطخات دهنية سوداء على الجدران أو الأسقف أو الممرات

(8) وجود آثار الأقدام والذيل على الأماكن المغطاة بالتراب

### الاحكام المتعلقة بالفأر

#### حكم الفأر من حيث الطهارة والنجاسة

ذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الفأر طاهر ذلك أنّ المالكيّة يقولون بطهارة الحيوان الحيّ مطلقاً ، قال الدسوقي: ولو كافراً أو كلباً أو خنزيراً أو شيطاناً . وقال التّووي: الحيوان كلّ طاهر إلاّ الكلب والخنزير والمتولّد من أحدهما . وفي مطالب أولي النّبي : وما لا يؤكل من طير وبهائم ممّا فوق هرّ خلقه نجس ، وأمّا ما دون ذلك في الخلقة فهو طاهر ، كالنّمس ، والنّسناس ، وابن عرس ، والقنفذ ، والفأر . وذهب الحنفيّة إلى نجاسة الفأر

#### حكم الخارج من الفأر

اختلف الحنفيّة في بول الفأرة وخرثها ، ففي الخانيّة : إنّ بول الهرة والفأرة وخرثها نجس في أظهر الرّوايات ، يفسد الماء والتّوب ، ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفى عنه للضّرورة . وقال الحصكفي: بول الفأرة طاهر لتعدّر التّحرّز عنه ، وعليه الفتوى . وخرؤها لا يفسد ما لم يظهر أثره ، وفي الحجّة : الصّحيح أنّه نجس وقال ابن عابدين : والحاصل أنّ ظاهر الرّواية نجاسة الكلّ ، لكنّ الضّرورة متحقّقة في بول الهرة في غير المائعات ، كالثّياب ، وكذا في خراء الفأرة في نحو الحنطة دون الثّياب والمائعات ، وأمّا بول الفأرة فالضّرورة فيه غير متحقّقة .

#### أكل الفأر



"القوارض كغذاء"

ذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يحلّ أكل الفأر ، قال المحلّي من الشافعيّة : لحرمة سببان : النّبي عن أكله ، والأمر بقتله فقد ورد عن النّبي ﷺ : « خمس من الدّوابّ كلّهنّ فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » .

وعند المالكيّة قولان : قول بالحرمة كمذهب الجمهور ، وقول بالكراهة  
قتل الفأر



"المصيدة القاتلة للقوارض"

اتفق الفقهاء على جواز قتل الفأر في الحلّ والحرم ، للمحرم وغيره ، لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، أنّ رسول الله ﷺ قال : « خمس من الدوابّ من قتلهنّ وهو محرم فلا جناح عليه : العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة » .

أسباب الزيادة في أعداد الفئران في مصر في السنوات الأخيرة:



"الكثافة للقوارض"

- عمليات تطهير الترع والمصارف وعدم إزالة نواتج التطهير واستخدامها في أغراض أخرى مما أدى الي تراكم هذه النواتج على جانبي الترع والمصارف واستخدام الفئران لها كمأوي مثال على ذلك مصرف المحيط الذي يمتد من محافظة المنيا الي محافظة

- بني سويف والذي كان يتواجد عليه العديد من الفئران وكذلك مصرف بحر البقر ومصرف فاقوس بالشرقية.
- التركيب المحصولي المتبع في مصر والذي لا يسمح بخلو الأرض من الزراعات على مدار السنة مما يتيح الغذاء للقوارض طول السنة بدون انقطاع فلقد كان في الماضي فترات تخلو فيها الأرض من المحاصيل الشتوية والصيفية او العكس تجهز فيها الأرض وتجري عمليات الخدمة استعداد للمحصول القادم أما حالياً في مصر يزرع عروات من الخضار أو حتى محاصيل أخرى بين هذه المواسم.
  - قلة الأيدي العاملة لإجراء عمليات حصاد المحاصيل مما يؤدي إلي تركها فترة طويلة في الأرض طوال هذه الفترة فلقد لوحظ في العديد من المناطق على سبيل المثال تركهم لمحصول القمح بعد حصاده في الأرض أو الأجران لمدة طويلة بدون عمليات الدراس أو نقل المحصول الي المخازن.
  - سوء عمليات التخزين في مصر وعدم تطوير أساليب التخزين حيث تخزن الحبوب في الشون في العراء مكشوفة مما يسهل للقوارض ان تحصل على غذائها وتجد لنفسها مأوى جيد دون عناء.



"جرذ بمخزن غلال"

- التوسع العمراني واستغلال الارض الزراعية واستخدامها في البناء حيث استغلت تقريبا المساحة الزراعية في البناء وإقامة المباني وسط الأراضي الزراعية أعطي الفرصة للعديد من الأنواع التي كانت تعيش في المباني فقط ان تعيش وتهاجم المحاصيل الزراعية مثل المنازل ولقد ظهرت هذه المشكلة بوضوح في محافظة السويس حيث تتواجد منازل الفلاحين ومزارع الدواجن الأراضي الزراعية وبالتالي أعطي الفرصة لقوارض المنازل التي كانت تعيش فقط في المنازل أن تهاجم المحاصيل الزراعية وتعيش بها.

- استخدام المبيدات الحشرية بصورة مكثفة أدت الي القضاء على العديد من الأعداء الحيوية الخاصة بالقوارض مثل الطيور الجارحة.
- إن من أهم أسباب تزايد القوارض في مصر هو إهمال المزارع لأرضه وعدم الاهتمام بعمليات الزراعة الحديثة حيث أصبحت الزراعات التقليدية لا تعطي العائد المنشود منها مما جعل المزارعين يتجهون الي أعمال أخرى أكثر ربحا وفائدة له مثل العمل في المشاريع المختلفة وهذا بدورة أعطي الفرصة للقوارض ان تتزايد وتتكاثر.
- الإهمال في صيانة المصارف التي أقامت الدولة العديد منها في أماكن عديدة دون الاهتمام بصيانتها وبالتالي ادي ذلك الي زيادة الأملاح في التربة وأصبحت غير صالحة للزراعة وبالتالي أصبحت مرتعا للقوارض لعمل جحور فيها ومهاجمة المحاصيل المجاورة لها.

### طرق تقدير الكثافة العددية للقوارض

ان عملية تقدير الكثافة العددية للفئران في منطقة من المناطق ليست سهلة ولا توجد طرق دقيقة تجزم بأعداد الفئران الموجودة في منطقة ما. فكل الطرق المستخدمة في تقدير تعداد الفئران تعتمد علي الاثار التي تتركها الفئران و ان كان بعضها اكثر دقة مثل طريقة المصائد و طريقة استخدام الجحور العمالة او النشطة وبعض الطرق الأخرى التي تعتمد علي تعليم الحيوانات المصتادة وإعادة إطلاقها و عادة ما تستعمل أكثر من طريقة لتقدير التعداد حتي يمكن الحصول علي بيانات أقرب ما تكون للحقيقة وبصفة عامة يمكن القول ان كل طرق قياس الكثافة العددية للقوارض تقديرية الهدف من تقدير الكثافة:

- معرفة العدد التقريبي للقوارض في المنطقة

- حساب كميته الطعوم اللازمة

- قياس مدى نجاح برنامج المكافحة

1- طريقة استخدام المصائد

حيث يوجد نوعين من المصائد و هي المصائد العادية و التي يمكن بواسطتها الحصول علي الفئران حية و المصائد القاتلة Snap traps و هي التي تقتل الفئران عند اصطيادها، وتستخدم في الحقول التي لا يوجد بها محاصيل " بعد حصاد المحاصيل " و عند تقدير الكثافة العددية للفئران في منطقة ما يمكن استخدام 100 مصيدة في الفدان الواحد حيث تكون مساحة فدان مربع (65م × 65م) حيث يتم وضع المصائد طوليا وعرضيا علي شكل L بحيث يكون البعد بين كل مصيدة والتي تليها 6.5 م او 5 خطوات مع ترقيم المصائد ويفضل وضع المصائد قبل الغروب

وتستمر في نفس المكان لمدة 3 ليالي متتالية مع وضع الطعم المناسب وتغيره يوميا في الصباح الباكر وتسجيل عدد الفئران المصتادة فيها وتحسب الكثافة كالتالي:

الكثافة العددية = [المجموع الكلي للفئران المصتادة / (عدد المصائد × عدد الليالي)] × 100

ويمكن من المعادلة السابقة حساب عدد الفئران /م<sup>2</sup> كتالي

عدد الفئران م<sup>2</sup> = الرقم الناتج من المعادلة السابقة / 125 × 125


و ذلك علي اساس ان الفدان 65 × 65م مع الاخذ في الاعتبار 30م من جميع النواحي يمكن ان تهاجر منها و اليها الفئران.

ويمكن حساب

معامل الصيد (Rat index) = عدد الفئران المصتاد / عدد المصائد

ملحوظة: هناك نوعين من المصائد يمكن استخدامها

- مصائد حية (المصائد السلوكية العادية)



"المصيدة الحية للقوارض"

- مصائد قاتلة (الفخوخ السلوكية)



"المصيدة القاتلة للقوارض"

ملحوظة:

- يفضل استخدام المصائد الحية في تقدير الكثافة العددية

- لا تعطي طريقة المصائد التعداد الحقيقي للفئران لكن هي مؤشر للكثافة الحقيقية فقط Rat indicator



- تكرار استخدام المصائد في منطقة واحدة قد يؤدي الي إحجام الفئران عن دخول المصائد و هذا ما

يسمي Trap shyness

2- طريقة الجحور الحية



"جحور القوارض"


وذلك بحصر عدد الجحور بمنطقة ما واغلاقها وتعليمها وترك الجحور لمدة 3-7 ايام  
ثم يعاد بعدها حساب الجحور النشطة (العمالة) وبمعرفة متوسط عدد الافراد لهذه الانواع في الجحر  
ملحوظة: يمكن معرفة الجحور النشطة او العمالة (التي تم فتحها بعد اغلاقها) بوجود براز حديث او وجود اترية  
حديثة عند مدخل الجحور وعليها اثار الاقدام ووجود اثار للمواد الغذائية في الجحور و عند قياس كفاءة أي  
مبيد يجري عد الجحور العمالة قبل و بعد المعاملة و حساب كفاءة المبيد.

ويمكن حساب الكثافة العددية بهذه الطريقة بواسطة المعادلة الاتية

النسبة المئوية = عدد الجحور التي تم فتحها / عدد الجحور التي تم غلقها مسبقاً × 100

تستخدم في المناطق الصحراوية وحديثة الاستصلاح- مزارع القصب او الشون ومخازن الغلال و مزارع الدواجن

3- طريقة المستهلك الغذائي



"طعوم و محطات طعوم للقوارض"


توزع طعوم معلومة الوزن في حدود (250 جرام مثلا) في محطات بلاستيكية او معدنية او ورقية في اماكن متفرقة والتي يحتمل وجود الفئران فيها و توضع لعدة ليالي الي ان يثبت وزن المستهلك من جريش الذرة و بعدها يحسب المستهلك يوميا بعد جمع الطعوم الباقية و توزن و يحسب مقدار المستهلك من محطات الطعوم و بمعرفة الوزن التقريبي للنوع المتواجد في المنطقة و طبقا للمعادلة (الفار يكل 10/1 وزنه يوميا) يمكن حساب العدد التقريبي للقوارض الموجودة

$$\text{نسبة المستهلك} = \frac{\text{المستهلك من الطعم} / \text{وزن الطعم الكلي} \times 100}{\text{تعداد الفئران} = \text{مجموع المستهلك من الجريش يوميا} / 10/1 \text{ وزن الفار السائد في المنطقة}}$$

وهذه الطريقة تعتبر عملية عند قياس أي مبيد للفئران حيث يحسب المستهلك من الجريش قبل المعاملة في مدة محددة ثم المستهلك من الجريش بعد المعاملة في هذه المدة و منها يمكن حساب المبيد من المعادلة كفاءة المبيد % = المستهلك من الجريش قبل المعاملة - المستهلك من الجريش بعد المعاملة / المستهلك من الجريش قبل المعاملة × 100

- تستخدم في المناطق المفتوحة و الموائ و الاراضي الصحراوية

4- طريقة الذبل



### "انواع الذبل للقوارض"


يمكن من خلالها معرفة انواع القوارض المتواجدة بالمنطقة وكذلك نسبة كل منها وتستخدم لتقدير مدى نجاح برنامج المكافحة .

- يتم حصر وتصنيف الذبل المتواجد وعدده قبل المعاملة لمدة اسبوع ثم التخلص منه ويجرى بعدها المعاملة ويتم حساب الذبل المتكون بعدها لمدة اسبوع اخر - وتحسب النسبة المئوية للموت كالآتي:

النسبة التقريبية = عدد الذبل قبل المكافحة / عدد الذبل بعد المكافحة  $\times 100$

ملحوظة: وجود بعيورات قديمة مع رؤية الفئران تتجول ليلا و عدم رؤيتها بالنهار معناه ان الاصابة متوسطة وجود البعيورات حديثة مع وجود علامات واثار قرض واضحة و مشاهدة اكثر من ثلاث فئران ليلا و مشاهدة فئران نهارا معناه ان الكثافة العددية للفئران عالية جدا

5- طريقة التعداد عن طريق فحص اثار الفئران



### "علامات وممرات للقوارض"

تعتمد هذه الطريقة علي خبرة و دراية القائم بأعمال مكافحة الفئران حيث يتم فحص المنطقة المراد قياس التعداد بها من حيث الاثار التي تتركها الفئران و اثار الاقدام و ذيلها ... الخ. و تقسم المنطقة الي مربعات و تعد المربعات التي بها اثار الفئران فمثلا قسمت منطقة ما الي 50 مربع ووجد اثار الاقدام علي 10 مربعات منها يمكن حساب الكثافة كتالي

$$\text{مؤشر الكثافة} = 100 \times 50 / 10$$

يمكن استخدام هذه الطريقة لقياس كفاءة مبيد ما حيث تعمل هذه المربعات قبل القيام بعملية المكافحة ب 2-5 يوم، فيوضع عدد 20 مربع تغطي باحد المواد السابق ذكرها بالقرب من الحوائط والاماكن المخفية، وتترك لمدة ليلة بعدها تفحص هذه المربعات وتسجل عدد المربعات التي بها اثار ثم يعاد تغطيتها بالمادة التي تترك فيها الفئران اثارها، وهكذا يوميا، وبعد اجراء عملية المقاومة تجري عمل المربعات بالطريقة السابقة و يسجل عدد المربعات التي بها اثار. مع مرعاة عند استخدام المبيدات حادة السمية توضع هذه المربعات بعد عملية المقاومة بفترة قصيرة (3-4 ايام) اما عند استخدام المبيدات المسيلة فتعمل هذه المربعات بعد عملية المقاومة ب 7-10 ايام و علي سبيل المثال

- عدد المربعات الموضوعة قبل المعاملة 20 مربع
- عدد المربعات التي بها اثار في اليوم الاول 7 مربعات
- عدد المربعات التي بها اثار في اليوم الثاني 8 مربعات
- متوسط عدد المربعات التي بها اثار قبل المعاملة 2/15 - 7.5
- نسبة المربعات التي بها اثار قبل المعاملة  $37.5 = 100 \times 200 / 7.5$

- عدد المربعات الموضوعة بعد المعاملة 20 مربع
- عدد المربعات التي بها اثار في اليوم الاول 2 مربع
- عدد المربعات التي بها اثار في اليوم الثاني 1 مربع
- متوسط عدد المربعات التي بها اثار بعد المعاملة  $2/3 = 1.5$  مربع
- نسبة المربعات التي بها اثار بعد المعاملة  $100 \times 20 / 1.5 = 7.5$
- فاعلية المبيد  $\% = 37.5 - 7.5 / 37.5 \times 100 = 80\%$

#### 6- طريقة التعليم والاطلاق :



"صيد واطلاق القوارض"

عن طريق تعليم مجموعة من القوارض ثم اطلاقها ثم يعاد الصيد ثم تحسب نسبة المعلم المصتاد الى المصتاد غير المعلم

مثال : اذا وضعت المصائد في منطقه ما و جدت بها 500 فار مثلا تعلم هذه الحيوانات ثم تترك و في اليوم التالي وجدت 200 حيوان ( 100 معلم + 100 غير معلم ) بذلك يمكن استنتاج عدد الحيوانات بالمعادلة التالية:

$$100 \text{ حيوان معلم وجدت من } 500$$

$$100 \text{ غير معلم في س}$$

#### 7- طريقة تعداد الفئران باستخدام معادلة لنكولين Lincelin :

تعتمد هذه الطريقة علي اصطياد فئران حية بواسطة المصائد الحية حيث توزع المصائد بعد تطعيمها بالطعم المناسب في المكان المراد تقدير الكثافة العددية فيه ثم تجمع الفئران المصتادة و تعلم بعلمة في الاذن بما يصعب علي الفار ازلتها ثم تطلق هذه الفئران (المعلمة) و توضع المصائد يوميا و لمدة كافية مع تعليم الفئران المصتادة واطلاقها و بعد عدة ايام تطبق المعادلة الاتية:

العدد الكلي للفئران بالمنطقة = العدد الكلي للفئران المصتادة حتي اليوم الاخير (معلمة وغير معلمة) × العدد الكلي للفئران المصتادة (معلم فقط) في اليوم قبل الاخير / عدد الفئران المعلمة في اليوم الاخير

ويعاب علي طرق التعليم والاطلاق ان الفئران المصتادة والتي اطلقت قد تخشي دخول المصائد مرة اخري لوجود ظاهرة Trap shyness ويفضل استخدامها في الابحاث البيئية فقط وتستخدم في تقدير العديد من الآفات وليس القوارض فقط

#### 8- طريقة التعليم بالإشعاع

تتم عن طريقة التعليم بمادة مشعة ويستقبل الإشعاع علي جهاز لرصدها  
فاذا كان المعلم 200 و المرصود علي الجهاز 3% يكون العدد التقريبي  
 $200/3 \times 97$

#### 9- طريقة العد بالنظر (طريقة امريكية)

قال احد الباحثين الامريكان بما ان القوارض ليلية النشاط ، فاذا رأيت فأر في النهار امامك يدل ذلك علي ان الكثافة العددية 20% واذا رأيت فأرين تكون الكثافة التقريبية 40% وهكذا. وعند رؤية فار ليلا معناه ان المنطقة بها حوالي 10 فئران

#### 10- طريقة التعداد عن طريق فحص أثار الفئران (طريقة المربعات)

تعتمد هذه الطريقة علي خبرة ودراية القائم بأعمال مكافحة القوارض. حيث يتم فحص المنطقة المراد قياس التعداد فيها من حيث الاثار التي تتركها الفئران واثار الاقدام و ذبولها... الخ. و تقسم المنطقة الي مربعات وتعد المربعات التي بها اثار الفئران فمثلا قسمت قرية ما الي 50 مربع ووجد اثار الاقدام علي 10 مربعات منها

فيكون حساب الكثافة =  $100 \times 50 / 10 = 20\%$

و علي أي حال فان الطريقة الاولي و التي تعتمد علي استخدام المصائد الحية هي الطريقة العملية و كذلك الجحور العمالة وطريقة استهلاك جريش الذرة هي من الطرق السهلة في الاستخدام لأي متدرب علي اعمال مكافحة القوارض.

#### مظاهر الإصابة في المحاصيل المختلفة بالفئران :

تختلف مظاهر الإصابة بالفئران في المحاصيل المختلفة عن الإصابة بالطيور والحيوانات الأخرى فمثلا تقوم الطيور بنزع أغلفة الحبوب مع ترك بقايا لهذه الأغلفة على شكل قطع ابريه وكذلك تقوم بأكل بعض أجزاء من الحبوب تاركة أجزاء أخرى في النباتات ام الخفاش علي سبيل المثال فقد يأكل ثمار البرتقال بنفس الطريقة التي يأكلها الفار ما عدا بعض الاختلافات التي تظهر عند أكل الخفاش لهذه الثمار حيث يركز الخفاش بأسنان الفك السفلي على السطح الداخلي لغلاف الثمرة فيظهر أثار هذه الأسنان على

شكل دائرة داخل غلاف الثمرة وعموما سوف نقوم بشرح مظاهر الإصابة في كل محصول والمراحل التي يهاجم فيها الفئران المحاصيل .

اولا : محصول القمح

تهاجم الفئران محصول القمح من بداية وضع البذور في التربة حيث تحفر على هذه الحبوب المبدورة وتصل إليها وتقوم بقرضها وإتلافها مما يدفع الفلاح لترقيع هذه المناطق التي هاجمتها الفئران وقد يقوم بإعادة زراعة أرضه مرة أخرى عندما تكون الإصابة عالية . وعندما تنمو النباتات فان الفئران عادة لا تهاجم هذه النباتات القائمة فيما عدا بعض الحالات التي لوحظ فيها أكل الفئران النباتات الخضراء القائمة وذلك عندما تكون الكثافة العددية عالية ويستمر عدم مهاجمة الفئران لنباتات القمح لحين ان يصل النبات إلى مرحلة التفرع وتكوين السنابل وحينئذ تبدأ الفئران في مهاجمة الفئران السنابل الصغيرة وقرضها من عند قاعدتها او يقوم الفار ببتير الساق على هيئة برية القلم ثم يتغذي على حبوب السنابل القمح مع تقدم عمر النبات ووصوله إلى طور النضج وفي المرحلة الأخيرة لنمو النبات ونضج الحبوب تقوم الفئران بالتغلغل داخل الحقل وعمل جحورها داخله وتكون الإصابة بداخل الحقل أكثر من الإصابة على الحواف ويستمر الحال هكذا إلى ان يتم الحصاد في شهر مايو حيث تكون الكثافة العددية للفئران قد أخذت في الزيادة مع تواجد العديد من الصغار تحت أكوام المحصول وبعد خلو الأرض من محاصيل القمح تقوم الفئران بالانتقال إلى الأراضي المجاورة المزروعة بمحاصيل أخرى لمهاجمتها مثل قصب السكر والخضروات الموجودة في ذلك الوقت .



"اضرار القوارض لمحصول القمح"

ثانيا : قصب السكر:

ترتكز الاصابة في محصول قصب السكر في فترتين

-الفترة الاولى: عند غرس العقل في التربة وذلك بنبش الفئران للعقل والتغذية عليها وعندما تبدأ الساق في

النمو حتي يصل طول النباتات حوالي متر (ابريل - يونيو) حيث يكون معظم المحاصيل الشتوية قد تم

حصادها و خاصة القمح فتهاجر الفئران من هذه المحاصيل الي القصب و كذلك تكون عيدان القصب غضه ومفضلة للفئران ويكون مظهر الإصابة للسيقان مثل برية القلم علي ارتفاع من 10 - 15 سم

الفترة الثانية: و هي فترة ما قبل الكسر ابتداء من شهر ديسمبر حيث ترقد العيدان و تتخذ الفئران من سفير القصب اعشاش لها حيث تزداد الإصابة عندما تصل لطور النضج وتحتوي علي نسبة محسوسة من السكر حيث تقرض سلاميات العيدان فيما بين العقدتين خاصة من الجزء السفلي للعيدان لأنها تحتوي علي نسبة عالية من السكر ويكون القرض علي شكل دائرة مشرشرة والتي تكون ناتجة عن الإصابة بفأر الحقل النيلي نظرا لانه يقوم بعمل جحور علي حواف الحقل والمجاري المائية وكذا لعدم مقدرته علي التسلق بينما تكون الإصابة في وسط الحقول وذلك بقرض السلميات العليا والتي يحدثها الفأر المتسلق ذو البطن الأبيض نظرا لمقدرته الفائقة علي التسلق وكذا عمل العشوش للإختباء بها وبذلك تكون الإصابة جسيمة وكبيرة نظرا لإصابة العقل السفلية والعقل العلوية مما يؤثر علي كمية المحصول النهائي وكذا ناتج السكر وبالتالي تكبد المزارع خسائر فادحة



"اضرار القوارض لمحصول القصب"


### ثالثا : محصول الذرة الشامية

يحدث الضرر للذرة الشامية بواسطة الفئران منذ بدء وضع البذور في التربة حيث تقوم الفئران بالحفر والبحث عن هذه الحبوب بعد إنباتها حيث شوهد العديد من جذور النباتات النامية ملقاه على الأرض مع قرض الحبوب ، وبعد الإنبات ونمو النباتات فانه من النادر ما تهاجم الفئران هذه النباتات حيث أنها غير



محببة للفئران لوجود حمض الايدروسيانيك في عصارة النباتات الصغيرة وتبدأ الفئران في مهاجمة الذرة الشامية .

منذ بدء تكوين الحبوب في الطور اللبني حيث تقوم بنزع الغلاف الخارجي و في قرض الحبوب سواء على شكل خطوط بطول الكوز او على شكل دوائر حولها ، وتفضل الفئران كيزان الذرة التي في الطور العجيني عن الطور اللبني وتقل الإصابة مع اشتداد او صلابة الحبوب . وتحدث غالبية الإصابة بالفئران في الثلث الخارجي للحقل بجوار حواف الترع والمصارف وتقل كلما اتجهنا الي وسط الحقل .




"اضرار القوارض لمحصول الذرة"

رابعاً: محصول الارز

تسبب الفئران خسارة في الأرز في جميع مراحل نموه وكذلك أثناء الحصاد والتجفيف والتبييض والتخزين حيث تهاجم الفئران حبوب الأرز أثناء الإنبات وتسبب خسارة كبيرة كما انها تهاجم الشتلات بعد نقلها بفترة قصيرة وعندما ينمو الارز ويكبر تهاجم الفئران الأفرع وتآكل القمم المناسبة وعندما تتكون الحبوب تهاجمها وتآكلها وعموما يتركز خطر الفئران للأرز في الفترة ما بين مرحلة التفرع ومرحلة التزهير ، وعندما تكون الكثافة العددية للفئران قليلة فان الخسارة والضرر يكون قريب من الحواجز والبتون ولكن عندما تكون الكثافة العددية عالية فان الضرر يمتد إلي داخل الحقل مع مشاهدة اكوام مفتته صغيرة من القش وقشور الأرز ناتجة عن التغذية بالفئران . مع ملاحظة ان إصابة الأرز بالفئران في أي مرحلة من مراحل النمو تؤدي الي نقص المحصول عند الحصاد حيث وجد أن عند مهاجمة الفئران للأرز بعد شتله تكون النباتات قادرة على تجديد النموات المفقودة فيها بواسطة نمو أفرع إضافية جديدة ومع ذلك فان الحبوب الناتجة من هذه الأفرع الجديدة غير قادرة على تعويض الفاقد من المحصول وكذلك وجد ان عند إصابة الأرز بالفئران في الطور اللبني يعطي حبوب فارغة . ويمكن تمييز إصابة الأرز بالفئران عن طريق قرض السنابل من القاعدة أو قرض السيقان أيضا على شكل برية القلم مع تبعثر الحبوب في الأرز عند قرض الفئران للحبوب في الأرز عند قرض الفئران للحبوب في السنابل

خامساً: الفول البلدي وفول الصويا

تهاجم الفئران محصول الفول البلدي وفول الصويا منذ بدء زراعة البذور في التربة وقد تهاجم النباتات أثناء نموها وتبدأ في مهاجمة القرون منذ بدء تكوينها و يقل مهاجمتها لهذة الحبوب في نهاية مراحل نموها وزيادة صلابتها وتنحصر مظاهر الاصابة في نوعب الفول بقرض الفئران للساق علي هيئة برية القلم وكذلك تفصيص القرون طوليا وبعثرة الحبوب تحت النباتات.



### "اضرار القوارض لمحصول الفول"

سادسا: محصول الطماطم و باقي الخضروات

تصيب الفئران معظم الخضروات في طور نضج الثمار حيث تكون الثمار محببه للفئران، و تظهر الاصابة علي الثمار علي هيئة دائرة مشرشرة منتظمة حيث تظهر شكل الاسنان و عندما تتعرض ثمار الخضروات المختلفة للإصابة بالفئران بغض النظر علي مدي الاصابة فإنها تعتبر غير علي الثمرة صالحة للتسويق

سابعا : اشجار الموالح والمانجو

تقرض الفئران الافرع الحديثة و تتغذي علي القلف علي هيئة دائرة فتأكل الكامبيوم المحتوي علي اوعية الخشب و اللحاء و تسبب جفاف الاوراق، كما انها تتغذي علي لب الثمار فتتلفها بعد التغذية علي اللب و احيانا تظهر فارغة عالقة بالأشجار او متساقطة اسفلها، كما انها تقوم بتقطيع عناقيد العنب وتهاجم الموز و ثمار المشمش و الخوخ و الكمثري و غيرها.

- و اخيرا تختلف مظاهر الاصابة والتلف بالفئران في المحاصيل المختلفة عن الاصابة بالطيور والحيوانات الأخرى فمثلا تقوم الطيور بنزع اغلفة الحبوب مع نرك بقايا لهذه الاغلفة علي شكل قطع ابرية و كذلك تقوم بأكل بعض اجزاء من الحبوب تاركة اجزاء اخري في النباتات. اما الخفاش – علي سبيل المثال – فقد يأكل ثمار البرتقال بنفس الطريقة التي يأكلها الفار ما عدا بعض الاختلافات التي تظهر عند اكل الخفاش لهذه الثمار حيث يرتكز الخفاش بأسنان الفك

السفلي علي السطح الداخلي لغلاف الثمرة فتظهر اثار هذه الاسنان علي شكل دائرة داخل غلاف الثمرة .

• يمكن تلخيص مظاهر التلف في المحاصيل المختلفة علي سبيل المثال التالي:

-القطن: تقرض الفئران سيقان النباتات و الافرع الحاملة للوز القطن علي هيئة برية القلم متغذية علي بذوره و لوزاته و تقوم بإتلاف اللوز المتفتح وتسحب الإناث الحوامل شعر القطن الي جحورها لتستخدمه فرشاه للولادة

- قصب السكر: تتغذي الفئران علي براعم القصب الطرفية و تقرض سلاميات العيدان

-الذرة الشامية: تتغذي علي الكيزان و تقرض الحبوب وذلك بعد نزع الغلاف

- الفول البلدي و اللوبيا و الفاصوليا و البسلة: تتغذي علي قرونها بفتحها طوليا واكل و تلف بذورها

- اشجار الموالح والمانجو: تقرض الفئران الافرع الحديثة و تتغذي علي القلف علي هيئة دائرة فتأكل الكامبيوم المحتوي علي اوعية الخشب و اللحاء و تسبب جفاف الاوراق، كما انها تتغذي علي لب الثمار فتتلفها بعد التغذية

#### طرق تقدير الخسائر في المحاصيل المختلفة

ترجع أهمية تقدير الخسائر الناتجة عن القوارض لعدة اسباب اهمها:

- تحديد بؤر الاصابة
  - تحديد و معرفة اكثر المحاصيل تفضلا للفئران
  - تحديد اكثر اطوار النبات قابلية للفئران و تعرضها لمهاجمتها
  - تحديد التوقيت المناسب في المكافحة
  - تحديد الحد الاقتصادي الحرج
  - تستخدم كأحد طرق تقييم نجاح اعمال المكافحة
- وفيما يلي الطرق المختلفة لتقدير الخسائر في بعض المحاصيل الرئيسية.
- أولا: تقدير الخسائر في القمح/الارز/الشعير:
- يتم اختيار مساحة قدرها (2 فدان) ويقدر طول قطرها (وليكن 250م مثلا) ثم يتم قسمة هذا الطول علي 25 وهي عدد العينات التي سيتم فحصها فيكون نتائج القسمة في هذا المثال 10 متر وهو المسافة بين العينة والتي تليها ويراعي في العينة ان تأخذ في حجم قبضة اليد ويتم عد الافرع المقطوعة والسليمة وتدون في الاستمارة الخاصة بذلك ثم يتقدم الفاحص 10 خطوات باعتبار الخطوة متر تجاوزا في اتجاه القطر ليصل للعينة الثانية وهكذا حتي يتم اخذ وفحص 25 عينة في الحقل الواحد
- وفي النهاية يتم ساب النسبة المئوية للخسارة من المعادلة التالية

النسبة المئوية للخسارة = العدد الكلي للعيان المقطوعة / العدد الكلي للعيانة المفحوصة (المقطوعة + السليمة)  $\times 100$

ثانياً: تقدير الخسائر في قصب السكر  
فتتبع الطريقة التالية:

يتم اختيار مساحة قدرها 10 افدنة ثم يحدد المسافة بين الصف والذي يليه كما يلي ذكره في الذرة ثم تحدد نقطة البداية للفاحص داخل كل صف عشوائياً علي أن يختار رقم من الجدول العشوائي ويكون هو عبارة عن عدد الخطوات التي يمشيها الفاحص من رأس الحقل داخل الصف حتي يصل لنقطة البداية ثم يتم فحص 30 عود وتحديد عدد العقل المصابة والسليمة بها (ويذهب البعض لتحديد العقل المصابة وبقمة العود وقاعدته وتحديد الإصابة الحديثة والقديمة) هذا ويراعي تحديد متوسط عدد العقل في العود الواحد وذلك بعد عد العقل في خمسة عيادان ثم يقسم علي خمسة بالنسبة لكل صف عند رأس الحقل يسجل ذلك في استمارة خاصة بذلك وفي نهاية فحص الصف العاشر يتم حساب النسبة المئوية للخسارة في القصب بالمعادلة التالية

نسبة الخسارة = (العدد الكلي للعقل المصابة / مجموع متوسط عدد العقل  $\times 30$ )  $\times 100$

ثالثاً تقدير الخسائر في الذرة الشامية:

هناك طريقتان لتقدير الخسائر تختلف باختلاف الغرض الذي زرعت من أجله الذرة الشامية:

أ- في حالة الذرة الشامية المزروعة للحبوب:

- i. يختار أيضاً أكبر عدد ممكن من حقول الذرة موزعة علي أبعاد متساوية في المنطقة كل منها حوالي فدانين.
- ii. يقدر عدد الخطوط الموجودة في كل مساحة إذا كان المحصول مزروع علي خطوط أما إذا كان مزروع في جور فيقاس طول الحقل بالخطوة.
- iii. يقسم عدد الخطوط أو الخطوات علي عدد العينات التي سوف تؤخذ من الحقل وهي 10 عينات فيكون ناتج القسمة ومضاعفاته هو أرقام العينات فإذا كان عدد الخطوط مثلاً 40 خط فسوف تؤخذ العينات من الخط 4، 8، 12، 16، ..... .
- iv. عند كل خط من خطوط العينة يختار رقم عشوائي من الجدول العشوائي وي طرح من هذا الرقم العشوائي رقم 10 ويكون الرقم الناتج هو نقطة البداية لموقع العينة فإذا كان الرقم العشوائي 38 مثال يطرح منه 10 فيكون الناتج 28 وعليه بعد 28 خطوة من رأس الحقل علي طول خط العينة وبعده تؤخذ العينات.

- v. العينة في كل خط من خطوط العينات تمثل بثلاثين نبات متتالية علي الخط بفحص هذه النباتات لتقسيم درجات الإصابة بالكيزان الموجودة في الثلاثين نبات إلي: كيزان سليمة - ربع إصابة - 75% إصابة - إصابة كلية.
- vi. يحسب في نهاية الـ 10 عينات عدد كل درجة من الدرجات السابقة.
- vii. تحسب نسبة الإصابة من المعادلة:
- نسبة الخسارة = كيزان سليمة × صفر + عدد الكيزان المصابة 25% × 0.25 + عدد الكيزان المصابة 50% × 0.50 × عدد الكيزان المصابة 75% × 0.75 + عدد المصاب كليا / المجموع الكلي للكيزان المفحوصة × 100.
- هذه الطريقة تتبع ايضا في حالة تقدير الخسائر في عبد الشمس
- ب- في حالة الذرة الشامية المزروعة للكيزان الخضراء:
- 1- يجري ما تم في الحالة السابقة من أجل الخطوات 1، 2، 3، 4.
- 2- يعد في الثلاثين نبات الكيزان المصابة والسليمة في كل خط من خطوط العينة ولا تقسم إلي درجات إصابة علي إعتبار أن أي كوز مصاب سوف يستبعد من عملية التسويق.
- 3- تحسب نسبة الخسارة من المعادلة:
- نسبة الخسارة = عدد الكيزان المصابة / المجموع الكلي للكيزان × 100
- رابعا: تقدير الخسائر في الفول البلدي وقول الصويا:
- 1) تجري نفس الخطوات الأربع الأولى في الذرة الشامية.
- 2) يقدر عدد القرون المصابة والسليمة في ثلاثين نبات
- 3) تحسب نسبة الخسارة من المعادلة:
- نسبة الخسارة = عدد القرون المصابة / المجموع الكلي للقرون × 100
- خامسا: تقدير الخسارة في الطماطم وباقي الخضروات
- يجري تقدير الخسارة في الطماطم وباقي الخضروات قبل تسويقها مباشرة حيث يجري تقدير الخسارة في الطماطم عندما يكون لون الثمار حمراء أو صفراء.
- 1- يتبع نفس الخطوات السابقة في الذرة من 1-4.
- 2- يقدر عدد الثمار الناضجة في ثلاثين نبات (المصابة والسليمة).
- 3- تحسب الخسارة من المعادلة:
- نسبة الخسارة = عدد الثمار الناضجة المصابة / المجموع الكلي للثمار الناضجة × 100
- سادسا: تقدير الخسائر في البطاطا والبطاطس
- 1) يجري نفس الخطوات التي تم إجرائها مع الطماطم والخضروات الأخرى من عد الخطوات وتحديد خطوط العينات وإستخدام الأرقام العشوائية.

(2) يعد في العينة الواحدة ثلاثين نبات أثناء حرث الأرض لتقليع النباتات وإحصاء الدرناات المصابة والسليمة.

(3) تحسب نسبة الخسارة من المعادلة:

نسبة الخسارة = عدد الدرناات المصابة / المجموع الكلي للدرناات  $\times 100$

سابعاً: تقدير الخسائر في اشجار بعض الفاكية

(أ) تقدير الخسائر في البرقوق والمشمش

(1) يختار 10 أشجار مثمرة في أماكن متفرقة وينظف الأرض تحتها في بداية الإثمار.

(2) يحسب عدد الثمار المتساقطة يوميا وتقسم إلي ثلاثة أقسام: ثمار مصابة بالفئران - ثمار مصابة بأفات أخرى - ثمار سليمة وهكذا إلي نهاية الموسم.

(3) يحسب وزن الثمار في كل شجرة وذلك بعد الثمار الموجودة علي كل شجرة في نهاية الموسم والتساقط منها ويحسب أيضا عدد الثمار الموجودة في الكيلو ومنها يمكن حساب الوزن بالكيلو.

(4) يحسب متوسط الإصابة لكل قسم وذلك من المعادلة:

نسبة الإصابة = وزن الثمار المصابة / الوزن الكلي للثمار

(ب) تقدير الخسائر في العنب

1- يختار عدد معين من الحدائق في أماكن متفرقة و يؤخذ من كل حديقة مساحة اثنين

فدان لاجراء تقدير الخسائر فيها

2- يعد في هذه المصاطب الموجود فيها الاشجار و تقسم العدد علي 10 ويكون الناتج و

مضاعفاته هو ارقام خطوط العينات

3- يؤخذ من خطوط العينات 10 شجرات من كل خط لاجراء تقدير الخسائر فيها بحيث

تكون متتالية

4- يفحص عناقيد العنب في كل شجرة و تقسم درجات الإصابة الي سليم، ربع اصابة،

نصف اصابة، ثلاث ارباع مصابة، 100% اصابة مع حساب عدد العناقيد في كل قسم

5- تحسب نسبة الإصابة بالمعادلة التي سبق ذكرها في حالة الذرة الشامية

(ج) تقدير الخسائر في الموالح

1- يختار عدد معين من حدائق الموالح في أماكن متفرقة و يؤخذ من كل حديقة مساحة واحد فدان

لتقدير الخسائر فيها

2- يؤخذ من كل حوالي 50 شجرة موالح عشوائيا و ترقم

3- ينظف حول هذه الاشجار في بداية المسم وقبل نضج الثمار وذلك بجمع الثمار المتساقطة من الموسم السابق

4- تعد الثمار المتساقطة و تقسم الي ثمار مصابة وغير مصابة و ذلك كل ثلاث ايام و حتي نهاية الموسم وذلك ابتداء من نوفمبر حتي مارس وايضا تقطف الثمار المصابة بالفئران من علي الشجرة و تعد ايضا كل ثلاث ايام

5- يحسب وزن المحصول لكل فدان و هو يساوي عدد الثمار في الشجرة الواحدة ،متوسط وزن الثمرة، عدد الاشجار في الفدان (حوالي 160 شجرة)

متوسط عدد الثمار يحسب من حساب عدد الثمار الموجودة في الكيلو و تكرر ذلك 20 مرة

6- نسبة الاصابة = وزن الثمار المصابة للفدان / الوزن الكلي للمحول في الفدان  $\times 100$

#### استراتيجية مكافحة القوارض

إلى جانب الأضرار التي تسببها القوارض، فهي تشكل حلقة مهمة في السلسلة الغذائية تدعم بقاء أنواع حية تقع فوقها في السلسلة، وتشكل مصدر تغذية لبعض المفترسات والحشرات والكائنات الرمية وتتغذى بدورها على كائنات أخرى في السلسلة الغذائية وبذلك فهي تسهم في التوازن الطبيعي في النظام الحيوي. ولكن عندما تزداد كثافة أي كائن حي عن الحد الطبيعي يتحول لأفة يجب مكافحتها وخفض كثافتها للحدود الطبيعية، فالغرض من عمليات المكافحة هو خفض أعداد الآفة وليس القضاء عليها قضاءً تاماً.

لقد قدمنا في البداية بتوضيح عادات وسلوك القوارض، وطرق تحركها وتكاثرها، وهي أمور لا بد من فهمها حتى نستطيع أن نتبع سياسات ممنهجة لمكافحة القوارض، إن نجاح عملية مكافحة القوارض مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود القوانين الخاصة والاهتمام بالنظافة العامة والتشديد على محلات بيع وتصنيع وتخزين المواد الغذائية والمطاعم من قبل الإدارات المحلية للمدن والمحافظات ودوائر الزراعة ومؤسسات الإرشاد الزراعي وما تنشره من إرشادات للمواطنين.

كانت اتجاهات مكافحة القوارض ولا زالت تعتمد على تحقيق هدفين: الأول، القضاء على أحد مصادر الأمراض التي تصيب البشر، والثاني، الحد من إتلاف أرزاق البشر. واتخذت المكافحة اتجاهين: الأول، الوقاية من القوارض قبل اللجوء لمكافحتها، وذلك بالتقيد بتصاميم أبنية ومخازن تمنع وصول القوارض إليها، والثاني، القتل بأساليب مختلفة (ميكانيكية، حياتية، كيميائية) والعمل بقدر الإمكان على تجنب الإفراط باستخدام الكيمياءويات حفاظاً على البيئة.

الإدارة المتكاملة لمكافحة للقوارض Integrated management of rodents



وتبدأ هذه الوسائل من:

1. الطرق الوقائية
2. الطرق التشريعية
3. الممارسات الزراعية المختلفة
4. الطرق الميكانيكية المختلفة مثل إغلاق الصوب في الزراعة المحمية تلافيا لدخول الآفات وكذلك استخدام المصائد المختلفة التي قد تعطي نتائج جيدة في خفض الأعداد.
5. المكافحة البيولوجية الحيوية ويقصد بها استخدام أعداء حيوية للقضاء على الآفات إذا توفرت وكانت قادرة على ذلك.
6. استخدام المكافحة الكيماوية كسلاح أخير مع مراعاة ما يلي (اختيار المبيد المناسب - استخدام الجرعة الموصي بها - استخدام آلة الرش المناسبة - في حالة الإصابة المحدودة ضرورة معاملة مناطق الإصابة فقط - مراعاة قدر الإمكان اختيار المبيدات الملائمة مع الأعداء الحيوية أو الأقل ضررا بالإنسان والبيئة)

وفيما يلي شرح مفصل عن إستراتيجية مكافحة القوارض

أولاً: الطرق الوقائية من القوارض

نعني بالطرق الوقائية ضد القوارض هنا، بوضع الموانع التي تحول دون وصول القوارض إلى داخل البيوت والمخازن والمطاعم والمستشفيات والمزارع والمدارس والمنشآت الغذائية .. وهي وسائل معمارية تتمثل بما يلي





- 1- التصميمات الصحية للمباني لمنع دخول الفئران والجرذان
- 2- أن لا تقل سماكة أسس الأبنية عن 50سم مضغوطة جيداً.
- 3- أن تغطي الأرضيات قبل التبليط بطبقة من الكونكريت الذي يتخلله شبكة من أسلاك ال (BRC) المربعة، التي تمنع تشقق الأرضيات.
- 4- أن تكون منافذ الأنابيب للمياه ومياه الصرف الصحي والتدفئة والتبريد، ملتصقة جداً بالجدر دون أي فراغ حتى لا تصبح مستقبلاً، نقاط سهلة لاختراق القوارض لتلك المنافذ..
- 5- يجب أن لا يقل ارتفاع فتحات النوافذ عن 75سم
- 6- أن تكون الشبابيك والأبواب محكمة الإغلاق، ودون ترك منافذ سفلية تحت الأبواب، كما يفضل أن تكون الأبواب الخارجية من المعادن، وإن تعذر ذلك أن يضاف جزء معدني لا يقل ارتفاعه عن 30سم في أسفل الأبواب الخارجية.
- 7- وضع سلك مجلفن علي الشبابيك و الشفاطات و إقامة حواجز من السلك المعدني على نوافذ مزارع الدواجن والتقييد ببعض الاحتياطات عند بناء الحظائر
- 8- وضع القمامة في أكياس خاصة
- 9- عدم تكديس المواد المخزونة
- 10- تخزين الحبوب في صوامع مسلحة ومعدنية.
- 11- مراقبة التقيد بالاتفاقيات العالمية للسفن والتي تشدد على التحصن من دخول القوارض ونقلها من ميناء لآخر.
- 12- باستخدام الأجهزة التي تصدر صوتاً وتعمل هذه الأجهزة على إطلاق موجات ذات تردد عال في طرد القوارض وإبعادها عن المكان المراد مكافحتها فيه
- 13- عدم ترك فضلات أو مهملات حول المباني.
- 14- عدم ترك أفرع أشجار الظل تتدلى فوق المباني
- 15- الاهتمام بالتخلص من القمامة وبقايا المزرعة بطريقة صحيحة
- 16- ...

### مثال (1) الطرق الوقائية من الإصابة بالفئران داخل الفنادق

- أهم الخطوات في السيطرة على القوارض هي طرق الوقائية لأن "الوقاية خير من العلاج"
- 1- تشييد الأبنية بشكل يمنع دخول القوارض اليها
  - 2- يمكن أن تستعين بشركة مكافحة متخصصة في إنشاء خطط مصممة خصيصاً للوقاية في منشأتك والأستماع الى نصائحهم ، والتي يمكن توزيعها في جميع أنحاء الفندق

- 3- الأهتمام بالعناية الصحية المطلوبة للنظافة وعدم تلوث أدوات الطعام.
- 4- وضع سلك حديدي علي النوافذ التي من المحتمل دخول القوارض منها
- 5- إصلاح النوافذ والأبواب المحطمة
- 6- يجب تحديد جميع مناطق الوصول الممكنة بواسطة القوارض
- 7- يجب أن تحتوي جميع حاويات القمامة على أغطية محكمة الإغلاق ويجب إزالة القمامة من المبنى يوميا
- 8- يتم تخزين جميع الأطعمة الصالحة للأكل (الغداء والوجبات الخفيفة) في حاويات مقاومة للقوارض
- 9- إزالة عوامل الجذب في القوارض مثل الطعام أو المأوى من خلال التأكد من تخزين الطعام بأمان وأن البيئة المحيطة نظيفة
- 10- يضم اي فندق عاداتنا مناطق متعددة لإعداد الطعام وتناول الطعام. يجب أن يكون لكل هذه المواقع إرشادات صارمة للنظافة مماثلة لأي مطعم للعاملين لضمان عدم ترك القوارض أو المهملات في متناول القوارض.
- 11- ينبغي أيضاً تنظيف غرف الزوار يوميا إذا تم إطعام الزوار في غرفهم. يجب تذكير الزوار بأن الوجبات الخفيفة التي تركوها وراءهم هي مغرية للآفات أيضا.
- 12- يجب إزالة الاشجار حول جدران الفندق (إن أمكن) للقضاء على أماكن اختباء مستعمرات الآفات التي تدخل المبنى
- 13- استخدام بعض المواد الطاردة مثل زرع النعناع او نثر زيت النعناع في المنزل من اشد أنواع السموم للتخلص من الفئران. حيث يعمل زيت النعناع في تشتيت الفئران عن أماكن تواجد الغذاء في المكان. او استخدام الفلفل الاسود ذلك عن طريق رشّ الفلفل في أرجاء المبنى، وخاصة في زوايا الحجرات، فيقوم الفأر باستنشاق رائحة الفلفل الأسود التي يكرها، فيقوم بالخروج من المكان لذي يتواجد فيه بسرعة إلى مكان آخر، وهذا يسهل عملية التخلص منه

### ثانياً المكافحة التشريعية



"ميناء استيراد الغلال"

من المعروف أن كل دولة تتميز بوجود عدد من أنواع النباتات التي تعيش في هذه الدولة كموطن أصلي وأيضا بهذه الدولة مجموعة من الحشرات والفطريات والبكتريا والفيروسات والنيما تودا والقواقع والحشائش التي نشأت فيه أصلا ونتيجة لما أحدثه الإنسان وما زال من تدخل يظهر اختلال في التوازن الطبيعي بين الآفات والنباتات والأعداء الحيوية والتي تشكل في مجموعها المحتوى النباتي (فلورا) وعندما يقوم الإنسان بنقل النباتات أو البذور أو التقاوي والأجزاء والمنتجات النباتية إلى بلد لم يكن يعاني من هذه الآفات أو الأمراض الوافدة إليه فإن أحدا لا يستطيع أن يتنبأ بمسلك هذه الآفات أو الأمراض المنتقلة من موطنها الأصلي إلى بيئتها الجديدة والتي ينجم عن ذلك أن تستشري هذه الآفات أو الأمراض في بيئتها الجديدة محدثة خسائر جسيمة ما كانت تحدثها في موطنها الأصلي.

ولهذا أصدرت معظم دول العالم التشريعات واللوائح التي تؤدي إلى منع أو على الأقل الحد من دخول وانتشار الآفات الأمراض. مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الحجر الزراعي سليما حيث أن القيود التي تفرض يجب أن تنفذ بقصد الرغبة في تحقيق الأهداف المقررة دون أن يؤدي ذلك إلى إعاقة حركة التجارة العالمية، أي انه يجب أن يكون هناك هدف للحماية البيولوجية خلف كل إجراء أو قيد في عمليات الحجر الزراعي وبدون ذلك فإن الحاجة إلى حجر زراعي تكون موضع شك. ولهذا فإن نطاق القيود المفروضة في نظام الحجر الزراعي في حدود ما يعتقد أنه ضروري لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا النظام.

إن منع أو تأجيل دخول الآفات والأمراض إلى الدول أمر مرغوب فيه إلا أنه كثيرا ما يغفل أهمية الحجر الزراعي كوسيلة فعالة لتحقيق ذلك والأمثلة كثيرة للآفات أو الأمراض التي دخلت واستقرت في بلدان كانت تخلو منها وذلك لتدل على الحاجة إلى نظام فعال للحجر الزراعي لإيضاح أن هذه الآفات أو الأمراض الوافدة كان يمكن منعها أو على الأقل إيقافها لفترات زمنية لا حدود لها إذا طبق نظام الحجر الزراعي في الوقت المناسب.

المكافحة التشريعية، هو سن بعض القوانين والقرارات من قبل الجهات المسؤولة بالدولة لحماية الثروة الزراعية، وذلك لوقاية المزروعات من الإصابة بالآفات ومنع انتشارها داخل حدود الدولة أو لمنع دخول آفات غير مسجلة بالدولة من الدول الأخرى وهي ممثلة فيما يعرف بالحجر الزراعي.

وتساعد جهود الحجر الزراعي سواء في المطارات أو الموانئ أو المنافذ الحدودية البرية على منع دخول الآفات والأمراض الجديدة والغير معروفة بالمنطقة، والاستعداد لمكافحتها إذا تسربت، وهذا ما يعرف بالحجر الزراعي الخارجي. وفي مجال مكافحة الآفات يتم الفحص من الجهة المستوردة ورفض المصاب منها وإعدامها في الموانئ والمطارات من قبل موظفي الحجر الزراعي المؤهلين علمياً في التعرف على الآفات المختلفة.

وجدير بالذكر أنه لا يمكن منع دخول الآفات منعاً باتاً، وذلك بسبب زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، واستعمال الطائرات في نقل المواد والشحنات الزراعية وأيضاً حرية حركة الأفراد بالسيارات بين الدول الحدودية وسهولة انتقال الآفات خاصة الحشرية بهذه الطريقة.

إن التقدم المتزايد في الإقتصاد العالمي والتطوير المتلاحق في سبل ووسائل النقل وحركة التجارة العالمية الحديثة أديا إلى تدفق دولي لشحنات النباتات والمنتجات النباتية مع ما يمكن أن تحمله من آفات نباتية قد تنقلها عبر الحدود الدولية من منطقة مصابة إلى منطقة خالية من هذه الآفات ومن هنا كانت فكرة تطبيق نظام الحجر الزراعي لتفادي أخطار الآفات

يعتبر الحجر الزراعي هو الجهاز الوحيد الموكل اليه مهمة حماية كيان الدولة من الناحية الزراعية (حماية مزروعات و حاصلات زراعية) حيث يجنب الدولة الإضرار بثرواتها الزراعية ويعمل كخط الدفاع الاول ضد الآفات.

من هنا ظهرت أهمية تواجد حجر زراعي قوي لا يعرف الاستثناءات ليكون صامدا علي جميع الثغور والمنافذ ليجابه اي مصدر لتسرب افة للبلاد ، وكذلك ليطبق تشريعات الدول الاخرى لتطبيقها علي الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج تنفيذا للمواثيق والتعهدات القانونية الدولية والاتفاقيات المالية والاقتصادية.

تعريف الحجر الزراعي Quarantine



"الحجر الزراعي"

يمكن تعريفه على أنه التشريعات والنظم التي تتحكم في حركة نقل المواد الزراعية من أجل منع أو تأخير دخول الآفات والأمراض إلى مناطق مازالت خالية منها. والأهداف التي يستهدفها الحجر الزراعي تتوقف على الظروف المحيطة وتنقسم إلى قسمين رئيسيين:

أ- منع وإعاقة دخول آفة أو مرض يصيب النباتات.

ب- المعاونة في استئصال أو مكافحة أو تأخير انتشار أي من هذه الآفات والأمراض التي تم دخولها فعلا.

انواع الحجر الزراعي

1- الحجر الزراعي الخارجي يهدف الحجر الزراعي إلى السيطرة على الآفات و منعها من الانتقال إلي داخل الجمهورية

2- الحجر الزراعي الداخلي وكذلك منع انتقال الآفات من منطقة إلى أخرى داخل الجمهورية

من مهام الحجر الزراعي

1- فحص Inspection الإرساليات النباتية والمنتجات النباتية الواردة والصادرة والعبارة والقادمة بصحبة الركاب وكذا طرود البريد

2- الاعلان عن الآفات الحجرية والآفات الغير حجرية الخاضعة للوائح

3- منع دخول الآفات الحجرية من خارج البلاد من خلال تنظم استيراد النباتات او منتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية

4- تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية

5- تحديد المناطق التي تستخدم كمناطق حجرية

6- تطبيق اجراءات حجر ما بعد الدخول حسب ما تقتضيه الحاجه

7- القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجود بالبلاد

8- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والاجهزة والمعاهد العلمية المتخصصة المحلية والخارجية للاطلاع علي المستجدات في مجال الصحة النباتية

أهمية الحجر الزراعي

يعتبر الحجر الزراعي وسيلة تشريعية من وسائل مكافحة الآفات الزراعية ووقاية المزروعات من الآفات

الاقتصادية التي تسبب ضرر للثروات الزراعية ولمنع دخول حشرات او امراض غير محلية والحد من الحشرات والامراض المتوطنة بالبلاد للمساهمة في استئصال هذه الآفات ولمنع دخول تحت النوع (sub species) غير موجودة، ولمنع انتقال هذه الآفات المحلية الي الدول الأخرى الأجنبية عن طريق الرسائل

الزراعية الصادرة او العابرة وذلك تطبيقا للمواثيق الدولية.

وتحكم قوانين الحجر الزراعي جميع اجزاء النباتات و المنتجات الزراعية التي لم يدخل عليها تصنيع او عمليات تحويل اخرجتها عن طبيعتها النباتية فيما عدا المصنوعات الخشبية وكذلك التربة والحشرات الحية او الميتة والمزارع الفطرية والبكتيرية.

وقد نظم القانون الدولي اتفاقية دولية لوقاية المزروعات تم توقيعها بتاريخ 1951/12/6 م في روما في مقر منظمة الاغذية والزراعة الفاو (F.A.O) التابعة للأمم المتحدة. وبتوثيق هذه الاتفاقية عدلت الحكومات تشريعاتها وذلك لإقامة حجر زراعي قوي ومتمين علي اسس علمية ودولية يحفظ مصلحة البلاد الأخرى والوطن.

وقامت منظمة الاغذية والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية بالحجر الزراعي في كل دولة في ترسيخ اهداف الحجر الزراعي بسن القوانين التي تحقق الاهداف المرجوة من فلسفة الحجر الزراعي. وتم تجميع هذه الصيغ لقوانين الحجر الزراعي في كل دولة في كتاب اصدرته منظمة الاغذية والزراعة (F.A.O). وكل دولة تصدر تعديلات جديده في قوانينها الحجرية وتبلغ بها منظمة الاغذية والزراعة لإضافتها الي مشمول قوانين الحجر الزراعي الدولي.

#### الشروط التي يجب توافرها لمكافحة القوارض (ملاحظات هامة يجب توافرها عند مكافحة

#### القوارض)

لكي تتواجد الفئران فلا بد من توافر ثلاث عناصر هامة (طعام وماء ومأوي) لذلك عند عملية المكافحة لا بد من استغلال اهم العناصر وهي الطعام والماء لذلك لا بد من:

- 1- يجب ان تتم عملية المكافحة عند التأكد من وجود فئران او اثارها خصوصا في المنازل ( الحد الاقتصادي الحرج الذي يجب عنده المكافحة = 1)
- 2- لا بد من البحث عن المصدر الرئيسي لمأوي الفئران
- 3- يجب ان يكون الغذاء المتوفر في المكان اقل ما يمكن حتي يجبر الفأر علي اكل الطعام.
- 4- يجب معرفة نوع القوارض المتواجد لان كل نوع له طريقة معينة وطعم خاص
- 5- اختلاف طرق المكافحة باختلاف نوعية الغطاء النباتي او اختلاف الماكن " منازل ، مزارع دواجن ، أراضي بور ، شون "
- 6- يجب إجراء عملية قبل التطعيم bre- baiting حتى لا يحدث تجنب للطعم

ثالثا: المكافحة الزراعية:

يطلق عليها الطرق الغير مباشرة للمكافحة Indirect control Methods وتهدف إلي منع حدوث الإصابة أو حفظ بعض الآفات الحشرية للمحاصيل الزراعية تحت مستوى الضرر Damage Level بواسطة

العديد من الإجراءات والعمليات الزراعية خلال فترة إنتاج المحصول وهذه العمليات هدفها جعل ظروف البيئة غير مناسبة للآفة علي الإطلاق. ويمكن تحقيق أقصى فعالية بإتباع أسلوب المكافحة الزراعية تجاه الآفات الحشرية وبالإمام الجيد بدورة حياة الآفة وعاداتها السلوكية وعلاقتها بعائلها النباتي حيث يتيح ذلك تحديد الأطوار الحساسة أو الضعيفة التي تتأثر بدرجة كبيرة بمثل هذه العمليات.

#### وتتميز طرق المكافحة الزراعية بما يلي:

- 1- أرخص طرق المكافحة فهي لا تكلف المزارع لأنها عبارة عن القيام بالإجراءات والعمليات الزراعية في أوقات لا تتلاءم ونشاط الآفات وبالتالي يؤدي ذلك إلي تقليل تعداد الآفة.
- 2- تعتبر المكافحة الزراعية هي الطريقة الوحيدة من طرق المكافحة للآفات التي تهاجم المحاصيل منخفضة القيمة والتي تزرع في مساحات كبيرة وقد تتطلب المكافحة الزراعية وقتاً طويلاً من التخطيط للوصول إلي أقصى درجة من الفاعلية حيث أن إجراءاتها تتم وتتبع قبل فترة طويلة من ظهور وانتشار الإصابة أو الضرر وبالرغم من أن الإجراءات المتبعة قد لا تؤدي إلي تحقيق المكافحة المتكاملة إلا أنها تتميز بأنها اقتصادية ولا تتطلب استعمال أي أجهزة إضافية كما إنه ليس لها أي تأثيرات جانبية علي البيئة.

#### عيوب طرق المكافحة الزراعية:

- 1- الطرق الزراعية طرقات وقائية لمنع حدوث الإصابة وليست طرق علاجية لأنها تعتمد علي تعديلات وتحويرات في وقت وطرق أداء العمليات الضرورية لإنتاج المحصول.
  - 2- لا تجذب اهتمام المزارع لأن نتائجها لا تظهر بوضوح وغير محسوسة وملموسة لأنها تتم قبل ظهور الإصابة وحدث الضرر بوقت طويل احتياطياً لما قد يحدث من ضرر في المستقبل.
- أهم الإجراءات التطبيقية التي يمكن توظيفها في أغراض المكافحة الزراعية:

- 1- الحرث العميق والرى الغزير لأراضي بجوار الأشجار وخاصة الأراضي البور حتى لا تكون وسط مناسب لتكوين جحور جديدة
- 2- فلاحه الأراضي الزراعية بعد الحصاد أو جني المحاصيل الزراعية لتدمير جحور وأعشاش الفئران وقتل الصغار داخل الجحور. ويجب التركيز على عملية الفلاحه بشكل خاص في المناطق التي تظهر فيها الإصابة في نهاية الموسم، ومع أن فلاحه بعض الأراضي الزراعية غير ممكنة بالجرارات العادية في نهاية موسم الحصاد إلا أنه لابد من فلاحتها بالجرارات ذات الاستطاعة العالية للتخلص من الفئران وتقليل فرص ظهور أضرارها في الموسم التالي.
- 3- تنظيم ميعاد الزراعة والحصاد

يعني زراعة المحصول في وقت لا تكون الآفة موجوده أو في وقت لا يتوافق مع وجود أعداد كبيرة من الآفات ومعني ذلك أن الزراعة المبكرة أو المتأخرة قد تؤدي إلي تقليل الإصابة أو النجاة منها نهائياً

4- جمع بقايا المحاصيل من الحقول بأسرع ما يمكن ، لحرمان الفئران من الغذاء، وبالتالي خفض فرص تكاثرها بسبب نقص الغذاء، وزيادة التنافس والافتتال بسبب قلة المصادر الغذائية.

5- حريق المخلفات أسفل أشجار النخيل لخنق الفئران بداخل الجحور .

6- التخلص من العشوش في إبط الجريد أثناء تقليم النخيل .

#### رابعاً: المكافحة الميكانيكية

● القتل باليد (المباشر)

● إتلاف الجحور



"جحر قارض"

● الازعاج (بيئة غير صالحة)

● استخدام المواد الطاردة مثل

- زيت النعناع: وهو زيت موجود عند العطار، حيث يتم عمل كرات من القطن ووضعها في زيت النعناع ووضع هذه القطع في الأماكن التي من الممكن تواجد الفئران فيها، ومن الممكن زراعة النعناع في حديقة المنزل لمنعها من الاقتراب منه.

- استخدام الفلفل الأسود: فإنّ هذه الطريقة مفيدة للتخلص من الصراصير أيضاً، فعند رش الأماكن والفتحات التي من الممكن أن تدخل منها الفئران بالفلفل الأسود فإنّ ذلك سيمنعه من دخول المنزل، لأنّه لا يستطيع تحمل رائحة الفلفل الأسود ولن يدخل المنزل الذي تنتشر فيه رائحته.


● استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية: وهو جهاز متوفر في الأسواق يعمل بالكهرباء، وتمنع موجاته الفئران من دخول المنزل.

● التخلص من الأتربة والحشائش على الجسور وتحت أشجار النخيل وكذلك تكسير الجحور أسفل جذوع النخيل .



- التقليل سواء للأشجار البالغة أو الخلفات مع التخلص من نواتج التقليل حتى لا تكون مخبأ للفئران لتكوين عشوش على هذه المخلفات . ويمكن إستخدام المصائد
- وضع المصائد التنكية في الحقول التي تنتشر فيها الفئران (وهي عبارة عن صفيحة زيت فارغة مفتوحة من الأعلى، توضع في حفرة مناسبة بحيث يكون فتحها بمستوى سطح التربة ويوضع بداخلها طعم جاذب، عادة ما يكون من القمح مع قليل من الزيت) ويتم الكشف عن هذه المصائد يومياً والتخلص من الفئران التي تسقط بداخلها قبل أن تنفسخ وتصدر عنها روائح تمنع دخول فئران أخرى في المصيدة التنكية. يقوم بعض المزارعين باستخدام بعض الوسائل التقليدية في القضاء على الفئران مثل تطويق الجحور بالماء (في حال توفر مصدر قريب للمياه) وقتل الفئران بعد خروجها من الجحور بواسطة العصا. وبعضهم من يستخدم الغاز عادم الدراجات النارية لإخراج الفئران من جحورها ثم قتلها بعد خروجها من الجحور ، وبعضهم من يستخدم بنادق الصيد في القضاء على الفئران. ولكن استخدام هذه الطرق عادة ما يكون على نطاق ضيق وهي مفيدة ولكنها لا تعتبر كافية للقضاء على الفئران في حالات الانفجار الوبائي.
- الإهتمام ببناء الصوامع والشون المحكمة الإغلاق حتى لا تكون سبب في زيادة الفاقد بفعل القوارض .

#### ● استخدام مصائد الفئران



"مصيدة فئران"

حيث يوجد منها أشكال متعددة . ولكن بصفة عامة فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- المصائد الصندوقية أو السلكية، وتصمم بعدة أشكال ؛ فتكون ؛على شكل صندوق خشبي أو شبك حديدي أو من الورق المقوى و به فتحة مصممة بطريقة تسمح بدخول الفأر ولا تسمح بخروجه ، حيث يوضع به غذاء محبب للفأر مخلوط بالسم (طعم) أو بدونه.
- (ب) المصائد الزنبركية أو القاتلة.

(ج) المصائد الصمغية اللاصقة، هي مناسبة للفئران المنزلية الصغيرة أكثر من غيرها ، حيث تستخدم مادة صمغية مثبتة على ورق مقوى توضع في الطريق المحتمل لمرور الفئران الصغيرة فتلتصق بها عندما تحاول عبورها.

مميزات المصائد: تتميز المصائد عن غيرها من طرق مقاومة الفئران بما يلي:

- غير مكلفة على المدى الطويل.
- لا تستدعي بالضرورة استخدام المواد الكيميائية التي قد تضر بالعمالة أو رؤاد المنشأة ، والتي قد تلوث الأغذية بطريقة غير مباشرة.
- السموم الكيميائية يمكن أن تقتل الفأر في مكان يصعب الوصول إليه ، مما ينشأ عنه رائحة كريهة ويكون مصدراً للعدوى بالميكروبات والطفيليات.
- يمكن الحصول على صورة أوضح عن مجتمع الفئران في المنشأة الغذائية، حيث يمكن الحصول على سجل عن عدد الفئران التي تم إصطيادها وأنواعها... إلخ

تعتبر مقاومة الفئران باستخدام المصائد من اقدم الطرق المعروفة 'وما زالت تستخدم حيث انها طريقة محببة لدى الفلاحين وتستخدم المصائد في عمليات المقاومة اذا كانت على نطاق ضيق في البيوت او المخازن او في مساحات صغيرة في الأراضي الزراعية .

وتستخدم المصائد بجانب عمليات المقاومة في الاغراض الاتية:

- تحديد وتصنيف الانواع التي تصطادها المصائد في منطقة ما.
- الحصول على عينات حية تستخدم في التجارب العلمية.
- اعطاء مؤشر للكثافة العددية للفئران في منطقة ما . وذلك عن طريق عدد الفئران المصادة ليلا فاذا كان عدد الفئران المصتادة من صفر- 5 فار لكل 100 مصيدة ليلا دل ذلك على ان الاصابة خفيفة وان العائد من عمليات المقاومة لا تساوى تكاليف المقاومة والعمالة . واذا كان عدد الفئران المصتادة من 6-10 فار لكل 100 مصيدة في الليلة الواحدة فان الاصابة عالية بدرجة تمثل خطورة وانه يجب البدء في عمليات المقاومة . واذا كان عدد الفئران المصتادة اعلى من 11 فار لكل 100 مصيدة في الليلة الواحدة فهذا يعنى ان المشكلة في غاية الخطورة .

#### استعمال المصائد في المنازل

- توضع المصائد في الاماكن المعزولة وغير المكشوفة التي ترتادها الفئران.
- يجب الابتعاد عن وضع المصائد عن الاماكن التي يرتادها الانسان.
- توضع المصائد موازية مع الحوائط او الاجسام الصلبة .

- توضع المصائد في آخر النهار بحيث تستمر طوال الليل حيث تبحث الفئران ليلا عن غذائها ثم تجمع الفئران المصتادة صباحا .

- عدم وضع المصيدة باستمرار

- غسل المصيدة بعد عملية الصيد

#### استعمال المصائد في الحقول

تستخدم المصائد لمكافحة الفئران في الحقول على نطاق ضيق . ويستلزم ذلك وضع اعداد كبيرة من المصائد وهذا في حد ذاته باهظ التكاليف ويحتاج الى رعاية واهتمام دائم . وتستخدم المصائد في مقاومة الفئران العادية ، اما الفئران التي تعتمد في تغذيتها على الغذاء تحت سطح التربة حيث نادرا ما تتحرك فوق سطح التربة فان إستخدام المصائد لايجدى معها.

وعند وضع المصائد في الحقول تختار الاماكن التي تتواجد فيها الفئران لوضع المصائد فيها وتوضع المصائد على ابعاد 15 متر على حافة الحقل وقنوات الري وكذلك الأراضي البور بالقرب من جحور الفئران او الاماكن التي تتواجد فيها الحشائش والنجيل . كما يجب وضعها بعيدا عن الاماكن التي يرتادها الانسان والحيوان وكذلك يجب وضعها مختبئة حتى لا تكون عرضة للسرقة . وقبل وضع المصائد يعمل رسم كروكي للمنطقة التي توضع فيها المصائد مبينا عليها اماكن وضع المصائد حتى يمكن العثور عليها عند متابعتها مع وضع علامة بجوار كل مصيدة مثل وضع اعلام .

#### طعوم المصائد

ان نجاح استخدام المصائد يعتمد بالدرجة الاولى على نوع الطعم المستخدم معها فلا بد ان تتوفر

#### في طعوم المصائد

- 1- يجب ان لا تفسد بسرعة.
  - 2- ان لا يكون هشاً حتى يمكن تثبيتته بزناد المصيدة.
  - 3- يجب ان تقبل عليه الفئران.
  - 4- عند اختيار الطعم المناسب يراعى نوع الفئران السائدة في المنطقة .
  - 5- يجب تغير الطعوم دائما كل يوم بحيث تكون طازجة.
- وهذه امثلة لبعض الطعوم التي يمكن اسخدامها مع بعض الفئران :
- جبن- خضروات مثل الطماطم و الخيار- ما تبقي من اكل الانسان وهكذا

#### خامسا: المكافحة البيولوجية (الحيوية) للقوارض

تقود الزيادة العددية لمجتمعات الفئران في سنوات الانفجار إلى ارتفاع أعداد المفترسات وخاصة البوم الذي يتغذى بشكل أساسي على القوارض Voles وتتوجه المفترسات الأخرى إلى المناطق الموبوءة مما

يؤدي لانخفاض أعداد الفئران بشكل سريع وحاد، ولكن دور الأعداء الطبيعية المنتشرة في بيئة الآفة يكون قليلاً عند بدء ظهور الانفجار العددي وهناك العديد من مفترسات القوارض التي تلعب دور هام في الحد من تعدادها والقضاء عليها وأول هذه المفترسات المعروفة هي القطط وعموما تقسم المفترسات إلى

### الفقاريات.

من المفترسات الثديية التي تتغذى على القوارض في البراري وفي المناطق الزراعية الثعلب Fox وابن أوى Jackal والغرير والقطط والثعلب الأحمر ألفينك والعرس والتركان والنمس والعناق ولكن كثافة هذه الثدييات أصبحت قليلة حالياً بسبب الخلل في التوازن الطبيعي الذي حدث نتيجة التطورات ، إضافة لقتل هذه الكائنات من قبل الصيادين بدوافع مختلفة، مما قلل من أهميتها كأعداء حيوية للفئران.



"افتراس القطط للفئران"

### الطيور الجارحة:



"طائر مفترس"

ومن أهم الطيور التي تلعب دور هام في مكافحة القوارض الحداة والصقور والنسور والعقاب وصقر باز والغراب ذو الرقبة البني والغراب ذو الذيل المروحي وابوقردان والقلق والحبارى وطائر الجزار ونتيجة المراقبة المستمرة لوحظ أنه يتم افتراس القوارض بشكل كبير من قبل البوم والطيور الجارحة عموماً ، ولكن دور الطيور ليلية النشاط يعتبر أكثر أهمية في مكافحة القوارض لأن نشاطها يتوافق مع نشاط القوارض الليلي بشكل عام، قد أظهرت دراساتنا السابقة أنه يمكن لطائر واحد من البوم (البومة

البيضاء Tyto alba أن يفترس 500-600 فأر سنوياً مما يشير إلى دورها الكبير كعدو حيوي للقوارض في بيئتنا المحلية. لذلك ينصح باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ عليها وصيانتها وزيادة الجهود لرفع مستوى الوعي الجماهيري عن أهميتها في البيئة، خاصة وأن طائر البوم يعتبر تبعاً للخرافات والاعتقادات المحلية عند البعض في منطقتنا رمزاً للشؤم خلافاً لما هو عليه واقع الحال. فهي رمز لحيوية البيئة وتنوعها.

الزواحف:



"الزواحف المفترسة للقوارض"

ليس للأفاعي والثعابين المختلفة أي دور في مكافحة القوارض في بداية موسم النمو الذي يتوافق مع بداية موسم البرد والهطول المطري بحيث تكون الأفاعي في طور السبات الشتوي، ولكن دورها كعدو حيوي للفئران يبدأ مع انتهاء موسم البرد وتفيد معرفة هذا النقطة في أن مبيدات القوارض التي تستخدم لمكافحة الفئران لا تؤثر على الأفاعي عند استخدامها بعد دخولها السبات الشتوي. ومن هنا تتضح أهمية إدراك جميع العوامل التي تحيط بالآفة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الصحيحة التي من شأنها تحديد أنسب توقيت لاستخدام المبيدات الكيميائية بحيث تسبب أكبر فاعلية ممكنة وبأقل ضرر ممكن للبيئة وللأعداء الحيوية

#### سادساً: مكافحة الكيماوية للقوارض

يطلق على المواد الكيميائية التي تستخدم لمكافحة القوارض "مبيدات القوارض" ويجب ملاحظة أن هذه المواد سامة للإنسان والحيوانات الأليفة، ولا تعرف مادة فعالة ضد القوارض وليس لها أي تأثير ضد الإنسان. ولهذا يجب عند الحاجة لإحدى هذه المواد الكيميائية ملاحظة ما يلي:

(أ) عند التفكير في استعمال المواد الكيميائية يجب إستشارة أحد المختصين في ذلك ، ويفضل إستشارة الجهات الحكومية المختصة بشأن إختيار المادة المناسبة وطريقة الإستعمال.

(ب) إتباع إرشادات المصنع.

- (ج) يجب إبعاد السموم عن الأماكن التي يمكن أن تصل منها إلى الغذاء بأي صورة.
- (د) لا يستخدم سم يشبه أية مادة غذائية أو مادة مضافة للأغذية خوفاً من أن يحدث خلط بين هذه المادة والسم.



"مبيد للقوارض"

وتستخدم لمكافحة القوارض في العالم عدداً كبيراً من مبيدات القوارض ولا نستخدم منها إلى مبيد فوسفيد الزنك، ومبيد فوسفيد الألمنيوم في حالات خاصة. ومن المفيد التعرف على مبيدات القوارض المستخدمة لمكافحة القوارض على حد سواء، والتي تستخدم حالياً في دول العالم المتطورة، وخاصة أن تلك الدول ابتعدت عن استخدام المبيدات التي تسبب أضراراً كبيراً للبيئة ولللكائنات غير المستهدفة في مكافحة وللأعداء الحيوية التي عادة ما يكون أثر المبيد عليها أكبر من أثره على الآفة المستهدفة ذاتها. تتوفر مبيدات القوارض على شكل طعوم معدية صلبة أو سائلة أو مساحيق احتكاك، أو على شكل غازات سامة، لتناسب عمليات مكافحة في جميع الحالات والظروف، وتقسم مبيدات القوارض تبعاً لسرعة تأثير المادة الفعالة إلى مجموعتين أساسيتين:

- المركبات ذات السمية الحادة أو سريعة التأثير Acute Rodenticides .
- المركبات ذات السمية المزمنة، أو بطيئة التأثير ، Chronic Rodenticides . (مانعات تخثر الدم- مانعات تجلط الدم).

وتشير بعض المراجع إلى وجود مجموعة ثالثة هي المركبات ذات السمية المتوسطة Subacute Rodenticides وتقع بين المجموعتين السابقتين من حيث سرعة التأثير على الكائنات الحية.

\*\*مبيدات القوارض ذات السمية الحادة، أو سريعة التأثير: Acute Rodenticides

يعود تاريخ استخدامها لعدة مئات من السنين، ويتضح من تسمية هذه المجموعة، أن أعراض التسمم تظهر بسرعة بعد تناول الحيوان لجرعة كافية من المبيد (غالباً خلال 24 ساعة) ، وقد تظهر أعراض التسمم خلال بضع دقائق عند استخدام بعض المركبات. تستخدم هذه المركبات بتركيز عالية نسبياً في الطعوم، وغالباً ما تكون جزيئاتها غير معقدة، وتكاليف إنتاجها رخيصة نسبياً، ولكن من أهم عيوبها عدم وجود ترياق Antidote متخصص لاستخدامه

لعلاج حالات التسمم العرضي بهذه المبيدات، إضافة إلى أن آلية تأثيرها السريع لا تترك وقتاً كافياً للقيام بإجراءات العلاج (حتى لو توفر الترياق المتخصص). وبسبب سميتها العالية للحيوانات غير المستهدفة وخاصة الإنسان، منع استخدام معظمها في العديد من دول العالم، ولا يسمح باستخدامها إلا من قبل المتخصصين فقط، وفي مناطق محددة، ويحظر استخدامها في المناطق السكنية.

من مساوئ هذه المبيدات أيضاً تطور ظاهرة الحذر Shyness عند القوارض تجاه الطعوم، فالعديد من القوارض وخاصة الجرذان تحجم عن مهاجمة أي مواد جديدة، وترفض التغذية مباشرة على الطعام الجديد وتكتفي بالتغذي على كمية قليلة منه لأول مرة. ولهذا السلوك تأثير أساسي على استخدام المبيدات ذات السمية الحادة (سريعة التأثير) فاستهلاك كمية قليلة من الطعم السام يسبب اضطرابات للقوارض دون أن يؤدي لموته، وعادة ما ترفض الحيوانات المتأثرة التغذية على الطعم السام في المرات القادمة، مما يؤدي لفشل المبيد في تحقيق الفعالية المرجوة. وقد تتطور ظاهرة الحذر تجاه المادة السامة Poison shyness أو تجاه المادة الحاملة للمادة السامة (قاعدة الطعم) Bait shyness وربما ترفض التغذية من أوعية الطعوم حتى لو تم استبدال الطعم السام بأخر غير مسمم، وأحياناً ما تتجنب زيارة المنطقة التي وضع فيها الطعم السام.

#### 1- مجالات استخدام المبيدات ذات السمية الحادة:

سرعة التأثير هي من أهم صفات هذه المبيدات، ففي حال الكثافة العالية لمجتمعات القوارض في المستودعات يؤدي إلى استخدامها بتطبيق إجراء عملي يسمى التطعيم المباشر Direct Poisoning إلى خفض سريع لكثافة الآفة وللأضرار التي تسببها. فهي تحقق بذلك رغبة المستخدم في الحصول على نتائج سريعة لعملية المكافحة، وخفض سريع للأضرار.

تعد الكفاءة الاقتصادية نقطة هامة عند وضع برنامج المكافحة، فالمكافحة بالمبيدات سريعة التأثير، تتطلب كميات قليلة نسبياً من الطعوم بالمقارنة مع المبيدات بطيئة التأثير خاصة مشاهبات الوارفارين (مبيدات الجيل الأول من مانعات التخثر) التي تتطلب الاستمرار في تقديم الطعوم لعدة أيام مما يترتب عليه صرف كميات كبيرة من الطعوم غالية الثمن نسبياً، كما يمكن استخدامها بنجاح في مكافحة الأفراد المقاومة لمبيدات الجيل الأول من مانعات التخثر مثل الوارفارين وذلك لاختلاف طريقة تأثيرها، برغم أن مبيدات الجيل الثاني من مانعات التخثر طورت بغرض مكافحة القوارض المقاومة لمبيدات الجيل الأول. بعض المبيدات ذات السمية الحادة

#### 1- فوسفيد الزنك (Zn<sub>3</sub>P<sub>2</sub>)



**"مبيد فوسفيد الزنك"**

الاسم الكيميائي: حسب الاتحاد الدولي للكيمياء التطبيقية IUPAC متبوعاً بأرقام التسجيل في

CAS RN | 1314-84-7 | Zinc Phosphide

آلية التأثير: يتحرر غاز الفوسفين PH في الوسط الأحامضي للمعدة، ثم ينتقل إلى تيار الدم ويسبب ضعفاً في عضلة القلب وأضراراً بأجهزة الجسم الداخلية، ليس له ترياق متخصص وهو مركب سام لجميع الفقاريات قيم LD<sub>50</sub> للخنزير من 20-40 ملغ/كغ. من أكثر مبيدات القوارض ذات السمية الحادة استخداماً، وهو متوفر على شكل بودرة سوداء أو رمادية اللون بنقاوة 80-95% له رائحة تشبه رائحة الثوم، يستخدم عالمياً بتركيز تتراوح من 1-5% والتركيز الأكثر استخداماً هو 2%، سميته عالية وسعره منخفض نسبياً.

يوزع كمادة فعالة، ويتم خلطه من قبل المختصين مع مواد حاملة مختلفة، وقد أثبتت الدراسات المحلية أن أفضلها الحبوب الكاملة للقمح والذرة، بحيث تلبي هذه الطعوم رغبات سلوكية عند الفئران، هي الإمساك بالطعم بكلتا اليدين أثناء التغذية وتحقيق رغبة القارض في شحذ قواطعه التي تنمو باستمرار طيلة حياة القارض.

تشير العديد من تقارير منظمة الأغذية الزراعية العالمية FAO إلى انخفاض فعالية وسمية الطعوم المحضرة من فوسفيد الزنك بعد عدة أيام من التحضير، وتلعب درجة حرارة الوسط المحيط ورطوبته دوراً كبيراً في خفض فاعلية الطعوم، ولذلك يفضل استخدامه مباشرة بعد التحضير. اعراض التسمم بالمبيد

انبطاح الفئران اثناء مشيها مع الشعور بالغثيان وضيق التنفس والهيجان والشعور بالبرودة وتموت الفئران وبطونها منتفخة وكأنها بدون ارجل وذيولها ممطوطة. تحضير الطعوم:

- يجب أن يتم اختيار قاعدة الطعم (المادة الحاملة) من الحبوب الجيدة والسليمة بحيث تكون قادرة على منافسة الحبوب المخزونة لدى الفئران.
- تنقع حبوب القمح أو الذرة بالماء لمدة 6-12 ساعة ثم تنشف بحيث تصل لرتوبة مقدارها 30-40%، والغرض من عملية الترطيب هذه هو تسهيل توزيع جزئيات المبيد على سطح الحبوب وقد يتم الاستغناء عن هذه الخطوة ويتم الخلط مباشرة بدون نقع البذور.
- يضاف 2.5% من الزيت النباتي إلى الحبوب المنشفة وتخلط خلطاً جيداً، والغرض من إضافة الزيت هو المساعدة على التصاق جزئيات المبيد على سطح الحبوب.
- يضاف 2-3% من بودرة مبيد فوسفيد الزنك إلى الحبوب المرطبة والمخلوطة بالزيت (وتحسب هذه النسبة على أساس وزن الحبوب الجافة) تكرر عملية الخلط بحيث يتوزع المبيد ويلتصق على سطح الحبوب، وبذلك يصبح الطعم جاهزاً للاستخدام.





### "خلط مبيد فوسفيد الزنك للقوارض"

#### توزيع الطعوم:

قبل البدء بتوزيع الطعوم داخل فتحات الجحور يجب تحديد الفعال منها أولاً، وذلك عن طريق سد جميع فتحات الجحور في المنطقة المراد معاملةها. وفي صباح اليوم التالي نقوم بوضع الطعوم المجهزة في الجحور الفعالة (التي فتحها الفئران أثناء الليل) وبمعدل 3-4 غرامات (ما يعادل ملء ملعقة طعام كبيرة من الحبوب).  
ملاحظة: إذا كانت طبيعة التربة لا تسمح بسد فتحات الجحور يكفي إضافة الطعم في جحر واحد من أصل ثلاثة جحور متجاورة، على أن يتم تحديد عدد الجحور الفعالة في المنطقة المراد مكافحتها من قبل متخصص، وبذلك نقلل من الهدر ومن جهود ونفقات عملية المكافحة ومن الأضرار البيئية بمعدل %66.

تحتسب نسبة انخفاض الجحور الفعالة في المساحة المختبر بعد المعاملة كمؤشر على فعالية المكافحة من المعادلة التالية:

النسبة المتوية لانخفاض عدد الجحور = 100 - (عدد الجحور الفعالة بعد المكافحة ÷ عدد الجحور الفعالة قبل المكافحة) × 100 .

وتقييم فاعلية المكافحة (للمختصين):

لتقييم فاعلية طعوم فوسفيد الزنك بما يلي:

1- اختيار مكان مناسب لتنفيذ تجربة تقييم فاعلية الطعوم، حيث يتم اختيار مستعمرة فئران معزولة بمساحة تجريبية 1000 متر مربع على أن يكون عدد الجحور الفعالة فيها لا يقل عن 30-40 جحراً فعالاً. وذلك بسد كافة الفتحات في منطقة تنفيذ التجربة في اليوم الأول، وعد ما تعيد الفئران فتحه في اليوم التالي. (يسجل هذا الرقم ويسمى عدد الجحور الفعالة قبل المعاملة).

- 2- تعامل الجحور الفعالة بوضع 3-4 غرامات من الطعم السام في كل جحر، وتترك مفتوحة.
- 3- بعد 48 ساعة من المعاملة نقوم بسد جميع الفتحات في منطقة الاختبار.
- 4- في اليوم التالي نقوم بعد الجحور التي عاودت الفئران فتحها في المنطقة المعاملة (ويسجل هذا الرقم ويسمى عدد الجحور الفعالة بعد المعاملة).
- تحسب نسبة انخفاض الجحور الفعالة في المساحة المختبر بعد المعاملة كمؤشر على فعالية المكافحة من المعادلة التالية :
- النسبة المئوية لانخفاض عدد الجحور = 100 - (عدد الجحور الفعالة بعد المكافحة ÷ عدد الجحور الفعالة قبل المكافحة) × 100 .

مبيد فوسفيد الزنك كمبيد احتكاك:

لوحظ أثناء الانفجار الوبائي الذي حدث في إحدى دول العالم خلال الفترة 1998-1999 ونتيجة لفشل المكافحة باستخدام طعوم فوسفيد الزنك اللجوء إلى معاملة جحور الفئران بخليط من الطحين (دقيق القمح) بنسبة 95% ÷ 5% من بودرة فوسفيد الزنك على أنه مسحوق احتكاك. وتجدر الإشارة إلى أن مبيدات الاحتكاك لا تستخدم لمكافحة القوارض، والسبب في ذلك أن مبيدات الاحتكاك عادة ما تستخدم في الممرات الإلجبارية للفئران، وفي حال وجود مداخل ومخارج كثيرة لا تعتبر هذه العملية مجدية حتى لو حققت فعالية قليلة. إضافة إلى ذلك فإن التيارات الهوائية تعمل على تطاير هذا الخليط مسببة تلوثاً كبيراً لعناصر البيئة المختلفة، وإنما تستخدم مساحيق الاحتكاك لمكافحة الفئران داخل الأماكن المغلقة وبتركيز تتراوح من 15-20% وليس بتركيز 5%. لذلك لا يجوز تبني أفكار المكافحة وتنفيذها انطلاقاً من قراءة عامة لطريقة مكافحة الآفات.

2- فوسفيد الألمنيوم Aluminum Phosphide



"اقراص الفوستوكسين للقوارض"

الاسم الكيميائية متبوعاً برقم التسجيل

## Phosphide 20859-73-8 CAS: Aluminum

متوفر على شكل أقراص بوزن 0.6 غرام أو كريات بوزن 3 غرام ، تطلق المادة الفعالة للمبيد غاز الفوسفين  $PH_3$  عند تعرضها للرطوبة (الجوية أو الأرضية).

يستخدم عادة في مكافحة الآفات الحشرية للمواد المخزونة، كما يستخدم لمكافحة القوارض في الأماكن المغلقة، وفي الحقول الزراعية في حال فشل الطرق التقليدية للمكافحة أو صعوبة تطبيقها. غاز الفوسفين المتحرر ذو سمية مرتفعة لجميع الثدييات ، لذلك فهو فعال ضد جميع أنواع القوارض.

طريقة الاستخدام:

بعد سد جميع فتحات الجحور في المنطقة المراد مكافحتها، وتحديد الفعال منها، يتم وضع قرص بوزن 0.6 غرام داخل كل جحر فعال ثم يغلق بالتراب لمنع تسرب غاز الفوسفين من أنظمة الجحور. يجب الانتباه لعدم ردم الأقراص بالتراب عند سد الجحور ، ولتلافي الفوسفين من أنظمة الجحور. بوزن 0.6 جرام وفي المناطق في حال فشل سد تلك الجحور يمكن وضع مقدار قبضة اليد من الأعشاب الخضراء أو من الورق في فتحة الجحر بعد وضع القرص قبل إغلاق الجحر بالتراب.

لوحظ أن فعالية مبيد فوسفيد الألمنيوم كانت منخفضة نسبياً، ويمكن رد ذلك إلى الرطوبة الأرضية المنخفضة لحظة المعاملة بالمقارنة مع المناطق الأخرى لنفس الفترة ن إضافة لانتشار بؤر الجحور على حواف الطرقات الصخرية ، مما يزيد من صعوبة إحكام إغلاق الجحور المعاملة وبالتالي تسرب نسبة من غاز الفوسفين مما أدى إلى انخفاض فاعلية المعاملة. بينما كانت نتائج المعاملة بسبب ارتفاع الرطوبة الأرضية وطبيعة التربة التي تساعد في إحكام سد الجحور ومنع تسرب غاز الفوسفين.

تؤكد نتيجة هذه التجربة ونتائج أبحاث سابقة أجريت في مناطق أخرى من العالم لتحديد فاعلية مبيد فوسفيد الألمنيوم في مكافحة القوارض أن فعالية مبيد الألمنيوم تكون في أعلى قيمها في المناطق ذات الرطوبة العالية.

لا يستخدم مبيد فوسفيد الألمنيوم لمكافحة جحور الفئران في فصل الصيف بسبب قلة الرطوبة الأرضية ، فقد ذكر الباحث Richards 1982 بأن إضافة الماء بعد وضع أقراص الألمنيوم داخل الجحور يمكن أن يحسن من نتائج المكافحة، في حين ذكر Greaves 1989 أن إغلاق الجحور بالأعشاب الخضراء بعد وضع أقراص فوسفيد الألمنيوم يؤدي إلى تسريع تحرر غاز الفوسفين لتحسين نتائج المكافحة، وهذه التوصيات تتبع عند ضرورة استخدام هذا المبيد في فصل الصيف في حالات خاصة.

طريقة عمل المبيد و اعراض التسمم بالمبيد

كما في فوسفيد الزنك .

من قواعد الأمان العامة في التعامل مع فوسفيد الألمنيوم ما يلي:

(1) فتح عبوة المبيد في مناطق مهواه بعيداً عن الوجه، وإحكام إغلاق العبوة بعد استخدامها وحفظها في مكان جاف.

- (2) لا يستخدم المبيد أثناء الهطول المطري.  
 (3) لا يستخدم المبيد أثناء هبوب الرياح القوية.  
 (4) لا يوجد ترياق متخصص لمعالجة التسمم بغاز الفوسفين الذي يتحرر من مبيد فوسفيد الألمنيوم.

تقييم فاعلية المكافحة عند استخدام مبيد فوسفيد الألمنيوم:  
 تطبق جميع الخطوات المستخدمة في تطبيق فعالية طعوم مبيد فوسفيد الزنك، إلا أن الجحور تغلق لحظة وضع الأقراص ويتم تقييم الفعالية في صباح اليوم التالي من المعاملة، وليس بعد 48 ساعة كما هو الحال عند استخدام طعوم فوسفيد الزنك. والسبب في ذلك أن مبيد فوسفيد الألمنيوم يحقق موت الفئران بعد فترة قصيرة (أقل من ساعة) بكونه مبيد غازي (مدخن) ولا حاجة لإطالة الفترة لزيادة فرص تعرض الفئران للمبيد كما هو الحال عند تقديم فعالية الطعوم المعدية.

### 3- بصل العنصل الأحمر Red Squill

مركب عضوي يستخرج من أبصال نبات العنصل *Urginea maritime* الذي ينمو في منطقة حوض البحر المتوسط، المادة الفعالة هي السيليروسيد *Scillirocide*، تظهر سمية المستخلص الخام من الأبصال للقوارض نتائج متباينة. المستخلص النقي متوفر تحت اسم تجاري *Silmurin*، وهو سام جداً للفئران والجرذان، يتراوح تركيز المادة الفعالة في الطعوم من 0.015 – 0.05 % سجلت أعراض عدم استساغة القوارض لطعوم هذا المركب، تظهر أعراض التسمم على شكل شلل للأطراف الخلفية، تشنجات واضطرابات عنيفة، تبول وإسهالات مستمرة، يمكن استخدام سلفات الأتروبين كترىاق *Antidote*.

#### اعراض التسمم بالمبيد

بسبب التسمم بهذا المركب توقف القلب عن عمله وكذلك يؤثر على الجهاز العصبي. وفي الفئران فانه تظهر عليه الرعشة والارتجاف وكذلك الشلل وخاصة الاطراف الخلفية. كما انه من اعراض التسمم الاسهال وزيادة البول. وتظهر الاعراض بعد ساعتين من تناول السم ويحدث الموت تقريبا بعد 24 – 48 ساعة. وعلى ذلك يمكن القول بان هذا المركب سام جدا.

#### 4- سلفات الثاليوم: *Thallium sulphate*

على شكل بلورات صلبة عديمة اللون أو الرائحة، ويعتبره بعض الباحثين عديم الطعم ولكن الجرذان البنية *R.norvegicus* يمكنها تمييزه في المحاليل المائية عند التركيز 0.25% يوصى باستخدامه في الطعوم بتراكيز تتراوح من 0.5-1.5 % وخلافاً لباقي المركبات ذات السمية الحادة لايسبب هذا المركب ظاهرة الاشتباه والتجنب من الطعوم عند القوارض. في الاختبارات المخبرية في الدانمرك كان فعالاً ضد

الجرذ النزويجي عند التركيز 0.8% ، وفي الاختبارات الحقلية في بريطانيا أظهر عند التركيز 0.3% فعالية تعادل فعالية فوسفيد الزنك بتركيز 2.5%.

يتصف هذا المركب مثل باقي المركبات سريعة التأثير بالسمية المرتفعة للفقاريات ولا يوجد له ترياق، لم يستخدم هذا المبيد لفترة طويلة وقد تم تنسيقه في معظم دول العالم بما فيها أستراليا التي كانت تستخدمه بشكل واسع لمكافحة الجرذان في حقول قصب السكر.

5- أحادي فلورو أسيتات الصوديوم Sodium (mono) flooroacetat :1080

يعرف هذا المركب باسمه التجاري المركب 1080 وهو سام جداً للقوارض، يستخدم في الطعوم بتركيز تتراوح من 0.08-0.5% للمادة الفعالة. وما زال يستخدم حتى الآن في مكافحة القوارض في أنظمة الصرف الصحي في بريطانيا، أما عالمياً فيستخدم بحالات خاصة جداً ويحذر شديد بسبب سميته العالية للفقاريات وعدم تخصصه وعدم توفر ترياق متخصص.

وهناك العديد من المركبات التي كانت تستخدم في الماضي، ولكن استخدامها في مكافحة القوارض توقف عملياً، مثل: المركب Pyriminys اسمه التجاري vacor والمركب Silatrane والمركب Norbormid والمركب Crimidine والمركب ANTU.

#### طريقة عمل المبيد:

تتلخص طريقة عمله في اظهار سميته بانه يتفاعل مع حمض الستريك في دورة كرب Krebs cycle ليكون حامض الفلوروستريك وبالتالي يوقف هذه الدورة التي تعتبر اساسية في الكائنات الحية للتخلص من اليوريا في البول.

#### اعراض التسمم بالمبيد

تختلف الاعراض باختلاف انواع الحيوانات، وتظهر الاعراض تقريبا بعد ساعة من تناول السم وتشمل انقباض العضلات واختلال نظام القلب وضيق في التنفس ويحدث المت تقريبا في ساعات قليلة ولا يعرف antidote (دواء) للتسمم بهذا المركب. وان كان يمكن استخدام الالاسيتاميد وسكر القصب والايثانول في علاج التسمم بهذا المركب مع اجبار الشخص على التقيؤ، كما انه يمكن استخام مشتقات ال Barbiturates للتحكم في عمليات الرعشة والارتجاف التي تصيب الشخص المتسمم.

6- فلوروأسيتاميد FNO 1081. Flouroacetamide

مركب على شكل بودرة بيضاء عديمة الطعم والرائحة، يعرف باسم المركب 1081 يشبه المركب 1080 في معظم صفاته إلا أنه يستخدم بتركيز أعلى، بسبب سميته المنخفضة نسبياً، فقد أعطى استخدامه بتركيز 1-2% في الطعوم نتائج أفضل من نتائج 1080 بتركيز 0.25% في سلسلة من الاختبارات، غالباً ما يستخدم لمكافحة القوارض في أنظمة الصرف الصحي.

#### طريقة عمل المبيد و اعراض التسمم بالمبيد

يشابه هذا المركب المركب السابق في طريقة عمله ، وان كان يحتاج الى مدة اطول حتى تظهر تأثيره . وتنشابه اعراض التسمم به مع المركب السابق ولكن في حالة التسمم بهذا المركب فان الحيوانات تنام على جنبها مع ظهور تقلصات عضليه . ويمكن استخدام مركبات الاسيتاميد للعلاج . ولقد لوحظ ان ذكور الفئران التي تناولت جرعات تحت مميتة من هذا المركب قد نقص وزنها اما الاناث فقد قلت قدرتها على التناسل .

### **\*\* مبيدات القوارض متوسطة التأثير : Rodenticides Subacute \*\***

يتبع لهذه المجموعة ثلاثة مركبات هي Calciferol , Bromethalin, fluoropropaline وتمتلك هذه المركبات العديد من صفات المبيدات سريعة التأثير، ولكنها تختلف عنها في بعض الصفات، فعلى الرغم من أن القوارض يمكن أن يتناول جرعة قاتلة من هذا المركب خلال 24 ساعة إلى أن الموت لا يحدث إلى بعد عدة أيام. ومن الصفات المميزة أيضاً، ظهور أعراض التسمم على الأفراد التي تناولت جرعة قاتلة وعلى الأفراد التي تناولت جرعة غير كافية للقتل، حيث تتوقف القوارض كلياً عن التغذية بعد 24 ساعة من تناول الطعم السام، وهذه ميزة مهمة في استخدام هذه المركبات يكون الضرر يتوقف مباشرة ( حتى قبل أن يحدث الموت) . لكن في حال تناول كمية غير كافية للقتل سيؤدي ذلك إلى فشل عملية المكافحة، حيث تستعيد الأفراد نشاطها وتتابع التسبب الضرر من جديد. فالحدود الفاصلة بشكل كامل، بكون موت الأفراد قد يتأخر لعدة أيام أيضاً عند استخدام المبيدات سريعة التأثير أحياناً وخاصة عند استخدام مبيد السيتركنين أو مبيد سلفات الثاليوم.

### **\*\* مبيدات القوارض ذات السمية المزمدة أو بطيئة التأثير : Chronic rodenticides \*\***



### **"مانعات التجلط للقوارض"**

مانعات تخثر الدم Anticoagulants يعد اكتشاف المركبات المانعة لتخثر الدم الخطوة الأكثر أهمية في زيادة الأمان والفعالية في مجال مكافحة القوارض.  
آلية التأثير:

تعمل هذه المركبات على إنقاص أو منع قابلية الدم للتخثر أو التجلط وتشكيل الخثرة الدموية (الجلطة). وتسبب هذه المركبات الموت عن طريق منع تشكل فيتامين K في الكبد وعندما ينخفض مستوى البروثرومبين Prothrombin لحد حرج لا يمكن معه أن تتكون الخثرة، يستمر النزف مهما كان خفيفاً حتى حدوث الموت، ويمكن فهم آلية عمل المبيدات المانعة لتخثر الدم بسهولة، عند معرفة الآلية التي تتكون بها الخثرة الدموية بالحالة الطبيعية، فعند تعرض الأوعية الدموية لضرر أو لجرح ما، يتحول الدم السائل على هلام Jelly يمنع استمرار نزف الدم، وما يحدث هو أن أحد بروتينات الدم غير المنحلة ويسمى Fibrinogen يتحول إلى كتلة غير منحلة ليفية التركيب تسمى Fibrin وهي التي تشكل الخثرة، ويحفز هذا التحول في تركيب الدم بفعل أنزيم الثرومبين Thrombin ويتشكل هذا الأنزيم من أحد بروتينات الدم، يدعى البروثرومبين Prothrombin بفعل أنزيم آخر يسمى Thrombokinaze، ويتحرر الأخير من الأنسجة المتضررة بظل وجود فيتامين K، ففي حال تعطيل إنتاج فيتامين K فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل عملية تشكل الخثرة الدموية، وبالتالي فإن النزف سيستمر تدريجياً حتى حدوث الموت، إن آلية التأثير البطيء لهذه المركبات هي سر نجاحها.

هذا هو المبدأ العام لآلية منع التخثر ولكن الدور الذي تقوم به المبيدات المانعة للتخثر على وجه التحديد، هو تعطيل دورة تشكل فيتامين K وبعملية منع استمرار دورة تشكل الفيتامين هذه تكون كمية فيتامين K المأخوذة عن طريق الغذاء فقط هي المتاحة داخل الجسم، والتي لا تعتبر كافية لتعويض عوامل التجلط في الدم بعد فترة قصيرة من استهلاك جرعة كافية من الطعام، تستنزف هذه العوامل أخيراً وبذلك تفشل في الحفاظ على مستوى التخثر في الدم ويحدث الموت بالزيف Haemorrhage ويستغرق ذلك 4-28 يوم، وبتأخر ظهور أعراض الموت لاتفكر للقوارض بأعراض التسمم بمانعات التخثر، مما يمنع ظهور مشكلة الحذر من الطعوم Bait Shyness. ولطريقة التأثير البطيء هذه فوائد مهمة، حيث يعتبر التزود بالشكل الفعال من الفيتامين علاجاً لتصحيح وضع التخثر في الدم عن طريق استخدام كمية من فيتامين 1K، إذن فيتامين K هو الترياق النوعي Specific antidote في حالات التسمم العرضي، وتؤمن آلية التأثير البطيء متسعاً من الوقت للقيام بإجراءات العلاج على خلاف المبيدات السريعة التأثير التي لاتفسح مجالاً للتدخل في علاج حالات التسمم.

#### 1- مبيدات الجيل الأول من مانعات التخثر First generation of anticoagulants

ظهرت خلال الفترة 1950-1970 العديد من مانعات التخثر بصورها التجارية وسميت مركبات الجيل الأول. الصفة المهمة التي تحكم استخدام هذه المركبات هي أنها غير سامة بشكل كاف لتسبب الموت بعد التغذي على الطعام لمرة واحدة، فهي ذات أثر تراكمي، وبدقة أكثر هي فعالة في إعاقة دورة تشكيل فيتامين K لفترة قصيرة فقط، لذلك يجب أن يتم التغذي عليها وبشكل مستمر لعدة أيام، للوصول على أطول تأثير ممكن حتى حدوث الموت. ولذلك إن نجاحها في مكافحة القوارض يعتمد على إمكانية وصول الآفة المستهدفة إلى الطعوم لفترة تتراوح من عدة أيام إلى عدة أسابيع، ولتأمين ذلك طور إجراء يسمى

التطعيم المستمر Surplus Baiting أو التطعيم الإضافي Continues Baiting وهو يعني وضع كميات كبيرة نسبياً من الطعوم في نقاط محددة (في محطات التطعيم) ، ويتم تجديدها بشكل دوري لتأمين الطعم السام باستمرار للآفات المستهدفة. يدوم التطعيم حتى توقف التغذية (توقف استهلاك الطعوم) مما يشير عادة إلى انتهاء عملية المكافحة، ويسمى الباحثين هذه العملية بالإشباع Saturation. إن الكميات الكبيرة من الطعوم التي تتطلبها عملية التغذية المستمرة، وما يترتب عليها من نفقات وجهود من قبل المستخدم يجعل استخدام هذه المركبات غير عملي في مكافحة القوارض الزراعية ، إضافة إلى أن بعض الأنواع الحقلية من القوارض تصعب مكافحتها بمثل هذه المركبات، إضافة للفعالية الضعيفة نسبياً ، وهذه هي الأسباب الرئيسية في الحد من استخدامها.

### بعض مركبات الجيل الأول من مانعات التخثر:

تتبع جميع المركبات المانعة لتخثر الدم لإحدى المجموعتين :  
- مجموعة الهيدروكسي كومارين Hydroxycoumarin أو مجموعة الانداندنيون Indane-dion بسبب تركيبها المتشابه فهي لا تختلف كثيراً في صفاتها الكيميائية ولكن الاختلاف يكون في سميتها للقوارض المستهدفة.

- مجموعة الهيدروكسي كومارين Hydroxycoumarins :

#### 1. الوفارين Warfarin

هو أول المركبات المانعة لتخثر الدم التي استخدمت بشكل واسع كمبيدات قوارض. أنتج لأول مرة في عام 1950، لكن استخدامه انحسر كثيراً بعد ظهور مقاومة القوارض لهذا المركب في العديد من دول العالم. تتراوح قيم الجرعة القاتلة التصفية LD<sub>50</sub> عن طريق الفم ضد الجرذان 1.5-323 مجم/كجم. تتوفر مستحضرات عديدة للوفارين في الأسواق تحت أسماء تجارية عديدة، فمنه مركبات تحتوي على 0.5-1% من المادة الفعالة، تستخدم في تحضير الطعوم أو تستخدم كمساحيق احتكاك. ومنه مستحضرات جاهزة للاستخدام تحتوي 0.025-0.05% من المادة الفعالة.

وتتوفر بعض المستحضرات على شكل خليط من الوفارين والكالسيفيرول تسمى Sorixa CR ومن الوفارين مع سلفاكوينوكسيلين Sulphaquinoxiline تسمى Prolin.

#### 2. كوما كلور Comachlor

هذا المركب في بداية الخمسينات بعد نجاح الوفارين ، قيمة LD<sub>50</sub> للجرذ النرويجي 16.6 ملغ / كغ تزداد فعاليته عندما يستخدم لعدة أيام متتالية. تحتوي الطعوم المحضرة تجارياً على 0.0375% من المادة الفعالة وتسوق تجارياً تحت الاسم Racumin ومنه بودرة مركزة 0.75% تستخدم كمسحوق احتكاك أو تستخدم في تحضير الطعوم.

مجموعة الانداندنيون Indane-dione :



### 1- دايفاسنونون Diphacinone

استخدم لأول مرة كمبيد قوارض في عام 1952 ، تتراوح قيم LD<sub>50</sub> ضد الجرذ النرويجي من 2.3-340 مجم/كجم ، استخدم في الولايات المتحدة بشكل واسع لمكافحة الجرذان وفئران الحقول Voles في البساتين ، ووجد أنه أقل مبيدات القوارض كفاءة في مكافحة فئران الحقول. الأسماء التجارية، Ratkiller, Ramik, Diphacinone super control وغير ذلك.

مستحضراته: بودرة مركزة تحتوي 0.1-0.5% من المادة الفعالة على شكل كابسولات ، أو مكعبات شمعية جاهزة للاستخدام، إضافة لطعوم تحتوي على 0.005-0.05% من المادة الفعالة ، وتتوفر منه مركبات سائلة ذوابة بتركيز 1% ومساحيق احتكاك تحتوي 2% من المادة الفعالة. وتستخدم التراكيز العالية في مكافحة الفئران والتراكيز الأقل لمكافحة الجرذان.

### 2- كلوروفاسنونون Chlorophacinon :

أنتج لأول مرة عام 1961 كمبيد للقوارض ، ويستخدم الآن بشكل واسع في أوروبا وأمريكا، قيمة LD<sub>50</sub> للجرذ النرويجي 20.5 مجم/كجم ، ومع ذلك بعض الفئران كانت مقاومة نسبياً ، وفي أحد الاختبارات وجد أن طعم بتركيز 0.025% من الكلوروفاسنونون أدى لموت جميع الفئران المختبرة بعد 7 أيام من التغذية. وفي دراسات أخرى تطلب موت الفئران 0-21 يوم من التغذية المستمرة على الطعم السام. من الأسماء التجارية Caid و Mhouse و rat killer , غير ذلك

### 3- بندون pindon :

استخدم في البداية كمبيد حشري وفيما بعد اكتشفت خواصه كمبيد للقوارض ، قيم LD<sub>50</sub> ضد الجرذ النرويجي تتراوح من 50-280 مجم/كجم تحوي الطعوم 0.005-0.05% من المادة الفعالة تحت أسماء تجارية، Pival أو Pivalin وكثيراً ما يستخدم لمكافحة الجرذان والفئران خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

### 2) مبيدات الجيل الثاني من مانعات التخثر Second Generation of Anticoagulants

اكتشفت مقاومة القوارض لمانعات تخثر الدم لأول مرة في اسكتلندا عام 1958 ، حيث ظهرت استحالة مكافحة مجتمعات الجرذ النرويجي بالوارفارين، وعندما اعتقد أن الكوماتنيل يمكن أن ينجح في مكافحة القوارض المقاومة للوارفارين وسريعاً ما ظهرت المقاومة لهذا المركب أيضاً. هدد ظهور المقاومة النجاحات الكبيرة التي حققها استخدام مانعات التخثر في مجال مكافحة القوارض، وبدأت المحاولات الجادة لحل مشكلة المقاومة بالبحث عن بدائل تختلف في طريقة تأثيرها على القوارض. ولكن بعض الكيميائيين المتمسكين بالصفات الإيجابية لمانعات التخثر استمروا في تفحص جزيئات الهيدروكسي كومارين ولاحظوا أن النظير chloro-2 لفيتامين K هو مضاد تخثر معروف، كان أقل فعالية عند القوارض التي امتلكت المقاومة. أظهرت هذه الملاحظة إمكانية حل مشكلة مقاومة القوارض لمانعات التخثر. وقامت

أبحاث عديدة قادت لاكتشاف سلسلة من الجزيئات ذات الصفات المرغوبة، وكان أولها الدايفيناكوم ثم تبعه البروديفاكوم، في فرناس أوجد الكيميائيون سلسلة من النظائر الكحولية للوارفارين ومنها البروماديولون ووجد أنه فعال ضد القوارض المقاومة ولاحقاً أضيف على القائمة مركبين هما، الفلوكومافين، الدايفيثيالون، وأطلقت على جميع هذه المركبات تسمية: مركبات الجيل الثاني من مانعات تخثر الدم.

#### 1- دايفيناكوم Difinacom :

يتبع لمجموعة الهيدروكسي كومارين وهو أول مركب من سلسلة الجيل الثاني لمانعات التخثر، اكتشفه Hadler and Shadbolt عام 1975. أظهرت التجارب المخبرية أنه فعال جداً ضد الجرذان النرويجية *R.norvegicus* والفئران الحساسة للوارفارين، وضد الجرذان المقاومة، وأكدت التجارب إمكانية استخدامه في المكافحة الحقلية، في طعوم تحتوي 0.005% من المادة الفعالة ضد الجرذان المقاومة.

ظهر تجارياً عام 1976 وهو أول مبيدات الجيل الثاني من مانعات التخثر التي وزعت بشكل تجاري لمكافحة القوارض المقاومة للوارفارين والمركبات المشابهة له. يتصف هذا المركب إلى حد ما بالتخصص، حيث كان أقل سمية للحيوانات غير المستهدفة (حيث بلغت قيم LD50 مقدرة بمجم/كجم، 50 لكل من الكلاب والدجاج، 100 للقطط وأكثر من 50 لخنازير المزرعة). يستخدم حالياً بشكل واسع في مكافحة القوارض وخاصة في أوروبا وجنوب أمريكا. تتوفر منه العديد من الطعوم، تحتوي على 0.005% من المادة الفعالة، على شكل حبوب كاملة أو مجروشة، أو على شكل كبسولات أو مكعبات شمعية تحت أسماء تجارية Ratak أو Neosorexa و Ratshot و Neokill و Roban أو غير ذلك.

حدثت المقاومة للدايفيناكوم عند مجتمعات الجرذ النرويجي في بريطانيا عام 1978، وعلل بعض الباحثين المقاومة المنخفضة لهذا المركب إلى عوامل سلوكية، وسجلت مقاومة ضد هذا المركب أيضاً عند الفئران المقاومة للوارفارين في بريطانيا وسجلت مقاومة عند بعض الأنواع الأخرى من القوارض في عدد من الدول الأوروبية، وبرغم ذلك يعد فعالاً بشكل جيد.

#### 2- بروماديولون Bromadiolone :

يتبع مجموعة الهيدروكسي كومارين، سجل لأول مرة عام 1968 وأدخل إلى الاستخدام كمبيد قوارض عام 1976. فاعليته في المخبر عالية ضد القوارض الحساسة للوارفارين، وقادر على قتل الجرذان الحساسة بعد يوم واحد من التغذية على الطعوم، ويجب إعادة التغذية لقتل الجرذان والفئران المقاومة. عادة ما يستخدم البروماديولون في طعوم بتركيز 0.005% ضد الجرذان والفئران وكان فعالاً حقلياً ضد الجرذان المقاومة وفشل في مكافحة الفئران المنزلية، في ثلاثة اختبارات من أصل ستة من الاختبارات الحقلية في بريطانيا، حيث بقي فأر واحد استهلك 410 مجم/كجم من المادة الفعالة، وظهرت مشاهدات

مشابهة في فنلندا، واعتبر ذلك نذيراً لحدوث مقاومة الفئران لهذا المبيد. ولوحظت كذلك مقاومة الفئران للبروماديولون في كندا، كما ذكرت مقاومة الفئران والجرذان لهذا المركب في الدانمارك. يستخدم البروماديولون بشكل واسع في المناطق السكنية والزراعية على السواء، ويتوفر على شكل مستحضرات متعددة محملة على حبوب النجيليات أو على شكل سوائل قاعدتها الزيت، أو على شكل بودرة مركزة تحتوي 0.1-0.5% من المادة الفعالة، أو كمسحوق احتكاك بتركيز 0.1-2%، يتسوق تحت أسماء تجارية عديده منها، Killrat, Contrac, Mouseoff, Super – Caid , او غير ذلك.

### 3- بروديفاكوم Brodifacoum :

يتبع لمجموعة الهيدروكسي كومارين، واستخدم في مكافحة القوارض لأول مرة عام 1979، وهو أشد مبيدات الجيل الثاني من مانعات التخثر فعالية، حيث اثبتت التجارب الحقلية والمخبرية فعالية هذا المركب في مكافحة الجرذان والفئران المقاومة لمبيد الوارفارين. يستخدم البروديفاكوم في الطعوم بتركيز 0.005% سواء في الحقل أو في المخبر، وفي جميع أنحاء العالم، وباتت فعاليته معروفة في مكافحة جميع آفات القوارض في المناطق السكنية والزراعية، وتظهر فعالية هذا المركب في قتل القوارض بعد استهلاك الطعم كجزء من احتياجاته الغذائية في يوم واحد فقط فقد سجلت نسب موت كاملة للسلاسل الحساسة والمقاومة للوارفارين لأنواع الثلاثة المعروفة من القوارض المنزلية (الفأر المنزلي، الجرذ الأسود، والجرذ البني) بعد 24 ساعة من التعرض لطعوم البروديفاكوم، وتبينت الفعالية العالية في اختبارات التطعيم المتقطع (Pulsed Baiting) ضد الجرذان المقاوم للوارفارين، المستحضرات التجارية متوفرة على شكل كبسولات، مكعبات شمعية، وطعوم (محملة على حبوب النجيليات) تحتوي 0.005% من المادة الفعالة، تحت أسماء تجارية منها Vertox, Brodifacoum, Klerat, Talon, Ratax, Matikus او غير ذلك.

### 4- فلوكومافين Flocoumafen :

يتبع مجموعة الهيدروكسي كومارين، أدخل للاستخدام عام 1984 أقل فعالية على الطيور LD<sub>50</sub> < 100 مجم/كجم على الدجاج، ولكنه سام جداً للكلاب وتتراوح قيم LD<sub>50</sub> من 0.075-0.25 مجم/كجم فعال ضد القوارض المقاومة لمانعات التخثر الأخرى، ويستخدم بشكل واسع في المناطق السكنية والزراعية والصناعية، المستحضر التجاري المتوفر من هذا المبيد يسوق تجارياً تحت اسم Storm وهو قالب شمعي أو كبسولات أو حبوب قمع كاملة، محمل عليها المبيد بتركيز 0.005%.

### 5- داي فيثيالون Difethialone :

يتبع مجموعة الهيدروكسي كومارين، وهو أحدث مبيدات الجيل الثاني من مانعات التخثر. يختلف تركيبه الكيميائي عن تركيب البروديفاكوم في استبدال ذرة الكبريت محل ذرة الأكسجين في حلقة الهيدروكسي كومارين. المادة الفعالة شديدة الفعالية ضد القوارض الحساسة والمقاومة للوارفارين، أظهرت التجارب المخبرية أن طعوم الدايفيثيالون بتركيز 0.0025% كانت فعالة ضد سلاسل مختلفة من الجرذان

والفئران في كل من الدانمارك وفرنسا على الرغم من أن عرض الطعوم السامة بهذا التركيز لمدة يوم واحد لم تكن كافية لقتل جميع الأفراد المختبرة، أعطت الاختبارات ضد الفئران والجرذان في الولايات المتحدة الأمريكية نتائج جيدة. لم يتم تقييم هذا المبيد بشكل واسع، وعند استخدامه في طعوم وتركيز المادة الفعالة فيها 0.0025% يوجد شك بسيط حول فعاليتها كمضاد تخثر وحيد الجرعة ضد الجرذان والفئران المقاومة، ويتوفر هذا المبيد في دول أوروبية محدودة تحت اسم تجاري FirstStrike, Generation or BlueMax وغير ذلك.DT3 Difethialone.

ملحوظة: تختلف في معظم الاحيان الاسماء التجارية لمناعات التجلط من دولة لأخرى

#### إجراءات الأمان عند التعامل مع المبيدات:

- 1- وضع المبيدات في أماكن لا تصلها أيدي الأطفال أو الحيوانات الاقتصادية.
- 2- حفظ المبيدات في أواني محكمة الإغلاق، وفي مخازن غير متاح للجميع الوصول لها.
- 3- تخلط المبيدات في أماكن جيدة التهوية ولا يسمح بالتدخين أو الأكل والشرب في تلك الأماكن أثناء خلطها.. مع استخدام كل وسائل الوقاية من كفوف وأقنعة.
- 4- تغسل الأواني المستعملة غسلا جيدا بعد الانتهاء من الخلط، كذلك الحال مع المعدات والكفوف المطاطية.
- 5- وضع علامات تحذير في المناطق المعاملة بالسموم.. وحبس الحيوانات الأليفة أو منعها من الوصول الى مكان المعاملة.
- 6- إبعاد الحيوانات الميتة من المعاملة وحرقها ودفن بقاياها.
- 7- معرفة (ترياق) كل صنف من السموم والاحتياط عليه، عند حدوث حالات تسمم وأخذ الترياق مع المصاب الى المستشفى، لعدم الإلمام الكافي عند العيادات والمستشفيات بالتعامل المتخصص مع تلك الحالات

#### مستحضرات مبيدات القوارض: Formulations of rodenticide

تحضر مبيدات القوارض بأشكال وصور مختلفة لتسهيل استخدامها في مختلف الظروف. فمنها المستحضرات الجاهزة للاستخدام، ومركبات المادة الفعالة التي يتم خلطها مع ماد غذائية جاذبة للقوارض من قبل المستخدم، وقد تحضر على شكل طعوم سائلة أو على شكل مبيدات ملامسة، تشكل الحبوب على اختلاف أنواعها (القمح – الشعير، الأرز، الذرة، الشوفان، الذرة البيضاء) الغذاء الرئيسي لغالبية أنواع القوارض، فلهذا السبب ولتوفرها محلياً بكميات كبيرة في معظم دول العالم، ولسهولة تخزينها، استخدمت كمواد حاملة للمادة الفعالة عند تحضير الطعوم السامة

ومن الناحية الاقتصادية يجب استعمال الحبوب ذات النوعية الجيدة بكونها أكثر جذباً للقوارض من الحبوب ذات النوعية الرديئة القديمة أو المريضة والملوثة وللحصول على نتائج جيدة إذا ما أحسن اختيار المبيد المناسب.

تضاف في بعض الأحيان مواد جاذبة، للطعوم مثل نكهة الفواكه، اللحم، السمك، المولاس، السكر، القرفة أو اليانسون إلا أن هذه الإضافات تبدو مغرية للبشر أكثر منها للقوارض التي تعد صاحبة القرار النهائي في استساغة الطعوم المحضرة، وتعتمد الوكالة الأمريكية لحماية البيئة EPA على إضافة الزيت والسكر في الغذاء المنافس Challenge diet الذي توصي باستخدامه عند إجراء اختبارات الاستساغة على أنها مواد تزيد من استساغة الطعوم.

ومن الإجراءات العامة عند تصنيع الطعوم لأغراض تجارية، إضافة مادة صبغية ملونة، (عادة زرقاء أو سوداء أو خضراء)، للتحذير من أن هذه الطعوم غير معدة للاستهلاك البشري أو الحيواني، وتضاف أحياناً بعض المواد الحافظة لمنع نمو العفن على الطعوم. وفيما يلي أهم مستحضرات مبيدات القوارض وهي:

#### 1- الطعوم المعدية Baits :

تلعب مادة الطعم المخلوطة بالمبيد دوراً فعالاً و هاماً في نجاح مكافحة الفئران، حيث يتوقف نجاح أي مبيد على جودة الطعم حيث وجد انه في كثير من الحالات ليس هناك فروق معنوية بين كفاءة المبيدات المستخدمة في مكافحة القوارض حيث ان التركيب الكيميائي لهذه المواد متشابه و عليه فأن جاذبية مواد الطعوم المضاف الي هذه المبيدات تلعب دورا كبيرا في نجاح عملية المكافحة ويجب ان تتوفر الشروط الاتية في مادة الطعم:

- 1- ان تكون مادة الطعم رخيصة منخفضة التكاليف و متوفرة في البيئة و سهلة الحصول عليها و قابلة للتخزين لفترة طويلة
- 2- ان يكون الطعم المستخدم مناسب لنوع الفئران الموجودة في البيئة، حيث تختلف انواع الفئران في قابليتها للطعوم المختلفة، فالفأر النرويجي يفضل الطعوم الحيوانية مثل السمك و الطعمية و الفأر المتسلق يفضل الطعوم النباتية و الحبوب والثمار و الخضروات، و الفأر المنزلي تأكل كل شيء يقابلها مع ميلها للتغذية علي الحبوب، و يجب الاخذ في الاعتبار عند اجراء عملية المكافحة للفأر المنزلي انه دائما رحال و لا يتعود علي غذاء معين و يفقد اهتمامه بالطعم بسرعة، و نادرا ما يزور مكان التغذية مرة ثانية و لذلك فان عملية المكافحة ضد الفار المنزلي باستخدام المبيدات المسيلة علي هيئة طعوم غير عملية و ان انجح طريقة هي استخدام المبيدات علي هيئة مساحيق الممرات Tracking powder وعند استخدام طعوم مع المبيدات ضد فأر المنزل فان افضل هذه الطعوم هي الحلوي و الجبن والتفاح والبطاطا.

- 3- ان يكون الطعم اكثر جاذبية من البدائل الغذائية الموجودة في منطقة ما و عليه فان عملية المكافحة بالمبيدات المسيلة علي هيئة طعوم وقت نضج المحصول لاتفيد حيث تكون الحبوب الناضجة اكثر جاذبية للفئران من الطعوم السامة.و يمكن اضافة بعض المواد الجاذبة مثل السكر او العسل الاسود في حالة مكافحة المخازن و الشون.
- 4- ان تكون حالة الطعم جيدة، لان الطعوم المتعفن او المتخمرة او المخزونة فترة طويلة اقل جاذبية للفئران و خاصة عند تخزين الذرة الشامية المجروشة لمدة طويلة يحدث لها عملية تزنخ حيث انها تحتوي علي نسبة عالية من الزيت وعليه فعند استخدام جريش الذرة فلا بد من خلطها مباشرة بالمبيدات واستخدامها في التطبيق مباشرة بدون تخزينها.
- 5- عند استخدام الحبوب كطعوم يفضل ان تكون مجروشة جرشا متوسطا بحيث لا تكون صغيرة جدا ويصعب علي الفئران تناولها، او كبيرة و يسهل علي الفئران نقلها الي جحورها وتخزينها. كما ان عملية الجرش تزيد من مساحة السطوح المعرضة و التي سوف يلتصق بيها المبيد كما ان الجرش يعطي نكهة محببة للفئران مما يزيد من اقبال الفئران عليها.
- 6- يجب عدم استخدام الحبوب او البقوليات غير المقشورة كطعم لانها غير مقبولة للفئران بالاضافة الي ان الفئران عند تقشيرها لهذه الحبوب و نزعها للغلاف فسوف تؤدي الي فقد معظم المبيد الملصق بالسطح.
- 7- يجب الاخذ في الاعتبار عند اختيار الطعم المناسب المحصول السائد في المنطقة حيث يوصي باستخدام طعم من المحاصيل السائدة وذلك بعد رفع المحصول حيث ان الفئران عند تعودها علي التغذية علي محصول معين فانها تفضل هذا المحصول عن باقي المحاصيل الاخرى.
- 8- قد يكون من المفيد اضافة شمع البرافين الي الطعوم في حالة استخدامها في اراضي او اماكن مبتلة حيث ان ذلك سوف يحمي الطعوم من الرطوبة، و يراعي عند عمل ذلك ان تكون الحبوب المستخدمة مع الشمع مستديرة حتي تقلل من مساحة السطوح المعرضة للعوامل الجوية مع مرتعاة عدم بروز هذه الحبوب عن مستوي سطح الشمع حتي لا يبتل و عدم غمر هذه الحبوب بطبقة سميكة من الشمع حتي لا تفقد الحبوب جاذبيتها للفئران
- 9- قد يكون من المفيد استخدام الطعوم السائلة و ذلك في حالة البيئات التي تفتقد وجود مصادر للمياه كالشون و المخازن
- 10- قد يستخدم المبيد علي هيئة مسحوق ممرات بدون اضافة طعوم.. وتفيد هذه الطريقة في مكافحة فئيرات المنازل كما سبق، و قد لا تعطي هذه الطريقة نجاحا مؤكدا مع الفئران المتسلقة و ذلك لطول ارجلها و عدم احتكاك فروة البطن بالمسحوق

وتستعمل حبوب النجيليات (الكاملة أو المجروشة أو المطحونة) بشكل واسع في تحضير الطعوم، وعند خلطها بالمادة الفعالة تضاف مادة لاصقة وهي عادة الزيت النباتي، لتساعد على التصاق المادة الفعالة بالمادة الحاملة، ومنع تطايرها وضياعها أثناء الخلط مما يؤثر على دقة التركيز المطلوب وعلى الصعيد التجاري لايفضل الطعوم المحضرة بهذه الطريقة بقاء المادة الفعالة على سطح الحبوب الكاملة مما قد يؤدي لخفض استساغتها، إضافة لاحتمال انفصال المادة الفعالة عن سطح المادة الحاملة في ظروف التخزين أو عند استخدام في ظروف جوية متقلبة.

وللتخلص من هذه المعوقات ظهرت بعض مستحضرات الطعوم على شكل كبسولات Pellets تتشابه في تقنية تصنيعها مع تلك المطبقة في إنتاج المضغوظات العلفية حيث تخلط حبوب النجيليات المطحونة مع المادة الفعالة وتضغط في قوالب مختلفة الأشكال والأحجام، وظهر أن الاستساغة للكبسولات أكبر منها لطعوم الحبوب بكونها تحتوي أنواعاً مختلفة من الحبو المطحونة، إضافة لتوزيع المادة الفعالة بشكل متوازن ضمن الكبسولات، ويتوقف مدى قبول القوارض لهذه المستحضرات على شكلها وحجمها ودرجة قساوتها، ويمكن إضافة كمية من الشمع إلى الخليط قبل التصنيع للحد من تأثير الرطوبة عليهما.

ولحل مشكلة ثبات الطعوم في الظروف الجوية المتغيرة وفي ظروف الاستخدام المختلفة وسميتها للطيور، ظهر نوع جديد من المستحضرات هي المكعبات الشمعية Wax blocks تتألف بشكل رئيسي من حبوب النجيليات (الكاملة أو المجروشة أو المطحونة) مع نسبة من شمع البارافين تتراوح من 15-40%. واستخدمت في مكافحة قوارض المدن، خاصة في أنظمة الصرف الصحي، واستخدمت مكعبات شمع البارافين المحتوية على مبيد البروديفاكوم والدافيناكوم بنجاح لمكافحة السلالات المقاومة من الجرذ النرويجي في مزارع بريطانيا، برغم وجود أغذية منافسة كثيرة في تلك المزارع Buckle 1994.

ولزيادة تدابير الأمان في طعوم القوارض تستخدم مادة Deterent denatonium benzoate اسمها التجاري Bilrex المقيئة للبشر عندما توجد في الطعوم بنسبة 0.001% ولا تؤثر هذه النسبة على استهلاك القوارض للطعوم، والدور الأساسي لهذه المادة هو تقليل الكمية المستهلكة من الطعوم السامة بطريقة الخطأ وبالتالي خفض خطورة التسمم العرضي.

## - اختيار أماكن وضع الطعوم:

- يجب أن تكون نقط وضع الطعوم في خط سير الفئران المتوقع.
- توزع الطعوم على الأماكن العلوية والسفلية في حالة المكافحة داخل المباني.
- يتم اختيار الأماكن المظلمة والبعيدة عن الحركة والضوضاء.
- يبعد الطعم عن الحوائط بمقدار 15 سم تقريباً.
- عدم تغيير أماكن وضع الطعوم طول أيام دورة المقاومة (20 يوماً تقريباً).
- رسم كر وكي لأماكن وضع الطعوم تبين بأرقام سلسلة ويعلم فيها الأماكن العلوية لتمييزها عن السفلية.
- في الأماكن المكشوفة يتم وضع الطعوم في اسطوانات من البلاستيك أو ما يشبهها أو أي أشكال أخرى تعوق الحيوانات الأخرى من الوصول للطعم السام وأن يكون بعيداً عن تناول الأطفال ويتم التحايل بصورة أو بأخرى لأماكن وضع الطعوم في خط سير الفئران دون ما ضرر.
- يجب أن يتناسب عدد نقط وضع الطعوم مع الأعداد المنتظر (المتوقعة) للفئران.

## د - دورات الطعوم:

- المقصود بها تنظيم وضع الطعوم والكشف عليها وتغيير التالف مع رفع الفئران الميتة وتطهير أماكنها بالفينيك أو الكلور الجيري ورصد ذلك في جداول خاصة بكل دورة مع ملاحظة الآتي:-
1. يتم نشر مجموعة ضخمة من الطعوم الغير سامة والجاذبة للفئران وفي داخل الأشكال المختلفة التي سوف تستخدم فيما بعد مع الطعوم السامة فيما يسمى بعملية (Pre - baiting) حتى يمكن تحديد أماكن انتشار القوارض وكثافتها في كل منطقة بناءً على معدل استهلاك تلك الطعوم ويستمر ذلك لمدة ثلاثة أيام.
  2. تستبدل الطعوم العادية بالطعوم السامة في اليوم الرابع في المناطق التي ثبت أنها مسالك للفئران.
  3. يستمر الكشف عن الطعوم لتغيير التالف وزيادة الطعم حسب معدل الاستهلاك - مع رفع الفئران الميتة من الأماكن المختلفة ويستمر ذلك حتى يتوقف أكل الطعوم.
  4. ترفع الطعوم وتعدم بعد نهاية الدورة بدفنها في التربة في حفرة بعمق واحد متر تقريباً بعيداً عن مصادر المياه أو اتجاه حركة السيول والأمطار.
  5. يستمر المرور لبضعة أيام أخرى للتأكد من جمع كل الفئران الميتة بحذر شديد مع دفنها مع ما يعادل وزنها من الجير الحي وتطهير مكانها بالمطهرات الطبية كالفينيك أو الكلور الجيري.
- ويلاحظ أنه يمكن استخدام بعض الطعوم السامة في صورة سائلة في المناطق الجافة التي يكون من الصعب فيها على القوارض الحصول على الماء .. كما يمكن استخدام بعض المركبات التي لا تتأثر بالماء للاستخدام في مواسير المجاري (أقراص شمعية).



## 2-سموم الملامسة (بودرة تعفير) Contact Poisons

توفر مبيدات الملامسة غالباً على شكل مساحيق وقد تتوفر على شكل هلام، وهي بالمعنى الدقيق للعبارة ليست مبيدات ملامسة بكونها تسبب الموت نتيجة ملامستها للجلد، فهي تنثر عند فتحات الجحور وعلى الأسطح والممرات التي تسير عليها القوارض، مما يؤدي لتلوث أقدامها وفرائها بهذه المواد، وتدخل إلى جهاز الهضم عند تنظيف القوارض لأقدامها وفرائها بواسطة اللسان، وبذلك فهي سموم معدية من محاسن هذه المواد عدم تأثرها بالاستساغة أو بظاهرة الاشتباه والتجنب.

مساحيق الاحتكاك، أو مساحيق ممرات الانتقال كما تسمى أحياناً (بودرة التعفير)، تختلف كثيراً من حيث التركيب الكيميائي، وتتأثر فعاليتها بحجم جزيئات المادة الفعالة، وأفضلها هي تلك التي يمكن لجزيئاتها أن تنجذب لفراء الحيوانات المستهدفة بفعل قوى الكهرباء الساكنة الموجودة فيه.

عادة يكون تركيز المادة الفعالة في مساحيق الاحتكاك أكبر بكثير من تركيزها في الطعوم المعدية المحتوية على نفس المركب 20 ضعفاً، بسبب أن كمية قليلة نسبياً من السم تعلق بفراء الحيوان. ونظراً للتركيز العالي للمادة الفعالة وإمكانية تطايرها في الهواء وانتقالها من مناطق الاستخدام على أماكن تحضير الغذاء أو أماكن تخزينه، يجب أن يتم التعامل بحذر شديد مع هذه المستحضرات.

ولحل مشكلة التلوث التي يسببها استخدام مساحيق الاحتكاك للبيئة ظهرت مستحضرات الهلام (التي تعتبر أكثر أماناً، واستخدمت بشكل أساسي لمكافحة الفئران، على شكل أنفاق اصطناعية تحتوي فتيل مشرب البروديفاكوم)

## 3- مبيدات سائلة liquid

تستخدم هذه الصورة من المبيدات في كثير من الحالات منها

- عند استخدام مبيدات حشرية عالية التركيز لمكافحة آفة اخري قدي تؤدي الي خفض تعداد كثافة الفئران في هذه المنطقة

- في الاماكن التي تحتاج فيها الفئران الي ماء

## 4-المدخنات Fumigants

استخدام الغازات السامة من أقوى الطرق وأكثرها نجاحاً في مكافحة القوارض وحتى الطفيليات والحشرات والعناكب وغيرها، وذلك للخاصية التي يتمتع بها الغاز في ملاحقة الكائنات الحية وقتلها حتى في جحورها ومخابئها غير الظاهرة للعيان .. ولكن على من يريد أن استخدام تلك الطريقة أن يكون حذراً جداً فقد تسبب بعض الأخطاء الى الموت لأعداد كبيرة من الكائنات الحية غير المستهدفة في المكافحة، حتى الإنسان نفسه، ومن أطرف الحوادث التي واجهتها في بيع تلك المواد، أن أحد الرعاة اشترى أنبوبة بها 30 قرصاً سريع التسامي والتبخر من نوع (فوستوكسين هندي الصنع) .. وكان معه مرافق له، وفي طريقهما الى

البداية لاحظ المرافق أن السائق يترنح بسيارته وبدا وجهه شاحبا، فتدخل وفتح النوافذ وأوقف السيارة، فإذا بالأنبوبة الغازية للأقراص قد انفتحت جراء السير غير المنتظم .. وبدأت الغازات تأخذ مفعولها على السائق قبل صاحبه وكادت أن تقتلها  
وهذه بعض الأسماء الكيميائية للغازات السامة المستعملة.

#### 1- سيانيد الكالسيوم $Ca(CN_2)$

يستخدم في الأماكن المفتوحة، حيث يُضخ في جحور القوارض، بشكل حبيبات تتحول على وجه السرعة إلى غاز سيانيد الهيدروجين HCN وعلى الهيتات العامة أن لا تبقي عمال المكافحة في هذا النوع من العمل مددا أكثر من سنة، لأن بقايا المبيد ستتراكم لديهم وتسبب لهم أمراضا مزمنة .. وإن حدث وتسمم أحد بهذا الغاز (جرعته القاتلة 300 جزء بالمليون) فترياقه هو (نترات الأملين) التي تأتي بشكل (أمبولة) تكسر وتوضع تحت أنف المتسمم ريثما ينقل المريض إلى المستشفى.

#### 2- بروميد المثيل $CH_3Br$

غاز عديم الرائحة عالي السمية، يستخدم للتعفير اعتياديا ضد الآفات المخزنية ومن ضمنها القوارض. لا يستخدم هذا الغاز في درجات حرارة دون ال 4 درجات مئوية، لبقائه متجمدا، كما لا يستخدم الكفوف البلاستيكية لدوبانها السريع من أثر الغاز .. كما يجب الحذر من أثره على العينين .. والابتعاد عن استخدامه قرب جذور النباتات لأنه سيقتلها دون شك .. واستخدامه يتم بواسطة ضخه بخراطيم خاصة في جحور القوارض في المستودعات والموانئ.

#### 3- كلوربيرين $CCl_3NO_2$

وهو الذي يُعرف بغاز الدموع، والفئران تموت إذا أخذت 32 جزء بالمليون حيث كان يستخدم بخلطه مع زيت المحركات الثقيلة.

#### 4- فوسفيد الهيدروجين $H_3P$

يُسمى هذا الغاز ب (الفوستوكين) ولقد استخدم لسنين عديدة .. وهو مخلوط من (كارباميت وفوسفيد الألمنيوم) يوضع بشكل أقراص مضغوطة وزن القرص 3غم .. عند فتح الأنبوبة التي تحوي 3020 قرص (حسب الشركة الصانعة) ووضع تلك الأقراص في المستودعات أو داخل الجحور فإنها تتحلل إلى فوسفيد الهيدروجين وهيدروكسيد الألمونيوم وأمونيا وثاني أكسيد الكربون .. وكما قلنا في الشروط أن استخدامه يحتاج إلى أمكنة محكمة الإغلاق، لكن إذا أردنا تعقيم حبوب في العراء من القوارض والحشرات، وكانت معبأة في أكياس، فإن علينا تغطيتها بغطاء بلاستيكي غير مثقوب وتثبيت أطرافه بواسطة أنابيب أو دفنها.

#### 5- ثاني أكسيد الكربون $CO_2$ .

كان يستخدم في بداية الأمر لمكافحة فأر البيوت في المخازن المبردة، وذلك بأقل من ساعتين على تركيز 23% .. ويمكن استخدامه على هيئة صلدة (الثلج الجاف).

## 6- أول أكسيد الكربون CO.

غاز سام وخطير جدا، وهو الذي يطلقه الفحم المشتعل، يكون قاتلا عندما يكون تركيزه في الفضاء المحيط بالكائن الحي 0.35% ويمكن إدخال خرطوم موصول بالعامد (إكزوست السيارة) في وكر القوارض لمدة خمسة دقائق، فإنه سيقضي عليها، مع الانتباه لإغلاق فتحات أخرى قد تسرب الغاز.

7- ثاني أكسيد الكبريت SO<sub>2</sub>.

غاز عديم اللون غير قابل للاشتعال ذو رائحة مهيجة قوية طاردة، يؤثر على الجهاز العصبي والعيون، ممكن خلطه مع (نترات البوتاسيوم) وشحم .. وحرق الخليط داخل جحور القوارض، فتخرج القوارض (دايخة) ممكن مسكها للأبحاث أو قتلها والتخلص منها. تستخدم المدخنات في مكافحة القوارض، في حال فشل الطرق التقليدية مثل الطعوم المعدية ومساحيق الاحتكاك، أو صعوبة تطبيقها وتتوفر على شكل بودرة - قطع كرتونية مشبع - كبسولات - أقراص أو على شكل غاز مضغوط في أسطوانات معدنية. ويحذر باستخدام هذه المواد في مكافحة الآفات في العديد من دول العالم إلا من قبل (شركات المكافحة) مدربين على التعامل معها. أكثر المدخنات استخداماً في العالم هو غاز الفوسفين (PH<sub>3</sub>)

شروط استخدام الغازات في التخلص من القوارض والطفيليات و العناكب والأفاعي و بنات عرس

وغيرها.

- 1- أن يتروى صاحب المتجر أو من يصرف ويبيع تلك المواد في بيعها، حتى يتأكد من قدرة من يشتريها على الالتزام بتطبيق الطرق الصحيحة.
- 2- أن تخلو الحجرات أو المخازن أو المزارع من أي فتحة، ويتفقد من يريد تطبيق تلك الطريقة في إحكام إغلاق تلك الفتحات بأشرطة لاصقة حتى لو كانت ثقوب وفتحات مفاتيح الأقفال .. ليضمن تقليل الكلفة ويضمن فاعلية الطريقة.
- 3- أن يتمتع من يستخدمها بسرعة التنفيذ، فمثلا (ألواح الفورمالدهايد) التي تستخدم في قاعات المزارع والفاقسات ( المفرخات) تحتاج لإشعال النار في أطرافها، وتوضع عدة ألواح في عدة أماكن، فإن لم يكن العامل أو المهندس سريعا في تنفيذ ذلك فإنه سيصاب بالدوار السريع وقد يسقط صريعا .. لذا فإن السرعة مع استخدام الكمادات هامة جدا.
- 4- تجنب صرف تلك المواد للمنازل، لما قد يتسرب من غاز الى غرف النوم، وإن كان لا بد من ذلك، فيجب أن يُخلى المنزل لمدة أربعة أيام، وعند فتحة يجب الحذر، وعلى أيدي مختصين لا هواة.

5- أن يُختار مادة وزنها الجزيئي الذي يجب أن لا يقل عن 29 حيث أن الأخير هو الوزن الجزيئي للهواء، لأنه في حالة خفة الوزن الجزيئي للغاز السام لن نستفيد في وصول الغاز للجحور والأرضيات.

إرشادات هامة عند استخدام المكافحة الكيميائية للقوارض


يطلق على المواد الكيميائية التي تستخدم لمكافحة القوارض، مبيدات القوارض ويجب ملاحظة أن هذه المواد سامة للإنسان والحيوانات الأليفة. ولا تعرف مادة فعالة ضد القوارض وليس لها أي تأثير ضد الإنسان، ولهذا يجب عند الحاجة لإحدى هذه المواد الكيميائية ملاحظة ما يلي :

(أ) عند التفكير في استعمال المواد الكيميائية يجب استشارة أحد المختصين في ذلك ، ويفضل استشارة الجهات الحكومية المختصة بشأن اختيار المادة المناسبة وطريقة الاستعمال.

- أن تكون موصي بها في برنامج مكافحة القوارض
- (ب) إتباع إرشادات المصنع في لتأكد من وجود نشرة خاصة للمبيد موضحاً بها المادة الفعالة – الجرعة اللازمة- المضاد في حالة التسمم
- تجنب وضع المبيدات مع أي مواد غذائية أثناء النقل
- (ج) يجب إبعاد السموم عن الأماكن التي يمكن أن تصل منها إلى الغذاء بأي صورة.
- يتم خلط المبيد في مكان بعيداً عن الكتلة السكنية
- تجنب الخلط في الظروف الجوية السيئة
- بعد الانتهاء من الخلط يجب تنظيف المكان من بقايا المبيدات و الطعوم حتي لا تلتهمها الحيوانات و تحدث لها تسمم
- تحديد بؤر الإصابة التي سيتم بها العلاج لأن استخدام المبيدات علي نطاق واسع يزيد من فرص حدوث التسمم
- وضع علامات تحذيرية في الأماكن التي سيتم بها عملية المكافحة
- الحذر عند التطبيق فيمكن وضع مبيد فوسفيد الزنك داخل الجحور حتي لا تلتهمه الحيوانات أو استخدام محطات طعوم خصوصا في حالة استخدام المبيدات المانعة للتجلط.
- يفضل استخدام مبيدات بطيئة المفعول
- (د) لا يستخدم سم يشبه أية مادة غذائية أو مادة مضافة للأغذية خوفاً من أن يحدث خلط بين هذه المادة والسم.
- لا يجب ترك الفأر ميت فتره طويلة

- ما يراعى عند تقديم الطَّعم للفأر: جرت العادة أن يدس السم للفأر مع مادة غذائية محببة له، وتدعى حينئذ بالطَّعم. وفيما يلي بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند استخدام الطعوم:
- تحديد نوع الفئران بالمكان، لان كل نوع له غذاء مفضل يمكن استخدامه في عملية المكافحة
  - التركيز علي مكان انتشار الفئران
  - غلق جميع الفتحات المحتملة لدخول وخروج الفئران
  - أن يوضع الغذاء المحبب لدى الفأر بدون السم (طعم كاذب) ليتناول منه عدة أيام حتى يطمئن إليه الفأر وبعدئذ يوضع به السم
  - الاختيار المناسب للمبيد و طريقة الاستعمال.
  - يتم تغيير الطعم من وقت لآخر : لأن الفئران ذكية ، فقد تكتشف طعماً ما وعندها تضيع الجهود سدى ، فمهما تكرر وضع هذا الطَّعم لن يأكله الفأر
  - الفأر حساس لآثار الإنسان، لذا يفضل أن يتم وضع الطَّعم بأقل ما يمكن من التداول ويفضل لبس القفازات.
  - يفضل استخدام غذاء (طعم) غير المتاح بمكان عملية المكافحة
  - يجب الحد من مصادر غذاء الفئران الأخرى.

### نصائح وارشادات هامة للعماله المستخدمة في مكافحة القوارض



### توزيع طعوم القوارض

- اختيار عمال بالغين اصحاء و اجسامهم خالية من الجروح
- لديهم خبره في مجال استخدام المبيدات وكيفية الاسعافات الاولية في حالة التسمم..

- ارتداء ملابس تغطي اكبر جزء من الجسم اثناء العمل
- استخدام القفاز لحماية الايدي والكمامة لتجنب استنشاق مسحوق المبيد او الغازات الناتجة
- تجنب التدخين و الاكل و الشرب اثناء العمل
- يجب فتح عبوات المبيدات بحذر شديد وببطيء مع ابعادها عن الوجه
- التخلص من عبوات المبيدات الفارغة وذلك بتحطيمها و دفنها حتي لا تستخدم في اغراض اخري
- غسل جميع الادوات المستخدمة في العمل بعيدا عن القنوات المائية حتي لا يحدث تلوث للمياه
- ضرورة تغيير الملابس الملوثة بالمبيدات بملابس اخري نظيفة بعد انتهاء العمل وقبل الذهاب للمنزل
- تنظيف الجسم بالماء والصابون بعد الانتهاء من العمل اليومي
- عند حدوث تلوث لأي جزء من اجزاء الجسم بمسحوق المبيد يجب غسله فورا بالماء و الصابون او المسح برفق بقطعة من القماش الجافة وذلك في حالة توفر المياه

### \*\* دور المبيدات في نظام المكافحة المتكاملة للآفات

تعتبر المبيدات الوسيلة الوحيدة الحاسمة والفعالة المتاحة حاليا للسيطرة علي الآفات عند وصولها إلي حالة الوباء عندما تتعدي الحدود الاقتصادية.

وفي الغالب فإنه يعتمد علي الدور الذي تلعبه المبيدات كوسيلة سريعة في خفض تعداد عشيرة الآفة إلي ما تحت هذه المستويات ثم توظيف الطرق الأخرى للسيطرة علي المستويات المنخفضة من الآفة. ولتحقيق أهداف المكافحة المتكاملة للآفات فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن استئصال الآفة غير لازماً لمنع الضرر الاقتصادي وإنه يجب إحلال مبيدات جديدة بدلاً من المبيدات المستخدمة عندما تظهر أي من المشاكل المصاحبة للتطبيق (المقاومة) وعموماً فإن الاستخدام المناسب للمبيدات ضمن برامج السيطرة علي الآفات يتطلب الإلتزام بتطبيق المبيدات في التوقيت المناسب الذي تكون فيه الآفة أضعف ما يمكن واستخدام المبيدات فقط عندما تفشل الوسائل الأخرى في تقليل تعداد الآفات ومنع وصولها للحد الاقتصادي الحرج .

والاستخدام الاختياري للمبيدات والاعتماد علي المبيدات عالية التخصص بحيث تستخدم بأقل جرعة ممكنة مع أقل تأثير أو ضرر للبيئة.

### أهم الخصائص التي أعطت المبيدات الدور الفعال لاستخدامها في برامج السيطرة علي الآفات

1. تحقق المبيدات الكيماوية الحشرية مكافحة عملية تطبيقية بالقياس بأعداد الآفة التي تقترب من الحد الاقتصادي وتتجلي فائدة المبيدات في برامج المكافحة الكيماوية بوجه عام أو برامج السيطرة علي الآفات وبتحديد أكثر عندما تتكامل مع برامج المكافحة الأخرى وفي الحالات التي

- تفضل فيها هذه الطرق وبخاصة حالات الطوارئ التي تستلزم استخدام المبيدات الكيماوية لتحقيق توازن سريع في الموقف
2. سرعة الفعل العلاجي للمبيدات ودورها في منع الضرر الاقتصادي للآفة و التأثير المميت أو القاتل نتيجة استخدام المبيدات في المكافحة يحدث سريعاً وعادة ما يحدث موت لأعداد الآفة خلال ساعات معدودة علي الاقل يوم أو يومين وبناء علي ذلك فإنه يمكن استعمال هذه المبيدات علي كثير من النباتات قبل يوم أو اثنين من الحصاد بشرط أن تكون المبيدات المستخدمة سريعة التحطم والتدهور وسرعة إزالة متبقياتهما.
  3. للمبيدات مدي واسع من الخواص والاستخدامات والمعاملة بما يتمشي مع جميع حالات الآفة
  4. نسبة الفائدة في مقابل التكلفة عند استخدام المبيدات تكون دائماً في صالح الفلاح.
  5. المبيدات الكيماوية الحشرية تنتج بكميات كبيرة نسبياً وبتكلفة منخفضة إلي حد ما مقارنة بالكيماويات الأخرى فمثلاً مبيد الدددت . والتوكسافين من المبيدات الكيماوية حينما صنعت كانت تكاليف إنتاجها بسيطة.

#### لماذا يفضل استخدام المكافحة المتكاملة عن استخدام المبيدات ؟

1. تؤدي المكافحة المتكاملة إلي توازن النظام البيئي حيث أن إدخال المبيد في النظام البيئي يحدث عنه خلل في هذا التوازن بسبب تحطيم بعض الأنواع وتمكين بعض الأنواع الأخرى من السيادة والمثال علي ذلك قتل الأعداء الحيوية الهامة في البيئة .
2. يمكن للمكافحة الكيماوية ألا تكون فعالة بسبب ظهور صفة مقاومة الآفة لفعل للمبيد Pest Resistant to Pesticides وفي الواقع هناك 600 حالة ظهرت فيها هذه الظاهرة.
3. سهولة استخدام طريقة المكافحة المتكاملة ، فالاعتقاد أن هذه الطريقة صعبة التطبيق اعتقاد خاطئ لأنه حتى لو أردنا استخدام المبيدات فقط فإنه من المفروض أن نقيم الآفة ومستواها ونقيم مستوي الضرر الذي تحدثه ، ونقرر ماذا سيستخدم للمكافحة وكل هذه خطوات ضرورية أيضاً عند استخدام المكافحة المتكاملة .
4. توفير التكاليف من الأمور الهامة للمزارع واستخدام طريقة المكافحة المتكاملة سوف توفر كثير من التكاليف لأن استخدام المبيد فيها سيكون محدوداً عند الحاجة إليه فقط وسوف تقوم باقي الطرق الوقائية والبيولوجية والميكانيكية والفيزيائية لعملها بدلاً من المبيد موفرة بذلك الوقت والمجهود .
5. المكافحة المتكاملة تشجع وجود البيئة الصحية حيث أن استخدام المبيد سيكون بدرجة محدودة وبالتالي فترة بقاء المبيدات في البيئة ستكون أقصر وسيكون تأثيرها علي المخلوقات الحية اخف وخاصة أن مشاكل التخلص من عبوات المبيدات الفارغة سوف تصبح أقل كما ان مشاكل تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية سوف تنخفض إلي درجة كبيرة .

6. تخفض المكافحة المتكاملة من القلق الذي أصاب الجميع بسبب استخدام المبيدات وتلوث التربة الأغذية مما جعل بعض الجمعيات الأهلية في بعض البلدان يقومون بالضغط المستمر علي المزارعين ومنتجي الأغذية وغيرها وفي الواقع فإن استخدام المكافحة المتكاملة سوف يحسن الصورة ويمنع التشاؤم ويخفف الضغوط النفسية التي تسبب تدهوراً في صحة الإنسان .  
ويمكن تلخيص ما شرح سابقا في مثال لبرنامج مكافحة متكاملة للتخلص من أضرار الفئران

- الحرص علي تركيب اسلاك معدنية لجميع النوافذ
  - سد الشقوق التي توجد في الحوائط مما يجعل امر اختباء وجود الفئران امرا صعبا.
  - التخلص من القمامة باستمرار وبشكل صحي
  - القتل المباشر (باليد او العصا)
  - تربية القطط المنزلية تساعد كثيرا في طرد وقتل الفئران
  - استخدام المصائد السلوكية التي يمكن ان نضع فيها الطعام المناسب لجذب الفئران لها والتخلص منها بشكل نهائي وفعال
  - طريقة اللاصق: يوجد أنواع قوية من اللواصق التي تتميز بقوة تلاصقها مع الأجسام، وذلك بوضع المادة اللاصقة على قطعة كرتون مقوى، وتوضع في المكان القريب من تواجد الفأر، وعند محاولة خروج الفأر سيعلق بالمادة اللاصقة، وعندها يمكن التخلص من الفأر بإخراجه من المنزل، كما يمكنك استخدام اللاصق مع قطعة جبن صغيرة، فالفئران تتغذى على الجبن ولها القدرة على تمييز رائحتها، وهذا سيؤدي إلى الإمساك بالفأر للتخلص منه
  - استخدام بعض المواد الطاردة مثل زرع النعناع او نثر زيت النعناع في المنزل من اشد أنواع السموم للتخلص من الفئران، حيث يعمل زيت النعناع علي تشتيت الفئران عن أماكن تواجد الغذاء في المنزل، او استخدام الفلفل الاسود ذلك عن طريق رشّ الفلفل في أرجاء المنزل، وخاصة في زوايا الحجرات، فيقوم الفأر باستنشاق رائحة الفلفل الأسود التي يكرها والخروج من المكان الذي يتواجد فيه بسرعة إلى مكان آخر، وهذا يسهل عملية التخلص منه
  - يمكن وضع جهاز طارد للفئران.
  - استخدام الطعوم السامة ويمكن خلطها مع بعض الأطعمة التي تحبها الفئران ، لكن يجب اتخاذ جميع إجراءات السلامة والحيطه والحذر، خاصة عند تواجد أطفال في المنزل
- كيفية دخول مبيد الفئران لجسم الانسان

هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن ان تدخل بها المادة السامة الي الجسم وهي

- عن طريق الجلد .



و ذلك في حالة تطاير بودر فوسفيد الزنك علي احد الاجزاء المكشوفة من الجسم فينطلق غاز الفوسفين (بفعل الرطوبة) الذي له القدرة علي النفاذ من خلال اماكن الجروح في الجسم وكذلك اجزاء الجلد الحساسة و الرقيقة مثل منطقة الوجه

- عن طريق الفم

في حالة تلوث الاطعمة بالمادة السامة

- عن طريق التنفس

وذلك باستنشاق الغاز السام كما يحدث في حالة خلط فوسفيد الزنك في مكان مغلق فانه ينطلق غاز الفوسفين ويتراكم داخل المكان مختلطا بالهواء مما يؤدي الي استنشاق الغاز ويعتبر التسمم عن طريق الاستنشاق من اخطر انواع التسمم لان المادة الفعالة تصل مباشرة الي الجهاز التنفسي.

### أعراض التسمم من سم الفئران

يعتبر أي تغيير في الحالة الصحية العادية للشخص الذي يستخدم المبيدات من علامات التسمم. وتختلف اعراض التسمم باختلاف انواع المبيدات و طريقة حدوث التسمم و من الاعراض المشتركة للتسمم:

ضعف- الغثيان وفقدان الشهية- صداع- شحوب - صعوبة التنفس - اسهال - ظهور نزيف اللثة - نزيف على الأغشية المخاطية.

في كثير من الأحيان ، تتجلى أعراض التسمم بفعل سم الفئران في البشر بالإسهال ، ومزيج الدم في كتل البراز ، نزيف اللثة ، ونزيف الأنف ، نزيف حاد مع إصابات الجرح. نزيف داخلي. وآلام البطن ، والبقع الدموية في الجسم.

### الإسعافات الأولية للتسمم الدشري مع سم الفئران

الاجراءات التي تتبع عند اسعاف حالة تسمم:

- ايقاف العمل فورا في المنطقة التي حدث بها حالة التسمم
- طمأنة الشخص المصاب لان العامل النفسي مهم جدا في عمليات الاسعاف
- نقل الشخص المصاب بهدوء بعيدا عن مكان العمل في مكان جيد التهوية و مظلل لان الطقس الحار يزيد من قدرة الجسم علي امتصاص المادة السامة
- نزع ملابس الشخص المصاب الملوثة بالمبيدات
- جعل الشخص المصاب يستريح ولا يتحرك
- إذا حصل سم الفئران على جلد بشري ، اغسله بالماء الدافئ والصابون ؛ على الأغشية المخاطية من العين والفم - شطف جيدا بالماء الجاري.

- غسيل اجزاء الجسم الظاهرة بالماء و في حالة عدم وجود ماء يمسح الجلد برفق بقطعة من القماش مع تجنب الاحتكاك القوي بالجلد
- زيادة شرب السوائل
- في حالة وجود صعوبة في التنفس يجري للمصاب تنفس صناعي
- اجابر الشخص المصاب علي القيء
- يرقد الشخص المصاب في وضع الثبات الجاني و تنخفض راسه الي ادني مستوي من جسده وتدار راسه جانبيا
- في حالة تواجد أي مضاد لنوع المبيد المستخدم تعطي للمصاب الجرعة اللازمة
- العمل علي سرعة نقل الشخص المصاب الي اقرب وحدة صحية او مستشفى و لابد من توضيح الاتي للطبيب المعالج
- طريقة حدوث التسمم- توقيت حدوث التسمم- نوع المبيد
- تعتمد طرق الاسعافات الاولية علي الاتي:
- معرفة تأثير المادة السامة داخل الجسم
- ايقاف مفعول المادة السامة و يعني ذلك معادلة السم كيميائيا داخل الجسم
- العمل علي خروج المادة السامة من الجسم
- نظرة مستقبلية عن الاتجاهات الحديثة في مكافحة القوارض
- و من الاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة الآفات بشكل عام و القوارض بشكل خاص تهدف ال ترشيد استخدام المبيدات حفاظا علي الحيوانات الغير مستهدفة و تقليل التلوث للبيئة معتمدين في مجال القوارض علي استخدام بدائل للمبيدات مثل المواد التي تقلل الخصوبة Antifertility التي تستخرج من النباتات الطبية مثل نباتات cassia , neem و المواد الطاردة و استخدام بعض الطفيليات و الفيتامينات و المواد المعقمة وغير ذلك. الغرض من ذلك هو تقليل استخدام المبيدات لعدم تلوث البيئة او التغلب علي ظاهرة المقاومة لبعض المبيدات.

## 2-الخفافيش



❖ **مقدمة:** الخفافيش Bats أو الخفاشيات ومفردها الخفاش أو الخفدود أو الخنفوش أو الوطواط هو الحيوان الثديي الوحيد الذي يستطيع الطيران. والخفافيش نجد أن أيديها وسواعدها تحولت كأجنحة تطير بها وفي كثير من الأحيان قد تصيب بعض المنشآت الغذائية بعمل أوكار للتغذية والمعيشة والتكاثر بها وقد تؤثر ببعض الأضرار للإنسان ، فهو غريب الشكل ، ولا يزيد طوله عن 100 سم، يشبه رأسه رأس الدب أو الكلب الألماني ونشاطه ليلي، يوجه نفسه بواسطة موجات صوتية لا يسمعها الإنسان، يأكل الحشرات والأسماك والنباتات و منها انواع مصاصة للدماء، يفرز لعاباً يمنع دم الفريسة من التجلط، يمتص دم المواشي خلف أذنيها والإنسان من طرف إبهام رجله.

هو من الحيوانات التي تلفت النظر و تبين قدرة الخالق سبحانه و تعالى في خلقه، فهو كائن ينضوي و يتميز بعدد كبير من الخصائص التي تميزه عن غيره من الكائنات و التي تعطيه فريدة منقطعة النظر، تقسم الخفافيش إلى مجموعتين مهمتين، هما مجموعة الخفافيش الصغيرة و مجموعة الخفافيش الكبيرة، فالخفافيش الصغيرة تعتمد في غذائها على أنواع مختلفة من الأطعمة و تتواجد في أماكن كثيرة في مختلف أماكن الكرة الأرضية المتنوعة، في حين تعتمد الخفافيش الكبيرة في تغذيتها على الفواكه كما أنها أقل انتشاراً من الخفافيش الصغيرة و هي تعتمد في تغذيتها على جميع الفواكه و تنتشر في إفريقيا و أستراليا و الهند و غير ذلك بشكل كبير، تنشط الخفافيش ليلاً و في أوقات الفجر المبكرة ، فهي كائنات تعشق الظلمة و تعيش فيها والخفافيش هي ثدييات تنتهي إلى رتبة Chiroptera ، وهي تسمية يونانية تعني " أيدي الأجنحة " hand-wing ، لأن أجنحتها تتكون من أصابع ممدودة ، وتشبه يد الإنسان تشريحياً. الخفافيش ليست عمياء كما أشيع عنها ، فجميع أنواع الخفافيش لديها عيون ، وتستطيع أن ترى ، ولكن على الرغم من ذلك فإن معظم الخفافيش تعتمد على الصوت او الرائحة للعثور على الغذاء.

أطوال الخفافيش تدرج من 3 سنتيمتر كخفاش أنف الخنزير الذي يعتبر أقل الثدييات حجماً وخفاش الثعلب الطائر الذي يبلغ طوله 41 سنتيمتر وجناحه عرضه 1,7متر، ويبلغ وزنه من 2 جرام إلى 1,3 كيلوجرام، ويمكن بسهولة تمييز الذكور البالغة، لأن الذكر البالغ له قضيب بارز وواضح والأنثى

البالغة تتميز بأن حول حلمة الثدي شعر منحول بواسطة الرضيع، كما يمكن تفرقة كثير من الأنواع من صوتها وحجمها وسلوكها وتتميز الذكور من الإناث.  
لقد تم رصد 48 نوع من الخفافيش في الجزيرة العربية وأطرافها (العراق والشام) ذكرها هاريسون في كتابه الثدييات في الجزيرة العربية وهو باللغة الإنجليزية (Mammals of Arabia) واثان منها تتغذى على الفواكه بينما الباقي تتغذى على الحشرات ولا يوجد منها ما يمتص الدماء. ويتواجد في العالم أكثر من 1000 نوع من الخفافيش وهو ما يمثل ربع الثدييات.

### الوضع التقسيمي للخفافيش

Kingdom: Animalia  
Phylum: Chordata  
Subphylum: Vertebrata  
Class: Mammalia  
Order: Chiroptera  
Family: Petropodidae

### ❖ الصفات المورفولوجية (الوصف)

أجنحة الخفافيش مدعمة من الداخل بعظام اليد، وكل جناح مصنوع من طبقتين من الجلد يسمى غشاء الجناح الذي يفرده بين عظام الأصابع ومتصل بجانب الجسم والساق الخلفية، ومغلب الإبهام حر ويستعمله في التعلق بالحيطان ولحاء الأشجار والأسقف أثناء السبات، وتوجد ثلاثة أزواج من عضلات الطيران مثبتة في الساعدين العلويين والصدر لتعطي قوة لأعلى لتساعده علي الطيران، والخفاش يطير بسرعة 100 كم/ساعة ويرتفع بارتفاع 3 كم في السماء، وله قدرة على المناورة في طيرانه، والإبطاء بواسطة ذيله في سرعته، وبعض الخفافيش لها ذيل قصير، والبعض بلا ذيل أو لها ذيل طويل طوله بطول الخفاش كخفافيش ذيل الفأر، وفي بعض الخفافيش يستعمل كشبكة صيد للحشرات أو يكون كالكيس تخزن به الحشرات لتأكلها.

### - الفراء

فراء الخفاش طويل وناعم كالحرير ولونه رمادي، لكن يوجد شواذ منها لونها أبيض باهت كالخفاش الشيخ الذي يعيش في المناطق الاستوائية الأمريكية، أو الخفاش الأصفر الفاتح الذي يعيش في أفريقيا أو أسود اللون كالخفاش ذو الأنف الرمح (المسحوب) الذي يعيش في أمريكا الوسطى، والخفاش الملون له فراء قرمزي اللون وأجنحة سوداء وبرتقالية ليساعده في التخفي بين الزهور، ويوجد نوع واحد لا شعر له

وعاري الجلد وكل شيء مكشوف فيه، ويستعمل الخفاش فراؤه للتدفئة رغم أن الشعر بالوجه والأماكن المكشوفة يستقبل وينقل التأثيرات الحسية كشوارب القطط أو الفئران.

#### - رأس الخفاش

وجوه الخفافيش متباينة بشكل ملحوظ. فخفاش الفاكهة fruit bat الذي يعيش في العالم القديم له فم طويل ومسحوب يشبه فم الكلب أو الثعلب. بينما الخفاش مصاص الدماء vampire bat وأقرباؤه له أنف قصير وبه نتوء كالتخزير.

- آذان الخفاش بما فيها خفافيش الآذان الطويلة نجد أن الأذن طويلة بطول الخفاش نفسه. وعلي جانب آخر نجد خفاش المقابر ذات اللحية السوداء أذنه قصيرة. وتختلف أشكال الأذن. فنجد أذن الخفاش مصاص الدماء الأسترالي واسعة تلتحم وتلتقي فوق الرأس. وكثير من الخفافيش يمكنها استدارة الأذن في اتجاه الأصوات الخافتة. ونجد أن حاسة السمع لدي الخفافيش متطورة للغاية لأنها تسمع بها صوت ارتداد وصدي الصوت.

- عيون الخفاش بعض الخفافيش لها عيون كبيرة وواضحة بينما الباقي لها عيون صغيرة كالخرزة، ولكنها لا تستعملها للرؤية ولا تبصر بهما حيث تحدد اتجاهها من خلال إطلاق الأصوات وارتداد الصوت يسهل لها عملية تحديد الهدف والسرعة المطلوبة والمراوغة مع فريستها، وصغار الخفافيش التي يقل عمرها عن 9 أيام تكون عمياء لكن بعد ذلك تصبح قادرة على الرؤية، ويقال إن مما ساهم بالاعتقاد الخاطئ بأن الخفافيش عمياء هو طريقته بالتحرك التي تشبه الحركة العشوائية المتخبطة بين اليمين واليسار لكن الأبحاث الحديثة أثبتت أنه كائن يستطيع النظر.

- أسنان الخفاش الخفافيش لها أسنان، فالخفافيش المولودة حديثا لها 22 من الأسنان اللبنية، وهذه الأسنان سرعان ما تستبدل بأخرى دائمية 20 – 28 أسنان. وشكل الأسنان تختلف من نوع لآخر حسب نوعية الأكل، ومن الأسنان يمكن التفرقة بين أنواعها، فالخفافيش آكلة اللحوم كالخفافيش مصاصة الدماء لها أنياب حادة وقوية لتمزيق اللحم. ولها أضراس قوية لسحق العظم، والخفافيش آكلة الحشرات لها أضراس حادة حوافها كالمقص لتقطيع الحشرات ولطحنها، والخفافيش آكلة الفواكة لها أضراس سطحها مفلطح كبير لتعجنها.

#### ❖ نطاق الانتشار

تنتشر الخفاشيات في معظم بقاع العالم وخصوصا في المنطقة الاستوائية و المنطقه شبه الاستوائية ويمكنها العيش في الصحاري وو المزارع والغابات وحتى المناطق الصناعية ما عدا القطب الشمالي والقطب الجنوبي

#### ❖ ملاحظة الطيران

عندما تطير الخفافيش ليلاً للبحث عن الطعام وتشم وتسمع وتصدر اصواتاً ترددية مرتدة لتهتدي بها وتتعرف علي طريقها ولتتجنب الارتطام بعائق يعترض طريقها. فالخفافيش الصغيرة الرمامة نجدها تعتمد في طيرانها علي نوع من السونار الذي يعتمد علي التنصت لصدى الصوت لتهتدي به في طريقه. فيصدر الخفاش نبضات صوتية قصيرة لها تردد عال فوق قدرة الإنسان أن يسمعها بأذنيه. فتنتشر موجاتها أمام الخفاش الطائر. فترطم بأي عائق في طريقه فترتد الأصوات كصدى ليترجمها بسرعة ويقدر المسافة بينه وبين هذا العائق وسرعته بالنسبة للبعد منه وحجم الأشياء من حوله ولاسيما أثناء الظلام. فيدير اتجاهه متجنباً الاصطدام به. وعلي جانب آخر معظم الخفافيش الكبيرة آكلة الفواكة نجدها لا تستعمل وسيلة صدى الصوت باستثناء الخفافيش التي تسكن الكهوف والمغارات فتستخدم جهاز تحديد الصدى داخل الكهوف وعندما تخرج للخارج تعتمد على الرؤية والشم.

### ❖ الطعام

أكثر من 65% من الخفافيش تعيش علي الحشرات. ففي أمريكا الشمالية وجد أن الخفافيش العادية والبنية يمكنها أن تستهلك 600 ناموسة في الساعة. والخنافس تعتبر ثلث طعام الخفافيش البنية الكبيرة علاوة علي كافة أنواع الذباب والنمل الطائر. بينما نجد بعض الأنواع كمصاص الدماء الكبير يأكل الأسماك الصغيرة والزواحف والبرمائيات كالضفادع والطيور والثدييات بما فيهم الخفافيش الأخرى. وهذه الخفافيش القناصة نجد أن أقدامها الخلفية طويلة وبها مخالب مدببة وحادة لتستطيع قنص الفريسة أثناء الطيران. وغير هذه الأنواع المفترسة تعيش علي الفاكهة والرحيق. فهي بدون قصد تنشر بذور النباتات وتلقحها.

وقد لاقت الخفافيش مصاصة الدماء عناية من العلماء للتعرف علي سلوكها في الأكل لأنها تتغذي علي الدم فقط. وتعيش في جنوب ووسط أمريكا. فوجد أن أسنانها كالأمواس الحادة حيث تقوم بعمل فتحة صغيرة في لحم الحيوان الثديي لتعلق الدم المناسب من الجرح، وليعيش الخفاش يلزمه حوالي ملعقتين كبيرتين من الدم يوميا. وريق الخفاش به مادة تمنع تجلط الدم وهي أقوى 20 مرة من أي مادة أخرى معروفة مانعة لتجلط الدم ويحضر منها دواء دراكيولين الذي يستعمل مع مرضي الجلطات الدماغية والنوبات القلبية.

### ❖ التكاثر

عند اقتراب موعد وضع الأنثى تنعزل الإناث في مكان آمن حيث تعيش مع بعضها بانتظار الوضع. وتضع الأنثى صغيراً واحداً وهي معلقة بشكل عمودي بعد فترة حمل تبلغ 4 أشهر. الخفاش أكمل الطير خلقاً ليكون أبلغ في القدرة لأن لها ثدياً وأسناناً وأذناً، وهي تحيض وتطهر وتلد. خفاش أعجب من سائر الخلق، ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور، فيكون له الضرع يخرج منه اللبن، ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل، وإنما يرى في ساعتين: بعد

غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفر جدا، ويضحك كما يضحك الإنسان، ويحيض كما يحيض المرأة.

قليلًا ما يعرف عن دورات تكاثر الخفافيش لتنوع أنواعها وانتشارها بالعالم مما لا يمكن حصر أو دراسة الخفافيش ولاسيما في البراري. لهذا يصعب تعميم القول عن حياتها. ومن بين الأنواع التي درست وجد أن لها نشاط جنسي سنوي. ومعظم الأنواع مزوجة فيمكن للفرد أن ينكح العديد. وأنواع كثيرة من الإناث الحوامل تهاجر إلي مستوطنات تضم مئات الإناث الحوامل. وهذه المستوطنات أكثر دفئا من المستوطنات العادية. وهذا يساعد علي نمو الجنين بسرعة داخل وخارج الرحم. وفترة حمل الخفاش تتراوح ما بين 40 يوم و8 شهور. ومعظمها تلد واحد مرة سنويا والبعض يلد توأما. والخفاش ذات الذيل الشعري يلد ثلاثة.

ودورات الإخصاب للخفافيش التي تبيت بيئاتا شتويا أحيانا تنقطع. وبعض الخفافيش منها ما يتزوج في الخريف كالخفافيش البنية الصغيرة وبعدها يبيت بيئاتا شتويا في شهور الشتاء. وتبقى الحيوانات المنوية كامنة في الإناث حين تنهض في الربيع فتقوم هذه الحيوانات بتخصيب البويضة. وفي خفافيش أخرى كخفاش الفاكهة الأصفر الباهت وخفاش الفاكهة المكسيكي يحدث الإخصاب في الحال بعد النكاح لكن تتوقف البويضة المخصبة عن النمو لعدة شهور.

وتلد الخفافيش حيث ينزل الوليد من ناحية المقعد للإقلال من فرصة تعلق الأجنحة بقناة الولادة. والوليد يكون كبيرا نسبيا ويزن من 25 إلى 30% من وزن الأم. ويظل الوليد رأسه من فوق لتحت (بالمقلوب) في الأيام الأولى القليلة ليرضع من ثدي أمه. وحيث معظم الخفافيش تلد واحدا. وهذا سوف يقلق توازنها لو أن وليدها الجديد تعلق من جانب واحد. ولعلاج هذا الخلل يتعلق الوليد بزواوية عبر صدرها. وفمه يمسك ثديا واحدا ورجلاه الخلفيتان تمسك جسم الأم من تحت الإبط. وكل أنواع الخفافيش نجد الأمهات تعتني بوليدها. والأمهات تغذي الوليد فترة رعايته. ولكنها لا يمكنها أن تصطاد وهي حاملة له. لهذا تترك الصغار في الحضانة بالمستوطنة لعدة ساعات كل يوم. وعندما تعود للحضانة فعليها التعرف علي طفلها من بين الزحام الذي يضم أطفالا غرباء وكلهم متشابهون. وتتعرف عليه من تذكرها للمكان الذي تركته به ورائحته المميزة وصوت صياحه. فالخفاشة الأم المكسيكية ذات الذيل الحر يمكنها التقاط طفلها من بين 3000 طفل في المتر المربع بالكهف وكلهم متشابهون. وفي عام 1994 اكتشف العلماء عشر ذكور من خفاش الفاكهة من نوع دياك Dayak بماليزيا. واكتشفوا أن أئدها مملوءة باللبن. ولا يعرف هل ترضع الصغار ولو كان، فيعتبر هذا شذوذا لأنه من المعروف أن الذكور من الخفافيش لاتعتني بصغارها. وستكون الحيوان الثديي الذكر الوحيد الذي يرضع مواليدته. والخفافيش الصغيرة تنمو بسرعة، فبعض الأنواع تتعلم الطيران والسعي بعد 18 يوم. عكس صغار خفاش مصاص الدماء تحتاج لعناية والرضاعة لمدة 6 – 9 شهور من الولادة. وتتجنب الخفافيش المفترسين كالحداة والصقور والبوم والسناجب والكلاب البرية والقطط والأفاعي. ويمكن الخفافيش التعرض للأمراض وحوادث الطيران. وقد تعيش من 10 – 20 سنة

حسب نوعها. والخفاش البني قد تطول حياته إلى 32 سنة، ولاشك أن الخفافيش في العالم تواجه محنة الانقراض الجماعي لتدمير المراعي ومواطنها وسوء استخدام المبيدات الحشرية السامة. والإنسان يتضايق منها لأنها تسبب له الخوف والإزعاج فيقتلها وكان يعرف في قديم الزمن أن الخفاش يتغذى على الإنسان وهذا غير صحيح. وكان يوجد 30 مليون خفاش بكهف بالغابة القومية بجنوب شرق أريزونا. لكن ما بين عامي 1963 و1970 انخفض العدد ليصبح 30 ألف. وقد سجل في كل القارات والجزر أن 99,9% من الخفافيش قد انقرضت.

### ❖ سلوكيات وطبائع الخفافيش

- الخفافيش هي الثدييات الوحيدة القادرة على الطيران، فهناك ثدييات أخرى يمكنها التحليق فقط مثل السناجب الطائرة أو بعض أنواع الليمور، فهي تقفز بأجنحة جلدية تشبه المظلات، ولكنها غير قادرة على الطيران مثل الخفافيش.
- تحورت أطرافها الأمامية إلى أجنحة.
- تعيش في الكهوف والأماكن المظلمة
- تعيش في بيئة اجتماعية معقدة جدا
- يقوم الذكر برعاية الأنثى
- قدرة فائقة على حفظ الطاقة عن طريق تخفيض معدلات الأيض الأمر الذي يساعدها على النجاة والهرب.
- عظام الذراع واليد رشيقة وطويلة الأمر الذي يساعدها على الطيران.
- تمتلك مخالب في إصبعها الأولين.
- أجنحة قصيرة لكنها عريضة.
- هي تشكل نحو 25% من أنواع الثدييات، وفي الولايات المتحدة وحدها، هناك حوالي 45 نوعاً من الخفافيش.
- نشاطها ليلي (تكافح نهاراً في أوكارها، ويوضع الطعم قبل الغروب في المزارع).
- تعيش في المباني المهملة، والأشجار الكثيفة، والكهوف في المناطق الإستوائية.
- تبحث عن غذائها بالقرب من مصادر المياه لتتغذى على الحشرات الطائرة (نضع الطعم بالقرب من مصادر المياه).
- تتعرف بعض الخفافيش على اتجاهها عن طريق إصدار الصوت واتباع الصدى. فهذه الأصداء الصوتية تحدث نتيجة لسلاسل من الأصوات ذات الترددات القصيرة والعالية التي تحدثها الخفافيش



باستمرار أثناء الطيران، وعن طريق هذه الأصداء تتعرف على الاتجاه والمسافة للأهداف في المنطقة، هذه العملية الخاصة بأصداء الصوت تسمى تحديد موقع صدى الصوت

● الخفاش ليس أعمى ولكن نظره بسيط (حاسة الإبصار ضعيفة) ويستخدم نظام الرادار لتحديد مكان الطعام وهو طائر في الظلام الدامس، حيث يرسل من حنجرتة ترددات صوتية فوق الترددات السمعية (أي أعلى من 20 كيلو هيرتز) لا يسمعها الإنسان تصطدم بالأشياء وتستقبلها مرة أخرى فتحدد مكانها وحجمها فتبتعد عن الأشياء الضارة أوتتغذي علي فرائسها (لذلك أحيانا نقوم بتعليق الطعم السام ليكون في متناولها). ومن نفس الحنجرة يطلق الخفاش صيحات يسمعها الإنسان وذلك للتواصل مع بني جنسه.

● تنام الخفافيش و رأسها للأسفل للأسباب التالية

- عظام سيقان الخفافيش الخلفي خفيفة وضعيفة لذلك تكون غير قادرة علي تحمل وزنها اذا وقفت منتصبه
- حتى لا تستهلك كمية كبيرة من الطاقة
- تنطلق الخفافيش للطيران بسهولة من خلال هذا الوضع (الرأس لأسفل اثناء الراحة)



الوضع المقلوب عند الخفافيش

- وفيات الخفاش مرتفعة نسبياً لانطلاق صغارها اول مره من الوضع المقلوب، او اصابتها بالامراض ولكن إذا عاش صغبر الخفاش في بيئة آمنة حتى فترة البلوغ، وبعيداً عن الإصابة بالأمراض والطفيليات ، فيمكنه أن يعيش فترة طويلة ، ومعظم الخفافيش تعيش ما بين 10 إلى 20 عاماً، رغم أن هناك حالات موثقة لخفافيش عاشت إلى 30 عاماً ، وهناك واحداً من الخفافيش في أوروبا بلغ من العمر 41 عاماً في عام 2013 ، مما يجعله أطول خفاش في العمر.
- الخفافيش الإناث تلد جروا واحداً فقط كل عام .

- الخفاش أكل الحشرات ، يمكنه ان يستهلك نحو 2,000-6,000 من الحشرات كل ليلة ، فقد يتناول ما يعادل وزن جسمه كل مساء ، وفي الواقع ، ان الخفاش البني يمكنه أن يصطاد كل ليلة نحو 1,200 حشرة صغيرة في الساعة الواحدة.
- بعض الخفافيش تخرج عن المألوف في التغذية على الحشرات ، حيث تتغذى على الضفادع والزواحف الصغيرة والطيور ، وتم العثور على انواع في أمريكا الوسطى والجنوبية تتغذى على الأسماك ، عن طريق إستخدام الصدى للكشف عن التموجات في المياه والتي تنتج عن تحرك الأسماك، فتمكن من إصطيادها.
- من المعروف أن توربينات الرياح تتسبب في وفاة عدد كبير من الخفافيش، وتتسبب في وفاة الخفافيش بطريقتين ، الأولى :عن طريق إصطدام الخفافيش بشفرات التوربينات ، والثانية :وهي أقل حدوثاً ، حيث يحدث تلف في الرئتين الناتج عن الضغط الكبير عندما تحلق الخفافيش بالقرب من التوربينات ، فينتج عن ذلك نزيف داخلي مما يسبب الوفاة للخفاش.
- أكثر الأنواع المهددة بالإنقراض من الخفافيش هو خفاش الفاكهة ، فقد تم العثور على 160 خفاش فقط في كهف في بابوا غينيا الجديدة ، وهو من ضمن 250 نوعاً مهدداً بالإنقراض، وأكثر من 50% من الخفافيش في الولايات المتحدة معرضة لخطر الإنقراض ، حيث تشهد إنخفاضاً حاداً في أعدادها.
- بعض انواع خفافيش الفاكهة ، والتي تسمى Tent-making bats ، تتخذ أوراق الأشجار أو النباتات ، مأوى لها ، فتقوم بثنى الورقة كأنها خيمة لتحتمي بها من الحيوانات المفترسة ، والمطر والطقس السيء.
- هذا يعني أنه اذا وضعت كل الثدييات في مجموعات تتكون من أربع فواحد من كل مجموعة سوف يكون خفاش، وفي الواقع من بين الثدييات تعتبر القوارض كالجرذان والفئران والسناجب لديها الكثير من الأنواع العديدة.والخفافيش قد تبدو قليلا مثل القوارض ولكنها في الحقيقة أقرب وأكثر إرتباطا بالقروود والليمور والبشر.
- هناك ما يقرب من 1100 نوع معروف من الخفافيش في جميع أنحاء العالم، وهذا يجعل ما يقرب من ربع جميع أنواع الثدييات في الوجود خفافيش، هذا يعني أنه اذا وضعت كل الثدييات في مجموعات تتكون من أربع فواحد من كل مجموعة سوف يكون خفاش، وفي الواقع من بين الثدييات تعتبر القوارض كالجرذان والفئران والسناجب لديها الكثير من الأنواع

العديدة.والخفافيش قد تبدو قليلا مثل القوارض ولكنها في الحقيقة أقرب وأكثر إرتباطا بالقرود والليمور والبشر.

- الخفافيش تأكل الكثير ولكن لا تحصل على الدهون: الخفافيش يقضون معظم الليل يبحثون عن الطعام ومن ثم يتناولونه والصغير يأكل الكثير من الطعام والخفاش البني الواحد يمكن أن يأكل أكثر من ألف بعوضة في ساعة واحدة والخفافيش مصاصي الدماء يمكن أن تشرب 28 جم من الدم في خلال 20 دقيقة ويعتبر هذا أكثر من وزن الجسم والعديد من الخفافيش تستطيع أن تأكل حتى تصل إلى ضعف وزن جسمها في الليلة الواحدة ومع ذلك لا تستطيع أن تجد خفاش يعاني من السمنة وذلك لأن الخفافيش التي لديها سمنة لن تكون قادرة على الطيران عملية الأيض أو التمثيل الغذائي في الخفافيش سريعة وهذا يعني أن الطعام يتحول إلى طاقة بسرعة ويمكن أن تهضم كل شيء تقريبا يأكلونه في خلال 20 دقيقة أو أقل ويعتبر هذا وقت قصير بالنسبة للبشر الذين يستغرقون ثلاث أيام لهضم وجبة.
- أكبر الخفافيش كالثعالب الطائرة وأصغرهما كالنحل الطنان. هل سمعت عن الثعالب الطائرة؟ حسنا إنهم في الواقع ليست ثعالب إنهم خفافيش، وهي تعتبر أكبر الخفافيش الموجودة في العالم، وبعض من أكبر هذه الخفافيش تسمى الثعلب الطائر الذهبي العملاق المتوج، والثعلب الطائر لديه أجنحة يصل طولها إلى حوالى 6 أقدام أي 1.8 متر، ويبلغ وزنه حوالى 3 رطل أي حوالى 1.4 كيلو جرام، والثعالب الكبيرة الطائرة قادمة من جنوب شرق آسيا ومن الهند، ويطلق عليها الثعالب الطائرة لأنها تبدو مثل الثعالب، والثعالب الطائرة لها أذن صغيرة وعيون كبيرتان جداً مثل خفاش الثعلب الطائر الذهبي العملاق المتوج، أصغر الخفافيش تعرف بخفافيش النحلة، وذلك لأن مع أجنحتها المغلقة يبلغ طولها حوالى واحد بوصة أي 2.5 سم، وحتى مع نشر أجنحتها فإنها لا تزال صغيرة فيصل طول جناحها إلى 6 بوصة أي 15 سم، ويعتقد بعض العلماء أنه من أصغر الثدييات في العالم.
- الخفافيش تستطيع أن تطير بسرعة كبيرة تصل إلى 60 ميل أي 97 كيلو متر في الساعة، وهذا يجعلها أسرع من البومة.
- الخفاش أكمل الطير خلقا ليكون أبلغ في القدرة لأن لها ثديا وأسنانا وأذنا، وهي تحيض وتطهر وتلد. خفاش أعجب من سائر الخلق، ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور، فيكون له الضرع يخرج منه اللبن، ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل، وإنما يرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جدا، ويضحك كما يضحك الإنسان، ويحيض كما تحيض المرأة

- الخفافيش تعيش لفترة طويلة. هناك شيء آخر عن الحيوانات الصغيرة وهي أنها لا تعيش طويلا فمعظم الحشرات تعيش لبضعة أسابيع أو أشهر والبعض منها يعيش ليوم واحد أو يومين، والفأر يعيش حوالي ثلاث سنوات، والشيء نفسه بالنسبة الى عصفور المنزل، ومع ذلك فيمكن أن تعيش الخفافيش لمدة تصل الى (20-30) عاما و هي مدته أطول من الفترة التي تعيشها الكلاب، حيث أن الخفافيش لديها جهاز مناعي قوي قادر على تحمل الكثير من الإصابات.
- الخفافيش قد تحمل بعض الأمراض ولكنها لا تتأثر بها ويعتقد العلماء أن الطيران يساعد الخفافيش إلى البقاء في صحة جيدة وهذا ما يثبت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تفعل العجائب بالصحة.
- الخفافيش تحب أن تحافظ على نفسها نظيفة ، البعض يعتقد أن الخفافيش قدرة ومقرزة ولكن الخفافيش مثل القطط نظيفة فهي تستطيع أن تنظف نفسها باللعق ولا توجد قاذورات أو فضلات متعلقة بأجسامها فعندما تكون الخفافيش معلقة رأسها الى أسفل ورجلها الى أعلى وتريد أن تقضي حاجتها فتذهب وتصبح معتدلة حتى تقضي حاجتها ثم تعود مرة أخرى الى وضعها الطبيعي رأسها الى أسفل وتعتبر فضلات الخفافيش شيء له قيمة حيث أنه من الأسمدة الفعالة.
- ليس كل الخفافيش تعيش في كهوف : نشاهد على شاشات التليفزيون أن الخفافيش تعيش في الكهوف معلقة رأسها الى أسفل مع عيون متوهجة ولكن في الواقع أن الخفافيش تنام في الكهوف المظلمة أثناء النهار ويدخل البعض في مرحلة البيات الشتوي لعدة شهور ومع ذلك ليس كل الخفافيش تعيش في الكهوف ، فبعضها ينام على الأشجار والبعض الآخر داخل المنازل والمباني المهجورة والبعض يختبئ وراء شبكة العنكبوت وآخرين يصنعون خيمة من أوراق الأشجار.
- بعض الخفافيش له وجه يبدو غريب الأطوار : معظم البشر يتفقون على أن الخفافيش ليست من المخلوقات الطبيعية الجذابة فمعظمهم له صورة بشعة والبعض له صورة مفزعة فهناك خفافيش حدوة الحصان والذي له أنف يشبه حدوة الحصان وهذه الخفافيش لديها تجاعيد على وجهها وهناك خفافيش الفاكهة والتي لديها أنف أنبوبية الشكل وهناك الخفافيش المقنعة والتي لديها انتفاخات في العينين، وقرن فوق أنفها وكل هذه الأطوار الغريبة تساعد الخفافيش في تحديد المكان عن طريق الصدى وكلما كان الخفاش أكثر قبحا كلما كان أكثر كفاءة.

#### ❖ أهم أنواع الخفافيش

##### 1- خفاش الفاكهة المصرية

خفاش الفاكهة المصري كطفل رضيع . انه من الأنواع الموجودة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.



2- خفاش الفاكهة قصير الأنف الكبير (Cynopterus sphinx)

قزم خفافيش الفاكهة


الخفاش القزم الذي يعيش بالمنطقة الاستوائية بأفريقيا والذي يزن 170 جرام لا بد أن يأكل 500 جرام من الفاكهة الطازجة كل ليلة أي حوالي ثلاثة أضعاف وزنه، وأثناء النهار الخفافيش تنام نهاراً بالكهوف وتجاويف الأشجار والمباني وفروع الأشجار وغصونها. هذا النوع لطيف يبعث على السخرية وهو صغير الحجم ، حيث يبلغ طوله حوالي 3-3، 7 بوصة . يتواجد في أفريقيا ، ويأكلون الثمار الصغيرة ، والرحيق وحبوب اللقاح.




3- الخفاش ذو الأنف الورقي (Asellia tridens)




4- الخفاش عاري البطن (Taphozous nudiventris) يتواجد بكثرة في الكويت ويعيش بتجمعات كبيرة جداً، وهو أحد الخفافيش الثلاثة التي تم رصدها في الكويت وهي خفاش أذن الفأر الكبير، خفاش كُهل.



-5 خفاش أذن الفأر الكبير (Myotis myotis)



-6 خفاش كُهل (Pipistrellus kuhlii)



-7 خفافيش حدوة حصان البحر الأبيض المتوسط

خفاش حدوة الحصان الكبير (Rhinolophus ferrumequinum)

يتم العثور على هذا المخلوق في المناطق المشجرة الحارة ، ولا سيما مع الكثير من الكهوف المتوافر بها مصدر المياه و يتغذي علي الحشرات الصغيرة.



-8 خفاش الذيل الحر المكسيكي (Tadarida brasiliensis)



#### 9- خفافيش الانف – ورقة كاليفورنيا

وجد هذا النوع من الخفافيش في المكسيك والولايات المتحدة ، هذا النوع يحب حرارة الصحراء . يمكنك العثور على هذه الخفافيش في صحراء سونوران وموهافي ، حيث تفضل تناول العشاء على الحشرات مثل الصراصير والجنادب والعتث . وهي طيارة ماهرة بشكل خاص ، ولديها القدرة على الطيران بسرعة منخفضة باستخدام الحد الأدنى من الطاقة.



#### 10- الخفاش الأبيض في هندوراس

تختلف كثيرا عن معظم الخفافيش ، هذا النوع رائع الشكل مثل الثلج الأبيض الجميل ، مع أذانه الصفراء.



#### 11- الثعلب الطيار الهندي

هذا النوع من الخفافيش هي واحدة من أكبر الخفافيش ، مع جناحها التي يمكن لطولها أن يصل إلى 4-5 قدماً . لأن خفافيش الفاكهة تأكل كل أنواع الفواكه المختلفة ، فهي من الملقحات الحيوية . هذا النوع يمكن أن يتجول ما بين 9-40 ميلا في الليل.




12- الخفافيش البنية الكبيرة

الخفافيش البنية الكبيرة هو نوع من الخفافيش اللطيفة ، والتي يمكن العثور عليها في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والأجزاء الشمالية من أمريكا الجنوبية . للأسف ، المتلازمة البيضاء للأنف تشكل تهديدا خطيرا لأنواع الخفافيش الأخر



13- خفافيش متلازمة الأنف الأبيض

وتسمى هذه العائلة من الخفافيش لـ خفافيش حدوة الحصان بسبب شكل الجلد حول أنوفهم . وهي من الخفافيش الآكلة للحشرات ، وذلك باستخدام الأذان الضخمة من أجل تحديد الموقع بالصدى ، وأجنحتها الواسعة لرحلة رشيقة وخاصة في مطاردة فرائسها.



14- خفافيش الأذنين البنية الطويلة


ويتميز هذا نوع من الخفافيش الأوروبية أيضا ولا سيما بالأذان الطويلة ، ويعتمد هذا النوع على عينيه بقدر أذنيه لإيجاد الفريسة . يتناول هذا النوع من الخفافيش على العث المتواجد بين أوراق الشجر واللحاء من الأشجار.





### 15- الخفافيش الصفراء ذات الأذنين

تم العثور على هذه الخفافيش الرائعة في كولومبيا وكوستاريكا والاكوادور ونيكاراغوا وبنما في الغابات دائمة الخضرة الناضجة. ومع ذلك ، فإنها من الخفافيش اللطيفة إلا أن فقدان الموائل المتعلق بإزالة الغابات لإنسان وتدهور الموائل من التهديدات لتواجدها.



### 16-- الصحراء الطويلة – الخفافيش أذنين

وجدت في المناطق الصحراوية من المغرب عبر مصر وشبه الجزيرة العربية ، فهذا الخفافيش متواجدة في المناطق القاحلة وعلى ما يبدو أنها أكثر قسوة.



### 17-Pygmy pipistrelle

هذه الأنواع الأوروبية التي تحب التسكع بالقرب من الأنهار والجداول . يتناول هذا النوع من

الخفافيش على الطعام على طول الغابات والأراضي الرطبة والولائم على البراغيش المائية والحشرات الأخرى.



Greater false

-18

vampire bat

وجدت في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا في الغابات المطيرة الرطبة . يمكن أن تأكل كل شيء من الحشرات الكبيرة كالسحالي والضفادع والفئران والطيور الصغيرة وحتى الأنواع الأخرى من الخفافيش الصغيرة.




18- Great fruit-eating bat


يتواجد هذا النوع في أمريكا الجنوبية والوسطى ، وهذا نوع من الخفافيش الذي يتواجد في الغابات والذي يواجه الخطر بسبب فقدان الموائل.



19-Eastern red bat




20- Gambian epauletted fruit bat




21- Hoary bat



22- Spectacled flying foxes



23- Southern little yellow-eared bat



24- Pale spear-nosed bat



25-Lesser short-nosed fruit bat



26- Kitti's hog-nosed bat




27. الخفافيش الصغيرة مصاص دماء كاذبة

يمكن العثور على هذا النوع من الخفافيش في شقوق الصخور والكهوف ، وأوراق الشجر وتجاويف الأشجار.



28- خفاش مصاص الدماء الشائع (Desmodus rotundus).



❖ كيف يمكن التعرف علي وجود الخفافيش في المنزل او داخل المنشآت

- مشاهدة الخفافيش ليلا
- سماع ضوضاء مزعجة في الفترة بين الغسق و الفجر و غالبا ما تكون تلك الضوضاء مريرا او خدش او اصوات الزحف علي الجدران

- الفضلات وهي العلامات الاساسية لتحديد النوع ففضلات الخفافيش تشبه فضلات الفئران الا انها تحتوي علي لمعة خفيفه
- ظهور بقع علي شكل شرائط بيضاء اللون علي جزء من النافذة نتيجة تبولها
- تراكم فضلات وشحوم حول فتحات الدخول او السقف تشير للإصابة

#### ❖ أضرار الخفافيش:

- بعضها يتغذي علي ثمار الفاكهة (المانجو، البرتقال، المشمش، التفاح، الكمثري، الزيتون، البلح، العنب، التين) وتهاجم ثمار البلح المتساقطة وكذلك المنشورة للتجفيف في الواحات وأسوان.
- تهدد السياحة عن طريق إزعاج السياح أو ترك بقع بنية تمثل البراز علي جدران المعابد
- تهاجم أحيانا المنشآت الغذائية
- القليل منها ماص للدماء في المناطق الإستوائية.
- عضه الخفاش قد تسبب مرض الكلب (السعار)
- تنقل أمراض بكتيرية وفيروسية للإنسان أو الحيوان عند العض، مثل مرض داء الكلب في الإنسان و امراض فطرية و امراض طفيلية.
- لماذا لا تمرض الخفافيش الحاضنة للداء؟ العديد من الأمراض الخطيرة تم إكتشافها بأنها تنقل عن طريق الخفافيش إلى البشر مثل فيروس مرض الإلتهاب الرئوي الحاد ( السارس ) ، الإيبولا ، فيروس مابورغ ، فيروس هيندرا وأخرها متلازمة الجهاز التنفسي وذلك على سبيل المثال لا الحصر. ففي الواقع فان الخفافيش تعتبر مخزن لاكثر من 60 نوع من الفيروسات التي يمكن أن تصيب البشر وفقا لدراسة أجريت في عام 2013 ، والسؤال الآن هو لماذا لا تصاب الخفافيش بتلك الامراض على الرغم من أنها تعتبر ناقلة لهذه الأمراض الى البشر ؟
- والجواب طبقا لأحدث النظريات العلمية هو أن قدرة الخفافيش على الطيران يحميها من الإصابة بتلك الأمراض التي تعتبر مميتة للبشر ، حيث قال الباحثون أنه في حالة طيران الخفافيش فإنه يزيد لديها معدل التمثيل الغذائي وارتفاع كبير في درجات الحرارة مما يجعل درجة حرارة الجسم تشبه درجة حرارة الثدييات المصابة بالحمى ، وهذا يشير إلى أن رحلات الطيران التي تقوم بها الخفافيش يحميها من الإصابة بنفس الطريقة التي تحمي الحمى باقي الثدييات كما قال الباحثون.
- وقد خلص الباحثون في تلك النظرية أن زيادة معدلات التمثيل الغذائي وارتفاع درجات حرارة الجسم التي تصاحب طيران الخفافيش تؤدي إلى تنشيط الجهاز المناعي وبالتالي تكون رحلات الطيران للخفافيش هي التفسير النهائي لتطور الإلتهابات الفيروسية دون ظهور علامات المرض على الخفافيش.

كما أن تطور بعض الفيروسات الموجودة في الخفافيش بحيث تكون أقل فاعلية على الخفافيش في حالة إرتفاع درجة حرارة الجسم ، وبذلك تكون تلك الفيروسات غير ضارة للخفافيش في حين أنها تسبب الأمراض عند عبورها إلى الحيوانات الأخرى حيث أن تلك الفيروسات تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة المختلفة.

وينتظر الباحثون القيام بتجربة عملية لإثبات صحة تلك النظرية عن طريق دراسة الاستجابة المناعية في الخفافيش عند الراحة وبعد رحلة الطيران والنظر ما إذا كانت الإستجابة المناعية أقوى بعد رحلة الطيران إم لا.

- ولقد عرف مؤخرا أن الخفافيش لها فوائد. من بينها أنها عدو طبيعي للحشرات التي تطير ليلا. وتقوم بتلقيح حوالي 500 نوع من النباتات كالموز والبلح والمانجوو والتين والكاشيو. وتفرز أيضا سمادا غنيا بالنتروجين يطلق عليه جوانو. guano

#### ❖ مكافحة الخفافيش داخل المنشآت الغذائية

##### مكافحة ميكانيكية

- التنظيف الجيد يوميا
- إصلاح الجدران
- سد جميع الفتحات و الشقوق
- إغلاق كل منافذ الوكر أو المكان ومنع وصول التغذية إلى القطيع حتى الموت .
- إستخدام شباك صيد
- إستخدام المواد الطاردة مثل الفينول
- من الممكن السماح له بالخروج

##### المكافحة الكيميائية

- التدخين ببعض المواد الكيميائية
- إستخدام مبيدات القوارض مثل عمل كور من العجوة المخلوطة بفوسفيد الزنك 2 – 3 %.
- تبخير الأوكار بإستخدام بروميد المثيل أثناء تبخير البلح ضد حشرات البلح في الواحات .

يمكن إستخدام المبيدات الحشرية في عمل طعوم سامة للخفاش مثل اللانيت والالفاكرون والبندوكارب وغيرها من المبيدات الحشرية ذات الفاعلية القوية الآمنة بيئياً ولكن في حالة إجراء المكافحة داخل المنشآت الغذائية لا بد من إجرائها تحت إشراف متخصصين في برامج مكافحة الآفات .

مثال (1) للمكافحة الكيميائية

1- في حالة وجودها في أماكن مغلقة (كهوف، أو منزل مهمل،...):-

يتم عمل مخلوط من الكبريت والشطة بنسبة (30جم زهر كبريت : 1 جم شطة) وعمل حفرة نار ووضع المخلوط في النار، مع غلق المكان جيداً والخروج بسرعة من المكان، ويتم ذلك خلال النهار حيث أن نشاطها ليلي.

· ينتج عن حرق الكبريت غازات (SO,SO2,SO3) وكلها غازات سامة.

· نواتج حرق الشطة تنشط الخفافيش فتخرج من مخابها فتتعرض للغازات السامة.

مثال (2) للمكافحة الكيميائية

2. في المزارع التي تهاجمها الخفافيش وتسبب لها أضرار:-

يتم تحضير طعم العجوة وعمل كور صغيرة بحجم البرتقالة الصغيرة وتعلق بخيط دوبارة علي قطعة من الخشب بين الأشجار أو بالقرب من مصادر المياه قبل الغروب.

· تحضير طعم العجوة:-

عجوة وتخلي من النوي، مبيد سريع المفعول (فوسفيد الزنك أو تيميك).

يتم الخلط بنسبة 3 جم فوسفيد زنك إلي 100 جم عجوة خالية من النوي، وتهرس مع بعضها جيداً باليد مع لبس جوانتي أثناء التجهيز، ثم يتم عمل كرات صغيرة وتربط بخيط ويتم تعليقها في سنادات خشبية قبل الغروب.

### 3- الطيور Birds



❖ مقدمة: الطيور حيوانات فقارية، من ذوات الدم الحار، تضع البيض، وهي ثنائية الحركة، وذات أجنحة وريش. هناك عشرة آلاف نوعٍ من الطيور تقريباً، وهذا يجعل صف الطيور أكثر الصفوف غنّاً بالأنواع بين صفوف الفقاريات رباعيات الأطراف كلها. الطيور الحية كلها تُدرج تحت طبقة الطيور الحديثة (Neornithes)، وتنتشر في البيئات المختلفة حول الأرض، من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. تتراوح أحجام الطيور الحية من خمسة سنتمترات كما في طنان النحل، إلى 2,75 متر كما في النعامة. يشير علم الأحياء القديمة إلى أن الطيور ظهرت خلال العصر الجوراسي، قبل 160 مليون سنة تقريباً، ويعتقد العلماء أن الطيور نجت من انقراض العصر الطباشيري-الثلاثي الذي وقع قبل 65,5 مليون سنة.

تتميز الطيور الحديثة بالريش الذي يغطي جلدّها، والمناقير الخالية من الأسنان، ووضعها لبيض صلب القشرة، وامتلاكها لمعدل تمثيل غذائي مرتفع، وامتلاكها لقلب ذي أربع حجرات، وهيكل عظمي خفيف الوزن ولكنه قويّ. أنواع الطيور الحية كلها تملك أجنحة، والاستثناء الوحيد لذلك هو طائر المو النيوزلندي عديم القدرة على الطيران، والأجنحة هي الأطراف الأمامية للطيور، ومعظم أنواع الطيور تستطيع الطيران، أما الطيور التي لا تستطيع الطيران فتشمل النعاميات والبطاريق وعدداً من الأنواع المختلفة التي تتوطن الجُزر. للطيور أيضاً أجهزة هضمية وتنفسية فريدة ملائمة للطيران. كما تُعدُّ بعض الطيور، لا سيّما الغرابيات والبيغاوات، من أذكى أنواع الحيوانات، فقد شوهدت بعض أنواع الطيور تصنع أشياء وتستخدمها، وكثير من الأنواع الاجتماعية تنقل معرفتها الثقافية من جيل إلى جيل. يهاجر كثيرٌ من أنواع الطيور هجرات سنوية لمسافات طويلة، ويهاجر كثير من الأنواع الأخرى هجرات أقصر وبصورة غير منتظمة. الطيور حيوانات اجتماعية، تتواصل عبر الإشارات البصرية وعبر الأصوات والغناء، وتشارك في بعض السلوكيات الاجتماعية، التي تشمل التعاون في الاعتناء بالصغار والصيد وحماية الموطن من المفترسات. الغالبية العظمى من الطيور تتزوج زواجاً أحادياً، أي يتخذ كل طائر زوجاً واحداً فقط، غالباً خلال موسم تزاوج واحد، وأحياناً لسنوات، ولكن نادراً أن يستمر معاً طيلة حياتهما. هناك أنواع أخرى تتزوج زواجاً متعدداً، أي يتزوج الذكر أكثر من زوجة واحدة، ونادراً تتزوج الأنثى أكثر من زوج واحد. يوضع البيض عادة في عش، ويقوم الأبوان باحتضانه، ومعظم الطيور تقوم بالاعتناء بصغارها بعد فقس البيض لمدة طويلة.

الكثير من أنواع الطيور لها أهمية اقتصادية، فبعضها يشكل مصدراً مهماً للغذاء، عن طريق الصيد أو التربية. وبعض الأنواع تُربى على أنها حيوانات أليفة، لا سيّما الطيور المغردة والبيغاوات. ومن فوائد الطيور أيضاً استخدامُ ذرقها (فضلاتها) في صناعة الأسمدة. تدخل الطيور في ثقافات البشر بشكل ملحوظ، فهي تدخل في بعض الأديان والقصائد والأغاني. هناك تقريباً 120-130 نوعاً من الطيور تعرضت



للانقراض نتيجة أنشطة البشر منذ القرن السابع عشر، ومئات غيرها قبل ذلك، وحالياً هناك 1200 نوع تقريباً مهدد بالانقراض بسبب أنشطة البشر، وهناك محاولات عديدة لحمايتها. قد تصيب بعض أنواع الطيور أحيانا المنشآت الغذائية لذا وجب علينا إلقاء الضوء سريعاً عليها من حيث الوضع التقسيمي و ببعض مميزاتهما و أنواع التغذية ومنافعها و أضرارها وبرامج مكافحتها.

#### ❖ الوضع التقسيمي

Kingdom : Animalia

Sub kingdom: Metazoa

Phylum : Chordata

Sub phylum : Vertebrata

Class : Aves

#### ❖ مميزاتهما:

- 1- حيوانات فقارية ذات دم حار مهينة للمعيشة في الجو وعلى الأرض وفي الماء.
- 2- الجسم مغطى بريش .
- 3- الأطراف الأمامية تتحول إلى أجنحة تتحرك بواسطة عضلات صدرية تغطى عظام الصدر .
- 4- الجلد جاف لا توجد به سوى غدة واحدة " غدة فوق الذيل " التي تفرز مادة زيتية لتنظيف ومنع إلتصاق الريش أو عدم ابتلاله بالماء أثناء العوم والسباحة .
- 5- الفك لا يحملان اسنان – يمتدان للامام مكونان المنقار المغطى بمادة قرنية .
- 6- حاسة الشم ضعيفة بينما حاسة الأبصار قوية
- 7- عظام الطيور جوفاء ولا تحتوى على نخاع
- 8- القصبة الهوائية بها حنجرة علوية وأخرى سفلية المسئولة عن أحداث الاصوات .
- 9- القناة الهضمية تمتاز بآنتفاخ المرئ ليكون الحوصلة التي تقوم بالهضم الجزئى للطعام اما الهضم الكامل يتم من خلال القانصة " المعدة الثانية "
- 10- جميع الطيور تضع بيضاً في عشوشها والبيض ويحتوى كمية كبيرة من المح ومحاط بقشرة جيرية .

#### ❖ عادات الطيور



- الاستعراض:

تبدأ ذكور الطير في البحث عن إناثها عند بدء موسم التناسل وغالبا ما تكون الذكور أجمل و أبهى من الإناث ويكون في ريشهم مناطق زاهية اللون و أحيانا تكون ذيولهم أطول من تلك التي للإناث و لبعض الذكور خصلات أو قزعات تجعلهم يبدوون أكثر جمالا وهم يستعرضون ريشهم الجميل أمام الإناث.

- الغزل:

يبدأ الغزل باستعراض الذكر لألوانه الزاهية أمام الإناث و تقوم الذكور ذوو الريش الطويل مثل الطواويس برفع هذا الريش ونشره على شكل مروحة وهم يرقصون و يتبخثرون.

- التغريد : و تقوم الطيور أيضا بالتغريد لكي تجتذب أزواجها و أصوات الغربان في العادة خشنة منفرة ولكنها أثناء الغزل تحدث أصواتا ناعمة و جميلة.

- الهدايا:

يقوم الذكر أحيانا بالإضافة إلى تغريده للأنثى بتقديم الهدايا إليها فإنه قد يحضر لها طعاما في منقاره فتفتح هي منقارها لتتناوله وفي أحيان أخرى يقدم لها عودا صغيرا فيبدو هذا كأنه إحياء لها بالبدء في بناء العش.

- مولد طائر:

في موسم التناسل تتزاوج الطيور وتبني أعشاشها وتضع بيضها و معظم الطيور تفعل هذا مرة في العام. ينبغي لذكور الطير أن تتزاوج مع الإناث قبل أن تصبح قادرة على وضع البيض ويحدث التزاوج بأن يمتطي الذكر ظهر الأنثى ثم يجعل فتحته الخلفية تلامس فنحة الأنثى ويصب فيها السائل المنوي الذي يحتوي على ملايين الحيوانات المنوية و هي خلايا متناهية في الصغر لدرجة أنها لا ترى إلا بالمجهر. ويوجد المبيض بداخل جسم الأنثى ويتكون البيض داخل المبيض من خلايا تسمى الخلايا البيضية. و تمتلئ الخلية البيضية بمادة المح ثم تنفصل عن المبيض و تمر في أنبوبة حيث تلتقي بالحيوان المنوي ويدخل الحيوان المنوي في الخلية البيضية وبهذه الطريقة يبدأ تكوين الفرخ. و يتجمع الزلال في البيضة و تتكون لها قشرة من غدتين خاصتين عندما تمر عليهما البيضة و هي في طريقها إلى خارج جسم الأنثى.

- فترة الصداقة:

ينبغي أن تتصادق الطيور أثناء الغزل حتى يتعرف كل منها على الرفيق الذي يمكن أن يميل إليه و يشاركه.

- موسم التناسل:

إن الطيور تتزاوج في وقت معين من السنة يسمى موسم التناسل يتوفر فيه الطعام اللازم لتنشئة الصغار. و يتجمع الذكور و الإناث في أزواج ويتسافد الزوجان وبعد ذلك تضع الأنثى بيضها و تنمو الأفراخ داخل البيض الذي يوضع في العش فلو أن الأنثى حملت صغارها بداخل جسمها لأصبحت ثقيلة الوزن غير قادرة على الطيران.

- خلية البيضة:

إن كل جنين يبدأ من خلية واحدة ولا يمكن لهذه الخلية أن تنمو وتتحول إلى فرخ إلا إذا اتحدت مع خلية أخرى تأتي من الذكر وهي بعد ذلك تنقسم مرة بعد أخرى فتتكون منها عدة مئات من الخلايا التي تبني جسم الفرخ و تتحول بعض هذه الخلايا إلى عضلات و البعض الآخر إلى عظام ..إلخ.

- وضع البيض:

إن الوقت الذي يمر ما بين السفاد و وضع البيض يختلف باختلاف أنواع الطير و كذلك يختلف الوقت الذي يستغرقه وضع البيضة فإن أنثى الواقواق تضع بيضها في ثوان معدودات بينما تتم هذه العملية في طيور أخرى في عشر دقائق وفي ساعتين في حالة أنثى الديك الرومي أو أنثى الأوز.

- متى يوضع البيض:

إن بعض الطيور تضع بيضها في وقت معين من النهار فطيور الشرشور و الطرغلوس و الطيور الطنانة تضع بيضها عند مشرق الشمس و الحمام بعد الظهر و الدراج في المساء و يتم وضع بيضة واحدة في المرة الواحدة وتوضع البيضة التالية في اليوم التالي وقد يمر يومان أو ثلاثة و بعض الطيور يضع بيضة واحدة كل أسبوع وقد يستمر بعض إناث الطير في وضع البيض بدون انقطاع لو أن البيض أخذ من العش أولاً بأول فإن العصفور الدوري يضع عادة أربع أو خمس بيضات ولكنه قد يضع خمسين بيضة لو أن البيض أخذ من العش بمجرد وضعه. ونفس الشيء يحدث لدجاج المزرعة وقد كان أسلاف هذا الدجاج طيوراً برية تعيش في الغابة و لأنها كانت تضع بيضا كثيرا استؤنست و أصبحت من حيوانات المزرعة.

- جلد الطائر

جلدة ( بشرة ) الطيور تظهر صفات نوعية كثيرة للزواحف حيث لا يوجد غدد بشرية فيها ( الغدة البشرية الوحيدة في الطيور هي الغدة الزيتية ) و أكثر أجساد الطيور لها بشرة رقيقة مكونة من طبقتين أو ثلاثة طبقات خلوية.

### ❖ أنواع التغذية في الطيور:

- 1- طيور تتغذى على الحشرات Insectivorous : " ابو قردان – الهدهد – ابوفصادة
- 2- طيور تتغذى على اللحوم Carnivorous : " الصقور- البوم الحداة "
- 3- طيور تتغذى على البذور والثمار Gramivorous : " الحمام – اليمام – العصافير
- 4- طيور تتغذى على الاعشاب Herbivorous : البط وانواعه

## 6- طيور تتغذى على ما يصادفها Omnivorous : طيور كائسة " الغراب "

## ❖ أضرار الطيور

و تلتهم الطيور كميات لا يستهان بها من الحبوب المخزونة في العراء كما أنها تلوث ببرازها أكوام الحبوب، خاصة إذا كان عددها كبير، أما في المخازن فلا تشكل الطيور خطرا إلا إذا كانت المنافذ تسمح بدخولها وايضا لها العديد من الاضرار سوف تذكر لاحقا وهي كالتالي.

## 1- ضرر مباشر

- مهاجمة المحاصيل في الحقول
- ( الغريان- العائلة الزرزورية )
- مهاجمة الطيور الداجنة
- مهاجمة طوائف النحل " الوروار "
- التغذية علي الطيور الداجنة الغير صالحة للاستخدام الادمي

## 2- ضرر غير مباشر

- نقل بذور الحشائش
- نقل المسببات المرضية للنبات او الدواجن
- نقل الطفيليات بالنسبة للانسان
- استخدام مخلفات الطيور الداجنة والزينة في الأعلاف للحيوانات تزيد من الحامض البولي وتصيب الإنسان بالفشل الكلوي وتنقل أمراض السلمونيلا وأنفلوانزا الطيور واحيانا السرطان

## 1- نفع مباشر

-الطيور الداجنة (لحوم – البيض – مخلفات كسماد)

## 2-نفع غير مباشر

- المفترسات: تتغذي علي ( الحشرات- القوارض- الجراد- الخفافيش)
- تعتبر الطيور من الآفات المهمة للحبوب، و هي قائمة في الحقل وأثناء تخزينها في العراء. ويتوقف مقدار الفقد على عدة عوامل:
- 1. مدة بقاء الحبوب في العراء

2. عدد الطيور المهاجرة وقرب أو بعد المصدر التي تأتي منه أسرابها.
3. ما يتخذ من احتياطات لإبعادها.

#### ❖ أهم أنواع الطيور التي يمكن أن تهاجم المنشآت الغذائية

- 1- عصفور النيل الدوري
- 2- اليمام المصري
- 3- الغربان
- 4- العائلة الزرزورية وغير ذلك

#### ❖ مكافحة الطيور داخل المنشآت الغذائية

- الطرق الزراعية
  - التنسيق في مواعيد الزراعة بحيث لا يتم الزراعة مبكراً أو متأخراً عن باقي الزمام حتى لا تتركز الإصابة في منطقة بذاتها.
  - العناية بالأشجار حول الحقول لأنها مأوى لتعشيش العصافير.
- الطرق الميكانيكية
  - صيد الطيور بالشباك
  - لجأ صيادون إلى التكنولوجيا لتسهيل عملهم حينما استعانوا بجهاز جديد يطلقون عليه اسم "المنادي" يحتال على فطرة الطيور بتقليد أصواتها وأصوات صغارها ليجمعها في مكان معين ومن ثم يقومون بإطلاق رصاصات بنادقهم الرشاشة عليها ليصطادوها بأعداد كبيرة.
  - تكسير وهدم العشوش
  - إستخدام المواد الطاردة او وسائل الازعاج من اصوات وطلقات
  - إستخدام شواخص من نفس الطيور
  - إستخدام الشرائط النايلون من النوع الرفيع في طرد الطيور
  - إستخدام دعامات خشبية بجوار الأشجار حول الحقول عليها ألواح خشبية مغطاه بمادة لاصقة

-إستخدام مسدسات الصوت لحماية المحصول في إحدى أطواره فقط أى لمدة 15 يوم

-تشجيع الاعداء الحيوية من المفترسات

#### ● الطرق الكيماوية

- يمكن حماية البذور من هجمات طائر القنبر وذلك بمعالجة البذور قبل زراعتها بمبيدات الريزولكس أو الميزارول حيث يضاف 0.5كجم منها إلى 2 لتر لبن ثم يضاف المخلوط إلى 100 كجم من البذور وتغلف الحبوب جيداً أو تترك حتى تجف ثم تزرع.
- في طور النضج يمكن إستخدام بعض المبيدات مثل السيانوكس أو الميزورال رشاً على الحبوب وهي في الطور اللبني بتركيزات منخفضة 0.5 % كمركبات طاردة.
- يمكن إستخدام مبيدات حشرية أخرى آمنه بيئياً ومصحح بها من وزارة الصحة في حالي إصابة المباني و المنشآت تحت إشراف متخصصين.

#### 4-الزواحف

الزواحف Reptiles، حيوانات رباعية الأرجل وسلوية amniote ، يكون جنينها محاطا بغشاء سلوي Amnion. وهي الحيوانات التي تزحف للتحرك والانتقال .حاليا لا يوجد من الزواحف سوى أربع رتب:

- التمساحيات : Crocodilia تضم 23 نوعا.
  - خطيمة الرأس : Rhynchocephalia تضم نوعين فقط(تاوترا الموجودة في نيوزلندا)
  - حرشفيات : Squamata الأوسع تضم 7,900 نوعا تقريبا أهمها الأفاعي.
  - سلحفيات : Testudines تضم حوالي 300 نوع.
- وبعكس البرمائيات فالزواحف لا يدخلون في مرحلة يرقة (larval stage) في الماء ومعظمهم من الحيوانات التي تبيض ولا تلد، علماً أن بعض الحرشفيات يلدون ولادة. معظم الزاحف لديهم بيوض جلدية بحيث تمنعهم من خسارة المياه وتأقلمهم مع الحياة البرية. وقد تم جمع الكثير من المعلومات عن الزواحف وتم تصنيفهم إلى آكلات لحوم وآكلات أعشاب. الزواحف هي من الفقاريات التي يمكن أن تعيش في اليابسة ، وهي قادرة على السفر على الأرض أو في المياه لتلبية حاجتها ، والزواحف يتبدل جسمها باستمرار حتى تتمكن من النمو وتتميز بذيول تستخدمه للدفاع مثل السحالي وغيرها واخرى تختبئ داخل قواقعها مثل السلاحف واخرون يستخدمون لستعتهم للدفاع عن انفسهم مثل الافاعي .وهناك زواحف

تتميز ببشرة جامدة جدا وفكين ممدودين وفم مجهزة بأسنان حادة مثل التماسيح. ومن أهم الآفات الزاحفة التي يمكن أن تسبب أضرارا بالغة داخل المنشآت الغذائية هي الثعابين والابراص وسوف تلقي الضوء عليهم باختصار.

### أولا:- (الثعابين)



#### الثعابين

يعتبر الثعبان Snake أو الأفعى أو الحية من زواحف ذوات الدم البارد يتبع رتيبة Serpentes من رتبة الحرشفيات له جسم متطاول، مغطى بحراشف، ولا توجد له أطراف، أو أذنين خارجيتين، وجفون، يسبب قلق كبيراً لمن يروه والشعور بالخوف الشديد، لأنه يوجد أنواع من الثعابين سامة وقد تكون سبب في فقدان الحياة، وهي تسبب قلق كبير على حياة الإنسان وتكون شديدة الخطورة عليه، أو غير سامة وهي من أكالات اللحوم يمكنها إبتلاع فريسة كاملة. وهناك عدة أسماء للتعريف بالثعابين أولها الأسماء العامة التي وردت في اللغة مثل الحيات والأحناش والأين والعنقاء والصل والعيم والعين ولكل من هذه الأسماء معني يميز بعض الأنواع عن غيرها ، أما الاسم الآخر فهو اسم للتعريف بالثعبان كوجود علامة مميزة به أو تسميته بمكان وجوده أو بغذائه ، أما الاسم العلمي أو الاسم اللاتيني المصطلح عليه والذي يطلق على كل عائلة من الثعابين فيكون خاص مثل . NAJA-CROTALUS-ELAPHE

#### ❖ اهم سلوكيات الثعابين

- عمر الثعبان
  - للثعبان لا يوجد ما يدل على عمره كغيره من الحيوانات ولكن قدرت الأعمار بناءً على دراسات أجريت حول ( متوسط ) حياة الثعابين بداية من خروجها للحياة حتى موتها ، هذه الدراسة خرجت بنتائج مفادها أن معظم الثعابين تعيش لفترة تتراوح بين ( 15 - 25 ) سنة تقريباً.
- عظام الثعبان
  - جسم الثعبان طويل وله هيكل عظمي مميز تتراوح فقراته من ( 200 – 400 ) فقرة ، هذه التركيبية تساعد الثعبان في التحرك والعصر والسباحة بشكل فعال دون الحاجة إلى وجود أطراف كباقي الحيوانات.

• كيف يسير الثعبان

تتحرك الثعابين حركات مختلفة للسير فهناك مثلاً الالتواء الجانبي و الالتفاف الجانبي و الحركة الانقباضية وهي حركات تميز بعض الأنواع عن بعضها.

• جلد الثعبان

للثعابين جسم مغطاة من الخارج بحراشف سميكة ، تتكون من طبقات تتجدد باستمرار لحماية الجلد والجسم، والجلد في الثعابين ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي :  
1- المنطقة العليا ذات الحراشف الصغيرة .  
2- منطقة فاصلة وسطي بحراشف أكبر ولون مختلف عن سابقتها 3- منطقة سفلية بحراشف عرضية.



● الموازنة المائية : بعض الثعابين وخصوصاً تلك التي تعيش في الأماكن الحارة ذات الجفاف الشديد لديها إمكانية عمل موازنة للماء الموجود في جسمها بحيث تستطيع الصبر عن الشرب لمدة طويلة دون أن تتأثر ، وذلك بتكرير البول مرة بعد مرة للاستفادة القصوى من الماء الموجود فيه

#### ● التغذية

يمكن القول عموماً بأن الثعابين تتغذى على كل ما يدب على وجه الأرض من حشرات وزواحف وطيور وثدييات وبيض وحتى الأسماك والإنسان لو اقتضى الأمر ، وتتبع الثعابين في تغذيتها نظاماً معيناً فهي لا تتناول وجبات يومية ، حتى أن بعض الأنواع لا تتناول وجبات لفترات طويلة قد تصل لسنة أو أكثر دون أن تتأثر بذلك ، وحتى يصل الثعبان لغذائه فإنه يتبع عدة خطوات يمكن إجمالها فيما يلي :

1- البحث عن الفريسة : عندما يشعر الثعبان بالجوع فإنه يبحث عن فريسة تناسب حجمه أي كان نوعها سواء من القوارض أو الطيور أو الزواحف ، ونجد الثعبان وقد تحرك لسانه بسرعة فائقة إشارة لوجود شيء ما قد يكون وجبة دسمة ، عندها يترصد الثعبان بالفريسة ويقتررب منها بكل هدوء وحذر حتى يصل لمسافة تسمح له بالانقضاض عليها.

2- القبض على الفريسة : يتحين الثعبان الفرصة الملائمة للقبض على الفريسة بحيث لا تؤذيه ثم يلتف عليها والضغط عليها حتى تموت إن كان من الثعابين غير السامة أو ذو سمية خفيفة ، أما الثعابين ذات السم الزعاف فإنها تحقن الفريسة بالسم في لمح البصر ثم تتركها لتموت

3- ابتلاع الفريسة : يبدأ الثعبان بابتلاع الفريسة التي قد تفوقه حجماً فللثعابين قدرة على تناول أشياء تفوق أحجامها مرات عديدة وذلك لمرونة عظام الفك والقدرة على شد الجلد المغطي للجسم ، ومعظم الثعابين تبدأ بالتهام الفريسة ابتداء من منطقة الرأس إلا أن بعضها لا يهتم بذلك خصوصاً لو كانت الفريسة صغيرة الحجم بالنسبة للثعبان .

4- دفع الفريسة للمعدة وبدء عملية الهضم : بعد ابتلاع الفريسة يتحرك الثعبان يمناً ويسرة لدفع الفريسة لمنطقة المعدة وعند استقرارها تبدأ عملية الهضم التي يساعد فيها سم الثعبان والإفرازات التي في المعدة ، وقد تستغرق عملية الهضم هذه ساعات أو أيام .

5- إخراج الفضلات : هناك طريقتان يمكن للثعبان بواسطتهما إخراج الفضلات من جسمه الطريقة العادية من فتحة الشرج أو عن طريق الفم وذلك بالنسبة للأجسام الكبيرة أو القشور والأظافر التي لا تستطيع المعدة الثعبان هضمها.

### ● تكاثر الثعابين

منح الله سبحانه وتعالى الثعابين القدرة على التكاثر بشتى الطرق ، ويمكن تقسيم طرق تكاثر الثعابين إلى ما يلي :

- وضع البيض Oviparous

- إبقاء البيض داخل جسم الأم Ovoviviparous

- إباضة داخلية وخارجية Viviparous

- ولادة حقيقية Real birth

وعملية التكاثر لدي الثعابين عملية ذات طقوس ومراسيم معينة لا يمكن التزاوج إلا بعد إنهاؤها هذه الطقوس هي :

البيات الشتوي : تجتمع الثعابين عادة في أحد الشقوق أو المغارات لتقضي فيها فترة الشتاء أو ما يسمي بالبيات الشتوي ، هذه العملية مهمة جداً بالنسبة للثعابين فهي المسؤولة عن تنشيط هرمون التكاثر لدي الثعابين .

مرحلة الطلب واستعراض القوي : بعض انقضاء الشتاء تخرج الثعابين من جحورها وأول ما تفعله هو تغيير ثوبها ثم تبدأ بعد ذلك مراسيم التزاوج بعرض العضلات بالنسبة للذكور حيث يتقاتل الذكور مع بعضهم في مصارعة تسببه رقصة الباليه وكل منهم يحاول الإيقاع بالأخر حتى يفر أحدهما ويبقى المنتصر ليتجه إلى الأنثى التي تقبل التزاوج معه بعد هذه المعركة .

مرحلة التزاوج : يتم الاتصال بين الذكر والأنثى التي تكبره حجماً ، وقد تستغرق هذه العملية عدة ساعات لينفصل كل منهم عن الأخر ، وتبدأ مرحلة تكوين البيض لدي الأنثى .

وضع البيض : بعد عدة أيام من التلقيح تبدأ الأنثى بالبحث عن عش تضع فيه بيضها ، هذا العش لا بد وان تتوفر فيه الحرارة والرطوبة اللازمين لفقس البيض ، حتى تجد المكان المناسب فتبدأ في وضع البيض الذي يختلف عدده من نوع لأخر ولكنه قد يصل في المتوسط إلى 25 بيضة .

حضان البيض : الثعابين حيوانات غير اجتماعية أي أنها لا تعيش في نظام أسري فعند وضع البيض تتركه ليفقس دون أي رعاية منها ، إلا أن بعض الأنواع تحرس البيض حتى يفقس ويخرج منه الصغار ثم تتركهم ليعيشوا حياتهم دون أي رعاية من الأم .

فقس البيض : عند فقس البيض الذي يستغرق عادة قرابة 6 أسابيع يبدأ الصغار بالخروج إلى الحياة معتمدين على أنفسهم ، ويكون الثعابين الصغار مثل الكبار تماماً فلو كان الثعبان الكبير سام فإن الصغار سيكونون مثله .

بداية الحياة : يخرج الثعابين الصغار إلى الحياة ومعهم الكثير من المتاعب التي تواجههم فهناك أعداء كثر للثعابين كما أن البيئة قد تكون قاسية عليهم إضافة إلى الأمراض التي قد يتعرضون

لها ومشاكل الخروج من البيض حتى لا يبقى منهم سوى عدد قليل يكمل دورة الحياة التي وضعها الله سبحانه وتعالى .

### \* طرق الدفاع

يدافع الثعبان عن نفسه أسوة بغيره من الحيوانات ، فكل حيوان عند تعرضه للخطر يظهر شراسة لم تعهد فيه وضراوة لم تشاهد من قبل ، وطرق الدفاع لدي الثعابين متنوعة وكثيرة تختلف من ثعبان لخر ، هذه الطرق قد يستخدمها الثعبان بحسب ما سخر له فمن الثعابين من يملك طرق عديدة ومنها ما لا يملك سوى طريقة أو طريقتين يستخدمها حسب حاجته فإن لم تفلح واحدة استخدم الأخرى أو قد يستخدم بعضها مجتمعة ليكون وقعها أكبر وتأثيرها أشد وأكثر ، من هذه الطرق ما يلي:

- العض Bite
- حقن السم Venom Injection
- إصدار روائح كريهة Malodour
- التبرز والتبول على العدو Excretion
- فرد منطقة الرقبة Spreading hood
- رفع الذيل Raising tail
- الدفن Burying
- قذف السم Spitting poison
- إصدار أصوات :
- الفحيح Hiss
- الحشرجة Rattle
- القرقعة Rumbling
- الارتكاز والوقوف Support, Stand
- وجود رسومات على الجسم Traces, Marks, Signs
- التلون Colouring
- تشابه الذيل والرأس Head and tail resemblance
- التكور Coiling
- التخفي Disguise
- القفز والطيران Jumping and flying
- العصر Constriction
- نفخ الجسم Body – swelling

-التفلطح Flating

- التخشب Boarding

- بصق الدم Spitting blood.

-التظاهر بالموت Died-pretence

-فتح الفم Mouth open

● ثوب الثعبان

يقوم الثعبان بتغيير ثوبه بما يسمى عملية الانسلاخ ، وهو يقوم بذلك عدة مرات في العام الواحد قد تصل إلى 5 مرات ، ويحتاج الثعبان عند القيام بهذه العملية لعدة أمور لعل من أهمها :  
- التغذية الجيدة .

- البعد عن المؤثرات الخارجية التي تؤثر في سلوكه .

-تواجده في بيئة مناسبة .

- خلوه من الأمراض .

وثوب الثعبان المنزوع عبارة عن خلايا ميتة من مواد دهنية تظهر فيه جميع تفاصيل جسم الثعبان حتى انه يمكن في الكثير من الأحيان التعرف على الثعبان من ثوبه ، هذه العملية يحتاجها الثعبان لتساعده في تنظيف الجسم كما إنها تساعد الثعبان عند كبر حجمه لأنه لولا وجود هذه العملية لأختنق الثعبان ومات نظراً لتركيبه الجسم الحرشفية ، وبالطبع تحتاج هذه العملية من الثعبان الكثير من الجهد نظراً لأن هذه العملية تحتاج إلى عدة مراحل هي :

- الركود وتكوين الثوب .

- بداية خلع الثوب من الرأس .

-الزحف خارج الثوب للتخلص منه نهائياً .

-إزالة الباقي من الثوب عبر الاحتكاك مع أي جسم خشن .

### ● سموم الثعابين

سموم الثعابين عبارة عن مواد وعناصر مختلفة تتجمع في مكان خاص بمنطقة الرأس يعرف بخزان السم ، وتتكون سموم الثعابين من عدة مواد هي :

-سموم .

-مواد غير سامة ذات تأثيرات حيوية .

-أنزيمات مع الأملاح والأحماض .

وتختلف السموم من نوع لأخر بحسب نوع الثعبان وحجمه ومكان معيشته ، ويمكن تقسيم السموم إلى أربعة أنواع هي :

1-سموم ذات تأثير على صفائح الدم وجدران الأوعية الدموية .

2-سموم ذات تأثير على الأعصاب .

3-سموم ذات تأثير على العضلات .

4-سموم ذات تأثيرات خارجية .

وبالطبع فإن لكل نوع من هذه السموم دور خاص في تأثيره على الملدوغ ، ولعل من أهم تأثيرات هذه السموم ما يلي :

-صداع حاد .

-دوخة .

-الشعور بالغثيان .

-آلم شديد بالبطن .

-رعشة وتعرق .

-الأعراض الداخلية الناتجة عن تأثير هذه السموم بالجسم .

التعرف على الثعبان السام

هناك سؤال يحير الكثير من الناس هو : هل يمكن التعرف على الثعبان السام من غير السام ؟ للإجابة على هذا السؤال نحتاج لمعرفة الكثير من الحقائق عن الثعابين وعن تركيبها وأشكالها ، ومن الصعب جداً على الشخص العادي التعرف على الثعبان السام من غيره إلا أن هناك حقائق بسيطة يمكن أن تسهل هذه العملية وتمنحنا القدرة على التعرف على الثعبان السام من غيره ، من هذه الحقائق ما يلي :

-طريقة السير فكل الثعابين التي تسير بطريقة جانبية سامة .

-اللون فمعظم الثعابين ذات اللون الأسود خطيرة وسامة ، وكذلك الثعابين ذات الألوان البراقة .

-الثعابين التي تفرد منطقة الرقبة مثل الكوبرا تعتبر خطيرة وسامة .

-الثعابين ذات الملمس الخشن خطيرة وسامة .

- الثعابين ذات الرأس الدائري سامة .
  - الثعابين ذات الطرف المجلجل سامة .
  - معظم الثعابين ذات الأشكال الغريبة تكون في الغالب سامة وخطرة .
- كما يمكن التعرف على الثعابين السامة من غيرها من المراجع المتخصصة وكتب الثعابين التي تعرف القارئ بالثعبان السام من غيره ، وهناك أيضاً الأهالي فهم اعلم بالثعابين الخطرة التي تعيش بجوارهم من غيرهم ، لعل هذه النقاط هي أهم النقاط التي يمكن التعرف بها على الثعبان السام من غيره إلا أن هناك نقاط أخرى أكثر دقة هي عائلة الثعبان ووجود الأنياب والشكل العام والتركيبية الحرشفية والتركيبية اللونية...

### \*إستخراج السم

الثعابين السامة يمكن استخراج السموم منها عن طريق حلبها من الأنياب ، والثعابين المستحلبة عادة ما تكون من الثعابين ذات الأنياب الأمامية مثل الأفاعي والكوبرا ، وطريقة الحلب تكون عن طريق وضع كوب أو قمع في فم الثعبان بحيث تلامس حافة الكوب سقف الحلق خلف الأنياب مباشرة مما يوجي للثعبان بأنه يعض على شيء ما ومن ثم الضغط على منطقة معينة بالرأس لتحفيز الثعبان على إفراغ السم الموجود بالخران الخاص بالسم ...

وقد يتساءل البعض : هل عند حلب السم لا يصبح الثعبان خطراً؟

إن الثعابين عند حلبها أو عند إفرازها للسم تبقي احتياطي كاف لديها لتستخدمه عند الحاجة وهي لا تفرغ السم الموجود لديها إلا بنسب معينة.

- 70% من الثعابين تضع بيضها و30% تلد
- تميل الثعابين التي تضع البيض إلى العيش في مناطق أكثر دفئاً، حيث يساعد الدفء على حضانة بيضها. في حين أن ثعابين الولادة عادة ما تكون في المناطق الباردة، حيث إن الأرض تكون باردة للغاية بحيث لا تسمح بحضانة للبيض. لا تعكف الثعابين على رعاية ذريتها مثل الثدييات، ولكن بعض الأنواع تحمي بيضها والمواليد الجديدة لفترة قصيرة بعد فقس البيض. وتُعد الكوبرا هي النوع الوحيد المعروف ببناء أعشاش فعلية لبيضها، وتحمي الأمهات تلك الأعشاش بشراسة.
- بعض الثعابين يمكن أن تطير

قد تبدو فكرة أن يحلق ثعبان في الجو وكأنها جزء من كابوس، ولكن هناك قلة من الثعابين في أدغال جنوب وجنوب شرق آسيا يمكنها أن تطير. وهذه الثعابين السامة لا يمكن أن ترتفع في طيرانها مبلغ ارتفاع الطيور.

- طريقة السير: هناك حركات مختلفة للسير لدى الثعابين فهناك مثلاً الالتواء الجانبي والالتفاف الجانبي والحركة الانقباضية وهي حركات تميز بعض الأنواع عن بعضها .
- السموم : تختلف سموم الثعابين باختلاف الأنواع وتتفاوت نسب الحوادث من جهة لأخري بناءً على عدة عوامل كالتركيب الجغرافي ، وعدد الأصناف ، والصحة العامة ، وكثافة السكان وأنواع الثعابين....
- الندبة : لبعض الثعابين فتحات فوق منطقة الفم هذه الفتحات والتي تسمي الندبة عبارة عن رادار حراري بحيث يسمح للثعبان بالرؤيا ليلاً أو في الظلام الدامس.
- العظام : للثعابين جسم طويل وهيكل عظمي مميز تتراوح فقراته من 200 – 400 فقرة ، هذه التركيبة تساعد الثعبان في التحرك والعصر والسباحة بشكل فعال دون الحاجة إلى وجود أطراف كباقي الحيوانات.
- البعض يخطئ في إطلاق لفظ أفعى على الثعابين فكل أفعى ثعبان وليس كل ثعبان أفعى
- كلمة ثعابين تطلق بشكل عام على اصناف هذا الزاحف و ان جميع الافاعي سامة وليست كل الثعابين سامة
- الأفاعي ثلاثة آلاف نوع أقل من الربع منها من النوع السام
- خلع أنياب السام منها لا يغير من سميته
- الثعبان الحقلي غير سام ان سالمته بقي في الحقل وصار أليفا وهو مفيد جدا للبيوت والحدائق
- الثعابين كلها غير هجومية بل تدافع عن نفسها
- سم الأفعى عن طريق الهضم هو فقط بروتين كالببيضة وكل رواية أو خوف من ضخ للسم في الطعام أو الشراب هو كذب ومغالطة
- ينحصر أذى السم فقط عندما يدخل مجرى الدم وفي نوع وحيد عندما يدخل العين

- المناطق القطبية هي فقط الخالية من الافاعى بسبب طبيعة المنطقة وبعض المناطق الاخرى تعتبر خالية من الافاعى السامة مثل نيوزلندا وكوبا وهايتى وجمايكا وبورتوريكو وايرلندا وبولينايسيا وهواى.
  - من الصعب تصنيف الثعابين لأن هناك أسس كثيرة يمكن الاعتماد عليها في التقسيم أو التصنيف ، ويمكن اعتبار بعض هذه الأسس ركيزة للتصنيف فمثلاً هناك تصنيف بحسب السمية الموجودة لدي الثعابين :
    - بحيث تنقسم الثعابين إلى قسمين هما :
    - 1-ثعابين سامة : تنقسم إلى قسمين هما :
      - أ – ذات سمية شديدة
      - ب - ذاتسمية ضعيفة .
    - 2-ثعابين غير سامة : تنقسم إلى قسمين هما :
      - أ – ثعابين عاصرة.
      - ب - ثعابين غير عاصرة .
- كما يمكن اعتبار مكان المعيشة ركيزة في التصنيف فمثلاً :
- ”ثعابين صحراوية .
  - ”ثعابين الصخور .
  - ”ثعابين الأشجار .
  - ”ثعابين البرك والمستنقعات .
  - ”ثعابين البحار والمحيطات .
- ويمكن التصنيف بناءً على وجود الأنياب لنصل لتصنيف هو :
- ”ثعابين عديمة الأنياب .
  - ”ثعابين ذات أنياب أمامية متحركة .
  - ”ثعابين ذات أنياب أمامية ثابتة .
  - ”ثعابين ذات أنياب خلفية.

يمكن تقسيم الثعابين بناءً على درجة سميتها او طريقة معيشتها او وجود انيابها وفيما يلي سوف نذكر لكم أهم أنواع الثعابين في مصر بناءً على درجة سميتها:

أولاً: أهم أنواع الثعابين السامة



### 1- الكوبرا المصرية:

- أفعي سامة كبيرة الحجم قد يصل طوله إلى مترين.
- لها القدرة على نفخ رقبتة ورفع الثلث العلوى الأمامى لإخافة خصومه.
- يكثُر بالقرب من الأراضى الزراعية، وقد يرى عند التجمعات المائية بين المزارع لأنه يحسن السباحة ويعد من أخطر وأشرس الثعابين السامة، كما أنه يشكل خطرا على الفلاحين حيث يكثُر في البيئات الزراعية في الدلتا وحول حوض النيل وفي جميع الأراضى الزراعية.

### 2 – الافعي ذات القرنين أو الأفعي المقرنة (الطريشة)

- أخطر انواع الأفاعى، حيث أن سمها يستطيع قتل الإنسان في ثوانى.
- توجد أنواع كثيرة منها في صحراء مصر، ومنها النوع الطائر في سيناء ومرسى علم وحلايب وشلاتين.
- تنام طول النهار وتبدأ في صيد فرائسها بعد المغرب وطوال الليل.
- تبتلع الفئران الصغيرة والعصافير والضفادع والبرص.

### 3- الحية القرعاء (افعي الرمال)

- تعيش في الأماكن الرملية وتنتشر في سيناء، من الثعابين السامة سمها دموي وليس عصبى تنشط في الغالب خلال الصباح وبعد الظهر، في حين خلال الصيف الصيف الحار يقتصر نشاطها على ساعات الليل الأولى وتتغذى على القوارض والسحالي والطيور وتنصب الكمائن لاصطياد الفرائس حيث تدفن نفسها بالرمل وتوم بتحريك ذيلها كالدودة لجذب لإغراء الفريسه وتنتظر حتى تاتي ومن ثم تنقض عليها.

### 4- افعي الرقطاء

- أفعي سامة جدا تعيش في البيئات الصحراوية وفي الأماكن الجبلية تتواجد في شرق مصر.
- من أخطر الأفاعى حيث يمكنها طعن السم عدة مرات متتالية. ، تحتل المرتبة

### 5- افعي الحراشيف المنشارية

الثانية بعد الأفعي المقرنة.

- توجد بمصر بسيناء والصحراء الشرقية حتى الجنوب، ويوجد منه عدة أنواع <sup>[SFP]</sup>منتشرة في كثير من المناطق على مستوى العالم، وهي أفعي سامة جدا شبه صحراوية كثيرا ما تختبئ تحت الصخور. تتغذى على القوارض والسحالي والضفادع والعقارب.

## 6- الثعبان الخبيث الاسود

- هو من أخطر الثعابين في العالم، وهو الثعبان الوحيد الذي لا يمسك باليد لأن أنيابه خارج فمه. ويستطيع العض وفمه مغلق ولا يعرف تركيب سمة وتأثيره ويعد ذلك سببا في عدم وجود مصل مضاد للسسم حتى الآن

- طوله لا يتجاوز 60 سم.

- رأسه تشبه ذيله، وتؤدي لدغته للوفاة في خلال 10 دقائق.

حقائق مثيرة للاهتمام حول الثعبان الاسود الخبيث :

- من النوع السام جدا والنادر جدا يعيش في جنوب ووسط سيناء.

وينشط الاسود الخبيث خلال ساعات الليل ويتغذى على القوارض والسحالي

ويوجد العديد من الثعابين السامة الاخرى مثل ثعبان سيناء وغيره من الثعابين.

الحجم والوزن

الثعبان الاسود الخبيث يمكن أن يصل طوله إلى 20 بوصة (نادرا ما يصل إلى 3 أقدام)

\*الوصف

الثعبان الاسود الخبيث ذو اللون الأسود أو اللون الوردى مع اللون البني . منطقة البطن هي المنطقة

الأخف وزنا . الثعبان الاسود الخبيث مغطاة على نحو سلس بجلد لامع صغير . جسم الثعبان الاسود

الخبيث يصبح باللون الأزرق مع اللون البنفسجي عندما يكون الثعبان على استعداد لتقشير جلده .

الثعبان الاسود الخبيث لديه عيون صغيرة مستديرة . يتشكل الجسم الأسطواني الرقيق لينتهي مع ذيل

قصير . الثعبان الاسود الخبيث يمكنه التخفي في مكان صغير \*معيشته .

يعيش الثعبان الاسود الخبيث في جحور تحت الأرض ، بينما عادة ما يمكن رؤيته على أرض الواقع بعد

هطول الأمطار الغزيرة . لدى الثعبان الاسود الخبيث أنياب مجوفة منحنية ، حيث انه يهاجم الضحية من

الجانب بطعنات قوية حتى الموت . عمليا ، يفتخ الثعبان الاسود الخبيث فمه لأول مرة عندما يحتاج إلى

ابتلاع فريسته . يستخدم الثعبان أيضا للأنياب الطويلة للتلاعب مع فريسة ميتة .

الثعبان الاسود الخبيث من الثعابين التي تضع خطة استراتيجية للصيد الغير عادي ، وذلك بسبب

معيشته في منطقة صغيرة ومصعب التحرك فيها ، لذا فإنه بحاجة للتخطيط المسبق للتنفيذ من خلال

حركات الجسم المحدودة . ومن المعروف أيضا أن الثعبان الاسود الخبيث يختبئ في التحجيم الصغير .

\*النظام الغذائي

النظام الغذائي ل الثعبان الاسود الخبيث يعتمد على القوارض المختبئة بالإضافة إلى الزواحف والضفادع

والجراد والنمل . فقد أظهرت التجارب أن الثعبان الاسود الخبيث من الحيوانات التي تعيش في الأسر ،

ودائما ما يقتل كل القوارض المتواجدة في القفص .

**\*سم الثعبان الاسود الخبيث**

ينتج الثعبان الاسود الخبيث صوت قوي ، ويطلق السم الحليبي ، والذي يتألف من خليط من السموم والإنزيمات التي تقتل فريسة الثعبان بكفاءة . سم الثعبان الاسود الخبيث نادرا ما يقتل البشر (باستثناء الأطفال) . إنه يتسبب في التهييج ، والألم ، والتورم والخدر في المنطقة بالقرب من الجرح .

**\*التزاوج**

الثعبان الاسود الخبيث يستخدم حاسة الشم لإيجاد شريك التزاوج . غالباً ما يكتفي الذكور بزوجة واحدة ، في حين أن الإناث في بعض الأحيان لا تكتفي بشريك واحد . تضع الأنثى ما بين 2-11 بيضات في التربة الرطبة أو تلال النمل الأبيض المهجور خلال فصل الصيف . وتستمر فترة الحضانة ما بين 6-8 أسابيع .

**\*الموائل والحفظ**

يسكن الثعبان الاسود في منطقة السافانا والسهول العشبية والموائل الشبه صحراوية والمناطق الكثيفة . الثعبان الاسود الخبيث يعرف أيضا باسم أفعى الخلد لأنه يشبه الأفعى التي تعيش في الجحور تحت الأرض (وهو تماما مثل هيئة ثعبان الخلد) . أعداد الثعبان الاسود الخبيث مازالت كبيرة ومستقرة في البرية . هذه الثعابين ليست على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض .

**\*العمر**

الثعبان الاسود الخبيث يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 23 سنة في البرية .

**ثانيا: الثعابين غير السامة****- الثعابين العمياء**

الثعبان الأرقم: ثعبان ضخم غير سام.

-الثعبان الصخري: ثعبان كبير الحجم غير سام سريع الحركة.

-ثعبان الحقل الأسود: من الأفاعي الغير سامة، وهي مفيدة حيث تقوم بقتل الثعابين الخطرة.

-الثعبان الأنيق: هو ثعبان غير سام صغير الحجم يمكنه العيش في الماء.

وفيما يلي شرح لأهم أنواع الافاعي السامة التي قد يمكن أحيانا ان تسبب ضررا بالغا للانسان.


**1-أفعى الكوبرا**

الكوبرا هي أفعى من مجموعة الثعابين السامة وهي من ذوات الدم البارد والافاعي بكامل أنواعها لا

ترى ولا تسمع ولكنها تتعامل بغريزة الشم والبحث والتحسس.الأفاعي يغطي جسمها الحراشيف التي

تساعدها على الحركة بسهولة و يسر و ذلك لأنها ملساء.الأفاعي ليس لها جفون فلذلك لا يمكنها غلق عيونها ؛ لكن تغطي عيونها طبقة قشرية ، تعمل تلك الطبقة على الحفاظ على العين بمأمن عن الأتربة و الغبار و العوامل المحيطة بالأفاعي ، من الخصائص الهامة التي تتميز بها الأفاعي عن غيرها من الحيوانات أنها تقوم بالإنسالخ عن جلده لكي يتخلص من الحشرات التي تتطفل على جلده. للأفاعي لسان مشقوق يساعدها في حاسة الشم و بذلك تتمكن من تحديد رائحة الفريسة و معرفة مكانها. وأفعى الكوبرا نشيطة جداً، وإذا استثيرت حركت ضلوع رقبتها فتبدو مسطحة. وهذه الحركة تجعلها تبدو وكأن لرأسها غطاء. وفي معظم الثعابين تبدو الرقبة أقصر من ضلوع الظهر البعيدة، لكن الكوبرا تبدو ضلوع رقبتها أكثر طولاً. وهذه الضلوع مستقيمة الشكل تقريباً، وليست منحنية كضلوع الجسم.

وللكوبرا طريقتان في استخدام سمها القاتل. البعض منها ينهش ضحاياه بأنيابه السامة الموجودة في مقدمة الفك العلوي. وبعضها الآخر يقوم بنفث السم في عين ضحيتها (في هذه الأنواع تتخذ الأنياب شكلاً يتيح لها نفث السم للأمام عندما تعود الكوبرا برأسها للوراء) ويتم نفث السم بهذه الطريقة الفعالة عند نوعين من الكوبرا الإفريقية، ونوع آخر في شرق الهند ولا يصيب السم المنفوث الإنسان بالأذى إلا في حالة دخوله العينين إذ يسبب تهيجاً شديداً، وقد يؤدي إلى فقد الإبصار، مالم تُغسل العينان فوراً. وقد يُسبب النهش موت الإنسان خلال ساعات قليلة.



اللسان المشقوق لأفعى الكوبرا المصرية

و يعد حيوان النمس الصغير عدواً خطيراً للكوبرا. فهو سريع جداً، يهاجم الأفعى ويقتلها عادة. حيوان النمس من اذكي الحيوانات الموجودة في العالم وهو من فصيلة العرسيات وكان يستخدم منذ عام 1800 ميلادياً في مكافحة القوارض والفئران والنمس حيوان مستأنس سهل التدريب اعتقد المصريون القدماء ان النمس حيوان مقدس حتى اسموه فأر فرعون وذلك لإبقائه على اعداد التماسيح عند حد معين في نهر النيل، إذ كان يتغذى على بيضها. وهناك أسطورة تقول أن النمس قد يتسلل إلى فم التمساح ويتعدى البلعوم والحنجرة ليمزق أحشاءه ويصل إلى القلب ليمزقه ويأكله. اشتهر النمس ببراعته ومهارته في القضاء على الأفاعي السامة، ويرجع السبب في ذلك إلى سرعته الفائقة ورشاقته، إذ يغرس أسنانه الحادة التي تشبه رؤوس الإبر في عنق الأفعى بعد مراوغات معها ينتصب خلالها شعر الجسم والذيل جميعه ويبدو النمس ضعف حجمه. كما أن الذنب ينتصب ويتحول

إلى فرشاه قاسية يحك بها وجه خصمه حتى ان ناب الأفعى يعجز عن التأثير على هذه الحزمة من الشعر. ويذكر انه ليس لدى النمس حصانة ضد سم الأفاعي، لكنه غالبا لايعطيها الفرصة للدغه، ولديه بعض المقاومة للسم.

#### الوضع التصنيفي للكوبرا المصرية

Kingdom: Animalia

Phylum : Chordata

Class : Reptilia

Order : Squamata

Suborder : Serpentes

Family: Elapidae

Genus : Naja

Species: N. haje

الكوبرا المصرية يَنمو طولها إلى ما بين 1.6 و2.3 متر. أكثر خصائص الكوبرا المصرية تميزاً رأسها الكبير وجسمها الأسطواني وتمتلك عيون واسعة وحدقتان مستديرتان ولونها متغير فقد يكون لون الكوبرا المصرية او الكوبرا السوداء بإحدى درجات اللون البني وذات بقع غامقة او فاتحة وغالبا ما توجد علامة تحت عين الكوبرا المصرية وتسمى هذه العلامة بعلامة مسيل الدموع ، واما الكوبرا المصرية التي تتواجد في شمال غرب افريقيا فتكاد تكون سوداء تماما.

#### \*أماكن التواجد

تعيش الكوبرا المصرية عادة في المناطق الجافة الرطبة والسافانا والمناطق شبه الصحراوية التي لا يُوجد فيها سوى القليل من الماء والغطاء النباتي وكذلك تتواجد في الواحات والمناطق الزراعية والمراعي وبين شقوق الصخور والتلال والأراضي العشبية.

ونادراً ما تعيش في المناطق الصحراوية وتعيش فوق التلال في المناطق الصحراوية حيث يستحيل الحصول على الماء الا عن طريق المطر الحولى ولكن تستعويض عن شرب الماء بحصولها على احتياجاتها منه من خلال افتراس الخفافيش التي تسكن مغارات الجبال الوعر

افعى الكوبرا المصرية او الكوبرا السوداء من اخطر الافاعي السامة في العالم حيث وجد ان لدغة واحدة من الكوبرا تستطيع ان تقتل فيل ضخيم لآخر نفس او قتل 20 انسانا في غضون 3 ساعات

الكوبرا المصرية هي من نوع الافاعي ليلية النشاط بالرغم من انها تميل الى النشاط نهارا اذا كانت واقعة في الاسر وتدخل الكوبرا المصرية ايضا المساكن البشرية لاصطياد الدواجن وتلجأ للهرب اذا حاول الانسان الاقتراب منها ولكن عند احساس افعى الكوبرا المصرية بالخطر وان البشر اقتربوا منها كثيرا فانها تقف وقفها المشهورة ويتفطح الجزء العلوى منها ويرتفع نصفها الامامي وتهاجم العدو  
 يجذب ذكور افعى الكوبرا إلى الإناث ويتزاوجون من خلال الروائح القوية (الفرمونات) فيما بينهم ، وبعد عملية التزاوج ، تبدأ الانثى في تكوين البيض في جسدها ، وتقضي بعض الوقت في العثور علي الموقع الذي يوفر الحرارة المناسبة لاحتضان بيضها ، ومن اهم ما يلزم هذا الموقع هو ان يكون مخفي جيدا عن الحيوانات المفترسة ، وبعد تأمين المكان تقوم بايداع البيض الذي يكون من 20 الي 40 بيضة ، وتظل انثى افعى الكوبرا تراقب بيضها عن كثب حتي يفقس  
 تتغذى افعى الكوبرا المصرية على الطيور و الثدييات الصغيرة و الضفادع و الزواحف الصغيرة و حتى على الثعابين الاخرى

تتواجد افعى الكوبرا المصرية في العديد من حدائق حيوانات العالم وعلى رأسها حديقة الحيوان بالجيزة ثم حديقة حيوان سان دييغو وحديقة حيوان برونكس بنيويورك.  
 سم افعى الكوبرا المصرية يصيب الجهاز العصبي مباشرة ويوقف الاشارات العصبية التي تنتقل الى العضلات وفي مرحلة لاحقة توقف الاشارات التي تنتقل الى القلب والرئتين وتشل الجهاز التنفسي بالكامل مما يؤدي الى موت محقق.

وتسبب لدغة الكوبرا المصرية ألم شديد مكان اللدغة وورم ويصاحب ذلك ظهور اثار اخرى على الشخص المصاب كالصداع والغثيان والتقيؤ والام البطن والاسهال والدوار والتشنجات ومتوسط انتاج لدغة واحدة من افعى الكوبرا المصرية من 175 الى 300 ملج.

### \*العلاج

ويعالج السم ب"مضاد" ، وهو ترياق سم الأفاعي ، يتم إنتاجه من طريق استخراج السم من الأفاعي ثم تخفيفه وحقنه في الأغنام أو الخيول ، بعد ذلك يستخرج من دم الحيوان ليكون مضاداً للسم في الجسم البشري.

### \*سم الكوبرا

في القارة الاميركية يعاني أكثر من مائة مليون شخص من مرض الروماتيزم ويعالج الكثير منهم بواسطة مصل فعال فريد من نوعه اسمه توكسين مستخرج من سموم الافاعي ويسمى "علاج السم النقي" ويستعين الأطباء بجزء من المائة من الملغرام منه ويمزج بمعالج آخر ويحقن به المكان المصاب ان كان الركبة او المفاصل، فيختفي التهاب المفاصل من تأثير استرخاء العضلات كما تقوي مادة انتوكسين

جهاز المناعة. ولمعالجة التهاب المفاصل والروماتيزم يمزج بعض الأطباء في المكسيك والارجنتين سموم أفعى الكوبرا والأفعى الجرسية والأفعى الرملية حيث نجد ان السم المستخرج من أفعى كوبرا الملك مثلا يعتبر من أشد أنواع المسكنات لاحتوائه على ، مادة الاوهانين و هي مادة تتعدى قوتها قوة المورفين بحوالي 20 مرة والجدير بالذكر ان اختصاصيين لحلب سم الافاعي يسمح لهم فقط القيام بهذا العمل لخطورتها، في البداية يمسك براس الافعى من مكان يعرفه الاختصاصي ثم يضغط على انيابها التي تكون في وعاء زجاجي كي يخرج السم، بعدها يوضع ما تم استخراجه في ثلاجة حرارتها ما بين ال 40 وال 60 درجة مئوية وهذا يسمح بوجود بلورات نقية جدا، ثم يوضع لمدة 24 ساعة في جهاز من أجل تجفيفه من كل شوائب مثل من الماء. وللحصول على سموم نقية يجب فصل عناصر ومركبات أخرى، وهي عملية معقدة يقوم بها اختصاصيون أو أطباء صيدلة.

## 2- الحية المقرنة (أفعى الطريشة)



الحية المقرنة

بالرغم من حجمها الصغير بالنسبة لبقية الافاعي الأخرى الا ان افعى الطريشة تعتبر من اخطر انواع الافاعي في سمها حيث ان سم افعى الطريشة يستطع قتل الانسان في ثواني ولا يوجد مصل او علاج لسمها فالعلاج الوحيد لتجنب الموت من لدغتها هو بتر الجزء الملدوغ بشرط ان يكون في دقائق معدوده والا فالموت هو المصير

الحية المقرنة ( الطريشة ) هو ثعبان يعيش في الصحارى المصرية أخطرها النوع الطائر الموجود في مناطق سيناء ومرسي علم وحلايب وشلاتين وهو نوع قصير لا يتجاوز طوله 25 سم في جميع مراحل حياته ولديه قدرة عالية علي ضم جسده مثل السوسنة ثم يقفز فجأة الي عدة أمتار لدرجة أنه يستطيع أن يصيب الجمل وراكبه لذلك يحرص أفراد و جنود حرس الحدود والهجانة في هذه المناطق علي اتخاذ احتياطات كثيرة أثناء سيرهم بالجمال فيرتدون أقنعة علي الوجه ونظارات علي العين وواقيا علي الأرجل للوقاية من قفزات الطريشة القاتلة أما الطريشة الموجودة في صعيد مصر فهي مختلفة ولا تقفز وتتميز

بالحجم الكبير ويصل طولها أحياناً إلى 95 سم ووزنها يتراوح بين 3، 4 كيلو جرامات، وتصيد فريستها عن طريق دفن جسدها بالكامل داخل الرمال ولا يظهر منها سوى العينين فقط وتنام طوال النهار وتبدأ في صيد فرائسها بعد المغرب وطوال الليل وتبتلع الفئران الصغيرة والعصافير والضفادع والبرص وكائنات أخرى.

إلى أي مدى يستطيع من يعملون من مجال صيد الثعابين التعامل مع تلك الحية؟  
الطريشة يمكن وصفها بأنها غدارة ولا يستطيع أي ساحر أو حاو أو ممن ينتمون للطريقة الرفاعية المشهورة بصيد الثعابين من اقتناصها لأن الطريشة تغدر بالقسم الذي يتلوه الحاوي علي الثعبان لكي يخرج من مأمنه ولقد قال الامام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ان ابليس يوم غوى سيدنا ادم واخرجه من الجنة دخل اليه وقتها وهو بين اسنان ثعبان الطريشة وسم هذه الحية مجهول وليس له مصبل محدد للآن.

#### \*سلوك حية الطريشة

تعتبر الأفعى القرناء من الحيات السامة التي يجب تجنب عضتها، وهي لا تهاجم الإنسان وإن قرب منها هربت منه تزحف مثنوية، أي تزحف بإنحاء لذلك تسمى بأُم جنيب، وذلك لأنها تزحف زحفاً جانبياً، وهي قصيرة الطول عريضة الجسم والرأس، قصيرة الذيل، دقيقة الرقبة، وعلى جانبي الرأس العريض توجد غدد السم التي ساهمت في زيادة حجم الرأس. وإذا حوصرت الأفعى إلتفت حول نفسها وحكت حراشفها ببعض لتصدر صوتاً يسمى الكشيش، لتفزع أعدائها. ولا يكشف من الحيات إلا الأفاعي، وإذا أخرجت الصوت من فمها فهو الفحيح.

للأفعى القرناء نابان أماميان متحركان، وتستطيع الأفعى تحريك هذان النابان إلى الأمام خارج الفم وإلى الداخل لتدخلهما في لثتها، وهذان النابان يساعداها على سرعة توصيل السم للفريسة  
قرنا الأفعى جليدين ناعمين مرنين، يمكن بسهولة ثنيهما، ولا يعتبران سلاحاً تستطيع استخدامه، بينما تستطيع به إفزاع أعدائها، وقد يكونان لحماية عينيها الكبيرتين من الصدمات.  
وليس لجميع هذا النوع من الأفاعي قرون، والقرون ليست مرتبطة بعمر الأفعى، فهناك الصغار الحجم بقرون وكذلك هناك الكبار بقرون. ومن المحتمل أن تكون القرون للذكر فقط، وقد لاحظت شخصياً أن ذو القرون يكون أكثر شراسة ودفاعاً عن النفس من الذي ليس به قرون.  
تفضل الأفاعي المناطق الرملية والصخرية التي تساعدها في إيجاد مخبأ لها، وهي بحركات اهتزازية تستطيع دفن نفسها وتبقي عينيها خارج التراب لمراقبة فرائسها. والأفعى القرناء ليلية العيش، تخرج ليلاً للبحث عن فرائسها من الزواحف والقوارض



توجد أنواع كثيرة من الحية المقرنة - الطريشة - في صحراء مصر ومنها النوع الطائر الموجود في مناطق سيناء ومرسي علم وحلايب وشلاتين وهو نوع قصير لا يتجاوز طوله 25 سم في جميع مراحل حياته ولديه قدرة عالية علي ضم جسده مثل السوسنة ثم يقفز فجأة الي عدة أمتار لدرجة أنه يستطيع أن يصيب الجمل وراكبه لذلك يحرص أفراد و جنود حرس الحدود والهجانة في هذه المناطق علي اتخاذ احتياطات كثيرة أثناء سيرهم بالجمال فيرتدون أقنعة علي الوجه ونظارات علي العين وواقيا علي الأرجل للوقاية من قفزات الطريشة القاتلة أما الطريشة الموجودة في صعيد مصر فهي مختلفة ولا تقفز وتتميز بالحجم الكبير ويصل طولها أحياناً الي 95 سم ووزنها يتراوح بين 3، 4 كيلو جرامات، وتصيد فريستها عن طريق دفن جسدها بالكامل داخل الرمال ولا يظهر منها سوي العينين فقط وتنام طوال النهار وتبدأ في صيد فرائسها بعد المغرب وطوال الليل وتبتلع الفئران الصغيرة والعصافير والضفادع والبرص.

#### \*سمات وخصائص الطريشة

سم الطريشة مجهول ويتجدد في الفترة من يوم 17 حتي يوم 25 من كل شهر عربي حيث يخرج السم القديم وتفرغه الحية في أي شيء سواء كان حجراً او شجراً او خلافه حتي يتجدد السم مرة أخرى لذلك تكون كمية السم في منتصف الشهور العربية كبيرة جداً ومن أخطر ما يمكن وتستطيع قتل الإنسان خلال ثلاثين دقيقة فقط. أما المصاب بلدغة الطريشة فلا يشعر بسريان السم داخل جسده علي عكس سم العقرب الذي يسبب إضطرابات شديدة وتهيجا عنيفا بجسم الإنسان عند بداية اللدغ، ويتغير جسم الإنسان الملدوغ بسم الطريشة الي اللون الأسود في بداية الأمر ثم يحدث تورم شديد في الجزء الملدوغ ويلقي الإنسان حتفه إذا لم يتم إنقاذه سريعاً.

#### ● مالاتعرفه عن الحيه المقرنة

- الطريشة" منتشرة في جميع ربوع مصر؛ خصوصاً المحافظات ذات الظهير الصحراوي، و أنها من عائلة الحية السامة التي تعتمد على مهاجمة ضحيتها من خلال عض أقرب جزء منها، مستخدمة أنيابها المتحركة التي تميزها عن عائلة "الكوبرا".
- الأفعى القرناء ليلية العيش، تخرج ليلاً للبحث عن فرائسها من الزواحف والقوارض
- تزحف بإنحاء لذلك تسمى بأُم جنيب
- تتميز الأفعى بوجود قرنين فوق عينيها، ومن هنا سميت بالأفعى المقرنة، وتتمتع بجلد أصفر اللون ليتمكنها من التأقلم مع طبيعة البيئة
- يتراوح طولها بين "30 - 85" سم

- إذا حوصرت الأفعى ألتفت حول نفسها وحكت حراشفها ببعض لتصدر صوتاً يسمى الكشيش، لتفزع من يقترب منها
- للأفعى القرناء نابان أماميان متحركان، وتستطيع الأفعى تحريك هذان النابان إلى الأمام خارج الفم وإلى الداخل لتدخلهما في لثتها، وهذان النابان يساعدها على سرعة توصيل السم للفريسة
- تفضل الأفعى المناطق الرملية والصخرية التي تساعدها في إيجاد مخابئ لها، والصحاري هي بيئتها الطبيعية
- جسم ثعبان الطريشة عريض وذيله قصير ورأس عريض، وتتواجد غدد السم فوق جانبي رأس الثعبان ولذلك يبدو رأس الثعبان أكثر عرضاً.
- لدى ثعبان الطريشة قدرة عالية على ضم جسده مثل السوسنة، يتمكن من القفز السريع حيث يمكنه القفز لعدة أمتار بالثانية الواحدة، لذا يرتدي بعض الأعراب بالصحاري قفازات وغطاء للوجه لتفادي قفزات الطريشة وبخ سمها القاتل في الفريسة أحياناً يمكنها أن تصيد فريستها عن طريق دفن جسدها بالكامل داخل الرمال ولا يظهر منها سوى العينين لتتمكن من اصطياد فريستها.
- سم الطريشة مجهول ويتجدد في الفترة من يوم 17 حتى يوم 25 من كل شهر عربي حيث يخرج السم القديم وتفرغه الحية في أي شيء سواء كان حجراً أو شجراً أو غيره، حتى يتجدد السم مرة أخرى ويكون سمها خطير جداً، وتستطيع قتل الإنسان خلال ثلاثين دقيقة فقط.
- المصاب بلدغة الطريشة لا يشعر بسرمان السم داخل جسده، ويتغير لون جسم الإنسان الملدوغ بسم الطريشة إلى اللون الأسود في بداية الأمر ثم يحدث تورم شديد في الجزء الملدوغ ويلقي الإنسان حتفه إذا لم يتم إنقاذه في خلال دقائق من اللدغة.
- خطورة "الطريشة" تتمثل في أن سمها يحتوي على مادة حارقة تشبه "مياه نار" تقتل الأنسجة الملامسة لمكان العضة، وينتشر خلال ساعتين في الجسم كله من مكان العضة، ما يتطلب قطع الجزء المصاب للحفاظ على حياة الضحية من الوفاة.
- تراكم تركيز سم الأفعى داخل جسم الفريسة
- تأثير عضتها أكثر من 5 آلاف عضه كلب
- يجب تطهير مكان العضة بالماء والصابون البيتادين، وإعطاء المصاب مضاداً حيويًا لمنع حدوث تلوث بكتيري أو جرثومي ومصل التيتانوس.
- الذهاب إلى أقرب مركز سموم وعدم تحريك الجزء المصاب، ثم نقل المصاب لأقرب مركز علاج سموم لأخذ المصل المضاد لعضات الثعابين، والتي تتحدد حسب حالة المريض.

- لدغتها = ١٠٠ لدغة عقرب
- تضاعف وتزايد السم داخل جسم الضحية و يحتوي سمها على مادة حارقة تشبه "مياه نار" تقتل الأنسجة الملامسة لمكان العضة، وينتشر في اقل من ساعتين في الجسم كله من مكان العضة. يتطلب احيانا قطع الجزء المصاب للحفاظ على حياة الضحية من الوفاة
- . قضي على الإنسان في 30 دقيقة.

سم الأفاعي مخزن في غدد موجودة خلف العين وينتقل عبر قناة إلى الأنياب بفعل انقباض العضلات حولها وهو لزج القوام ذو لون أبيض مائل الى الصفار في بعضها ويتكون أساسا من 90% من البروتينات ويوجد نوعان من السموم

#### 1- سموم عصبية

تهاجم الجهاز العصبي ما يؤدي إلى شلل العضلات وصعوبة التنفس وفشل في عضلة القلب كسموم ( الكوبرا- الممبا- ثعبان المرجان).

#### 2- سموم دموية

تؤثر في الدم وتسبب خللاً في الأوعية الدموية وتحطم كريات الدم الحمراء وتنخر العضلات (الأفاعي ذات الأجراس).

وقد وجد العلماء أن هناك بعض الانزيمات المستخلصة من سم الثعابين لها بعض الفوائد الطبية من حيث علاج بعض الأمراض المستعصية.

لايوجد طريقة دقيقة وسهلة لمعرفة الافاعي السامة من غير السامة وللتعرف على الافاعي يجب مراقبتها والقبض عليها حتى تتأكد من كونها سامة او غير سامة

#### \*علاج لدغه الطريشة

يحرص البدو ورواد الصحراء وخصوصا في سيناء والصحراء الشرقية على تغطيه أجسامهم جيدا فيرتدون أقنعه على الوجه ونظارات للعين وواقيا للأرجل للوقاية من لدغات الطريشة القاتلة حيث أنها تستطيع القفز لعدة أمتار والإصابة وسمها قاتل ولا مصل لها وتستطيع قتل انسان قوى في 30 دقيقه سمها سريع الانتشار في الجسم دون احساس المصاب بذلك على عكس سم العقرب الذي يسبب اضطرابات وتهيجات ولدغتها لا تعض وتمص على عكس الاسعافات الأولية لباقي الثعابين لأنه زعاف فيسبب اصابه الشخص المسعف بالسم ولم يكن له علاج غير بتر الجزء المصاب لإيقاف سرعه الانتشار وذلك بعد مكان اللدغة بعده سنتيمترات يتم البتر ويحمل البدو سيوفا وخناجر شديده لبتر الجزء الملدوغ لانقاذ المصاب وكى الجرح بعد ذلك لإيقاف النزيف أى ان اللدغ في مناطق الجسم ليس له أي علاج الا ان البدو من سنوات قليلة اكتشفوا علاج جديد وهو الكى بالنار هو تسخين سكين لدرجه الاحمرار في

نار حاميه او باستخدام مشعل الاسرع فيهم لان العلاج يجب ان يتم في خلال دقائق بسيطة بعد الإصابة وهذا العلاج طبعا افضل من البتر حتى يشفى المصاب وينجو من الموت وان كان يشعر بعد ذلك سنويا في نفس ميعاد اللدغة ببعض الاعراض حيث يصبح الجزء الذى اصيب فيه اكثر سواد ويتورم قليلا ولكن سرعان ما يعود الى طبيعته بعد 3 او 4 ايام - يتغير جسم الانسان الملدوغ الى اللون الاسود في بدايه الامر ثم يحدث تورم شديد في الجزء الملدوغ ويلقى المصاب حتفه اذا لم يتم علاجه كما ذكرنا سريعا. لكن لا بد من اخذ الاحتياطات اللازمة عند حدوث عملية اللدغ: لا تأكل أو تشرب أي شئ قبل الحصول على المشورة المتخصصة، لا تحاول القيام بأية أنشطة تتطلب القوة الجسدية، لا تتناول الكحوليات أو أية عقاقير أخرى، لا تضع الوقت أو تتحمل مخاطر قتل الحيوان أو الحشرة التي سببت الإصابة إلا للضرورة القصوى، لا تستخدم أي نوع من الصدمات الكهربائية مهما كان نوعها علي مكان اللدغة، لا تقم بإزالة الرباط الضاغط قبل تلقي العناية الطبية حتى لا ينتشر السم بباقي أعضاء الجسم، لا تحاول استخدام حزام أو رابطة عنق، تختلف الجرعة السامة من ثعبان لآخر، ولكن اكثر من 70% من اللدغات تكون لثعابين غير سامة وأكثر من 50% من السامة تكون جافة ولا يوجد بها المادة السامة. يجب توخي الحذر في المقام الأول عند التعرض لمثل هذه المواقف ولكن إذا تعرضت له أو تعرض شخص تعرفه لا بد أن تكون علي دراية بالخطوات السابقة، لتقلل من مخاطر السم حتى تصل الرعاية الطبية المتخصصة.

### \*الاجراءات الوقائية أثناء المرور في مناطق يتواجد فيها الافاعي\*



- 1 - أمش بحذر وانظر جيدا لمكان قدميك و طأ الاخشاب بدلا من تخطيها ودائما احذر جلبة وضجيجا قويا كي تحسبها الافاعي فتهرب قبل وصولك
- 2 - انتبه اثناء التقاط الفاكهة والاشياء والتحرك حول الماء
- 3 - لاتمازح او تؤذ او تتحرش بافعى وبما ان الافاعي لاتستطيع اغلاق أعينها فلا يمكن ان تعرف ان كانت نائمة أو مستيقظة وبعض أنواع الافاعي مثل ( الممبا الأفريقية السامة ) وسيدة الأدغال ) أفعى أمريكية سامه ) والكوبرا تهاجم بشدة اذا تم الاحاطة بها أو اذا كانت بالقرب من بيضها وبعضها يستطيع نفث السم من بعد وإذا أصاب العين عميت وغالبا هي توجه وتصيب هدفها

- 4 - لا تمشي في البراري بدون عصي وأستخدمها لازاحة الاخشاب والصخور
- 5 - البس حذاء بلاستيكي او أي نوع فقط يجب ان يكون سميكاً قويا بحيث لا تتمكن الأفعى من إختراقه بنابها خاصة اثناء الليل فالأفعى في الليل ترى بالأشعة تحت الحمراء وتميز أي جسم حراري بدقة عالية حيث انك لا تستطيع الرؤية
- 6 - افحص الملابس واماكن النوم والمأوى قبل النوم جيداً ولا تلبس أبدا حذاء كنت خلعتة قبل التأكد من خلوه من أفعى أو عقرب أو عنكبوت والعناكب أخطر من الأفاعي وهي كلها سامة تتمايز فقط بدرجة السمية ومنها من لا يمكن النجاة من عضته ابدا فالفترة بين العضة والوفاة قصيرة جدا لا تسمح بالإسعاف ولو كنت جوار المستشفى
- 7 - حافظ على الهدوء اذا واجهت افعى فجأة وقف جامدا فهي ضعيفة النظر ولا تلاحظ إلا المتحرك
- "الافاعي لا تسمع بأذان بل بترددات مشيك على الأرض وأحيانا قد تفاجيء وهي نائمة وتهرب غالبا إذا تسنى لها ذلك وإلا فستهاجم وتدافع عن نفسها وهو حق لها"
- 8 - كن حذرا جدا اذا اضطررت لقتل أفعى ولا تعتمد على موتها الظاهر فسمها باق لمئة عام قادر على الفتك
- ولتخطي هذه القدرة عليك هرس رأسها ليختلط سمها بدمها فيفسد الإثنان
- 9 - يفضل عدم قتل الأفاعي أوالحيات إلا دفاعا عن النفس فهي مفيدة جدا للأرض الزراعية ومن فوائدها:
- القضاء على الجرذان والخلد والحيات الاخرى فالأفاعي تتغذى ببعضها وغالبا غير السامة تبتلع السامة كونها أسرع وأرشق وأطول منها

#### الاجراءات التي يجب اتخاذها عند اللدغ بالثعبان السام



ملاحظة العلامات الحيوية للمصاب كالنبض ، ضغط الدم ،درجة الحرارة ، الحالة العصبية ، و ضعيفة التنفس .

- 1 - الهدوء التام وعدم الخوف الشديد كما ذكرنا .

يجب ان يبق هادئاً ولا يحرك الجزء الملدوغ كيلا يزداد انتشار السم داخل الجسم ومن لدغ في قدمه فلا يجوز أن يمشي و لا خطوة واحدة ويجب حمله على حمالة . وان كان بمفرده فلاحول ولا قوة الا بالله وعليه ان يفعل مايراه مناسباً

2- ربط العضو المصاب من فوق باتجاه القلب و لا يشد الرباط كثيرا و فكه لفترة قصيرة كل نصف ساعة

..

3- اجرح بسكين نظيفة و معقمة بالنار مكان كل ناب من الأنياب الظاهر أثرها كل جرح بطول 1سم و عمق نصف سم .

إن كان مضى على لدغة الأفعى أكثر من نصف ساعة فلا تجرح مكان اللدغة لإنعدام جدواه

4- اغسل الجرح بماء و صابون أو هيدروجين بيروكاسيد ( أو ماء الأوكسجين ) او بالبيتادين (Betadine). أما بخصوص البنزين فلا انصح به أبداً وذلك لأنه يحتوي على مواد كيميائية مضره بالدم .

كما ويمكن مص الدم وبصقه إن كان الفم خاليا من الجروح .

5- الضغط على العضو المصاب من أسفل وأعلى مكان العضة والاتجاه بهما الى مكان الشق وذلك لعصر السم للخارج.

6- وضع ثلج ان وجد مكان اللدغة وذلك لتعطيل سريان السم في الدم .

7- إذا كان مكان اللدغة في اليد أو أصابعها، أو الرجل وأصابعها، يلف الذراع أو القدم بسرعة برباط

ضاغط بعيداً عن المفاصل لأنها ستعمل علي تحريك الرباط من مكانه، وعليك إحكام الرباط جيداً مع الإحساس بوجود النبض وإذا لم يكن هناك إحساس به عليك بتخفيف إحكام الرباط. يربط أعلي مكان اللدغة مباشرة وأسفلها برباط ضاغط حتى لا ينتشر الدم الملوث بالسم إلي باقي أجزاء الجسم.

لا يوصي بتحريك الأطراف التي توجد بها اللدغة، وإن استطعت استخدام جبيرة لها.

يجب أن تكون الأطراف (التي بها السم) علي نفس مستوي القلب أو في وضع الجاذبية الطبيعي، مع عدم رفعها أو خفضها حتى لا تسمح بتخلل السم لباقي أعضاء الجسم.

8- أصعب اللدغات تلك التي توجد في الوجه أو الجذع أو الأرداف، لكن يمكن التعامل معها أيضاً ولكن

بشكل محدود يتم تنظيف مكان اللدغة بالبيتادين أو غيره، يخلق الشعر مكان اللدغة، لا يمكنك

استخدام رباط ضاغط في هذه الأماكن ويمكن الاستعانة بدلاً من ذلك باستخدام شاش ضاغط علي مكان اللدغة ومن حولها لإخراج الدم الملوث بالسم وتستخدم هذه الخطوة في الأماكن الأخرى من الجسم مع باقي الخطوات.

9- إن ظهرت دلائل الالتهابات فاستعمل البنسلين .

10- نقل المصاب إلى اقرب مستشفى (ويفضل اصطحاب الأفعى للمستشفى وذلك لمعرفة المصل المناسب

بأسرع وقت).

لا يعتمد العلاج الطبي على إعطاء المصل المضاد للملدوغ فحسب بل هو عملية معقدة تحتاج للكثير من الإجراءات التي من أهمها ضرورة معرفة نوع الثعبان لإعطاء المصل المناسب لسميته وكذلك الإسعافات الأولية وصحتها وحالة الشخص المصاب كسنه وقوته ومكان اللدغة ومدى تفرس الطبيب المعالج في هذا المجال وعلاج الأضرار الجانبية للملدوغ كعلاج الصدمة العصبية وعملية نقل الدم والصفائح الدموية وغير ذلك من أمور تتبع الإجراءات العادية التي تعرف بلغة الطب بـ ABC

أهم خطوة في المستشفى هي استخدام مضادات للسم علي وجه السرعة ولا يتم تأجيل ذلك، وقد يتطلب الأمر تناول كمية من هذه المضادات تعادل حوالي 20 زجاجة لإبطال مفعول السم بالجسم وقد يحتاج الأطفال إلي كميات أكثر من ذلك لأن الطفل يتأثر بالسم أكثر من الشخص الكبير. يعتمد التشخيص أساساً على التحديد السليم لنوع الثعبان ، حيث لا يوجد اختبار خاص للتشخيص ، مع إجراء فحوصات مساعدة كصورة كاملة للدم - سرعة تجلط الدم - تحليل بول .

اعراض الاصابة

- حينما يتعرض الإنسان الى عضه ثعبان فيجب أن يتأكد أن الثعبان الذي عضه سام او غير سام وذلك من خلال ظهور أي الأعراض التالية:

هناك اعراض موضعية تحدث عادة في مكان اللدغة ، وهي عبارة عن التهابات و تهتكات تحدث فيمكان اللدغة ( احمرار و تورم و نزيف تحت الجلد) .

واعراض تحدث في اماكن بعيدة عن اللدغة

كغثيان و قيء ، ضعف عام ، مع الانقباض المفاجئ و السريع لبعض العضلات، و خمول و ازدواجية في الرؤية Diplopia ، و هبوط في ضغط الدم مع توقف مفاجئ للقلب .

تغير لون الجلد الى اللون الأزرق المحمر خلال نصف الساعة الأولى .

مبدئيا يمكن التمييز من آثار العضات فالثعبان غير السام عضته تكون سطحية بصف او صفيين من الأسنان

اما لدغة الافعي هو الضرر الذي يؤدي الي كثير من الأحيان للجروح و قد تؤدي أحيانا في التأثير بسمها. على الرغم من أن الغالبية العظمى من أنواع الثعابين غير السامة تقتل عادة فرائسها مع انقباضها بدلا من السم، وجد أن الثعابين السامة يمكن أن توجد في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية. الثعابين في كثير من الأحيان تنكز فرائسها كوسيلة من وسائل الصيد، ولكن أيضا لأغراض دفاعية ضد الحيوانات المفترسة.

من الأعراض الشائعة للدغات الأفاعي هي الخوف الشديد والذعر و الغثيان والقيء والإسهال والدوار، والاعماء، وعدم انتظام دقات القلب، والبرد، والبشرة الطرية.

لدغات الأفاعي الجافة، وتلك التي ترتكبها - الأنواع غير السامة، لا تزال يمكن أن تسبب إصابة شديدة للضحية. للأسباب الآتية : لدغات أنياب الافعى قادرة على إلحاق الجروح العميقة، واللدغة قد تسبب الحساسية المفرطة في بعض الناس، وواللعاب على أنياب الثعبان قد تكون مأوى للعديد من الملوثات الجرثومية الخطرة قد تنتشر العدوى ويحتمل أن تقتل الضحية.

معظم لدغات الأفاعي، سواء من قبل ثعبان سام أم لا، سوف تكون نوع من تأثير اللدغات المحلية. هناك ألم واحمرار طفيف في أكثر من 90٪ من الحالات، على الرغم من أن هذا يختلف تبعاً للموقع. العضات من الأفاعي وبعض الكوبرا قد تكون مؤلمة للغاية، قد تسبب أحياناً تورم شديد في غضون 5 دقائق و قد تسبب نزيف ومن الأعراض الشائعة الأولية للدغات هي الخمول والضعف والغثيان، والتقيؤ. و تعتبر أكثر الأعراض التي تهدد الحياة على مر الزمن في انخفاض ضغط الدم، تسريع النفس، عدم انتظام دقات القلب الحادة وفشل الجهاز التنفسي.

### مكافحة الثعابين داخل المنشآت الغذائية

في البداية فحص جميع الاماكن لتحديد اماكن الاختبار والحجور ثم بعد ذلك يمكن استخدام العديد من الطرق التي تتمثل في لوقاية من الثعابين أمر هام فقد قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج ، والوقاية سهلة لو حرصنا على:

#### 1- الطريقة البيولوجية

يتم التخلص من مصادر غذاء للثعابين و التي تتمثل في الفئران و الحشرات و الصفادع و كل ما يمكن أن يستخدم كغذاء له مما يدفع الثعابين للرحيل بحثاً عن الطعام في مكان آخر

#### 2- الطريقة الزراعية

- التخلص من كل الاماكن التي يمكن أن تستخدم كمخبأ للثعابين كالثقوب و الحفر و ماشاءها
- التخلص من كافة الاشياء القديمة كأكوام الخشب، والأسمدة، و الأحجار و التي توفر للثعابين مكان يسهل الإختباء تحتها و التخفي بها .
- التخلص من اي اعشاب طويلة او كثيفة و لسنا بحاجة اليها حتى لا توفر مخبأ او وكر للثعابين .

#### 3- الطريقة الميكانيكية

- القيام بعملية فحص للتعرف على اي فتحات او منافذ توجد بالمبنى او المنزل و العمل على سدها .



- سد الفتحات التي يمكن ان تدخل منها للابنية
- اغلاق وسد مواسير الماء و المجاري و فتحات الشبائيك التي يمكن ان توجد حولها .
- تجهيز المصايد على تكون مجهزة بشكل عالي الجودة و لها القدرة على الإمساك بالثعابين حيث يتم وضع طعم للثعابين في فخاخ على شكل صناديق بلاستيكية لها أبواب مُصممة خصيصاً لتسمح للثعبان بالدخول وحجزه في الداخل وعدم تمكينه من الخروج، وعند الإمساك بالثعبان يمكن نقله إلى الغابة أو أي مكان آمن آخر
- اي استخدام مصائد تحتوي على لاصق ذو قدرة عالية على المسك ويكون قريب من مصائد الفئران

#### 4- الطريقة الكيميائية

- استخدام النبات الطارده حول المنشأ عن طريق سد الفتحات في قطع سد الفتحات وتوزيعها في اماكن حول المنشأ

استخدام بعض المركبات و المواد الطبيعية و التي لا تمثل اي ضرر على الصحة و منها الزيوت الطيارة (مثل الشيح) و التي لا تدخل ضمن تصنيف المواد السامة و بذلك تكون صديقة للبيئة و في نفس الوقت تمتلك القدرة على طرد الثعابين.

- استخدام المركبات التي تتمتع ببعض المواصفات او الخصائص السمية بكميات قليلة و تكون مخلوطة بالزيوت التي تصنف كصديقة للبيئة مما يسمح بإيجاد مواد طاردة للثعابين .

#### • استخدام مبيدات التعفير حول المنشأ من الخارج

- كربونات الكالسيوم (الجير) قاتل للثعابين و هناك واحدة من الطرق الدراجة لإستخدام تلك المواد حيث يتم تعبئة أمعاء الغنم ب كربونات الكالسيوم ثم القيام بتقطيعها و رميها في الاماكن التي يمكن أن تتواجد بها الثعابين حيث تقوم رائحة الأمعاء بإجتذاب الثعابين لتأكله فيقوم الشيد بالقضاء عليها .
- بيض الطيور حيث يعتبر البيض من الأشياء التي يتغذى عليها الثعبان ، نأتي بالبيض ثم نقوم بحقنه بالسم او اي مبيد حشري ثم نضع البيض في الاماكن التي تتواجد بها الثعابين و عندما تقوم بتناولها تقضي عليها .
- يمكن ان نقوم برش الشقوق او الحفر التي تتواجد بها الثعابين بالغاز السام و هنا تستخدم الغازات الثقيلة و منها غاز البروميد او سيانيد الهيدروجين .

- يمكن عمل طعوم سامة ووضعتها قريبة اماكن تواجد الثعابين
- الحشرات تتجمع في الليل حول الضوء و الحشرات غذاء للثعابين لذا يمكن عمل مصايد او كمائن لإصطياد الثعابين عن طريق الضوء .

- يتم جمع الثعابين وحرقها ثم دفنها بالطريقة الصحيحة.
- تسجيل التوصيات وتسليمها الى الجهة المسئولة لانخاذ اللازم.

### ثانيا:البرص (الوزغ)



البرص المنزلي، الأبرص ، أم بريص ،الوزغ ،الضاطور ،البريعصي (باللاتينية Hemidactylus : بالإنجليزية House geckos ، ينتمي إلى فصيلة (Gekkonidae) : هو نوع من الحيوانات الزاحفة الصغيرة التي تنتمي لرتبة الحرشفيات ويعرف باسم الوزغة وأبوبريص والبرص ويوجد منه أنواع مختلفة ينتشر في المناطق الدافئة، هو يوجد في معظم قارات العالم ويتمتع بجلد رقيق ومرقط تختلف ألوانه بين الاحمر والأخضر والبني الفاتح والداكن، يقوم البرص بإصطياد حشرات البعوض والذباب واطوار مختلفة من الحشرات.

ينشط البرص ليلا ،ويصدر أحيانا، زقزقة للاتصال بواسطتها بالأبرص الأخرى ، لا يوجد للبرص جفن ،عدا عن غشاء رقيق، يغطي العين ويقوم بلعقه باللسان لتنظيفه ،وثمة أنواع منها تقوم بفصل ذيلها عن بدنها حين الاحساس بالخطر في عملية تسمى بالانشطار الذاتي، فيبقى الذيل يتلوى، فينتبه إليه المطارد ويلتقي به بينما يهرب البرص كما أن البرص لديه القدرة على تعويض ذيله أو أحد أطرافه، لذلك يجب على الإنسان أن يقوم بقطع رأس البرص عند قتله، حتى يتأكد تماما من التخلص منه، حيث أنه حيوان مقزز يتسبب في اشمزاز أفراد المنزل.، كذلك بعضها تستطيع رش سائل كاوي من طرف ذيلها، وبعض الأنواع تستطيع التسلق، على الأجسام المصقولة، وذلك بفضل وسائد لاصقة، تتواجد على كفوف ارجلها، وهذه الخاصية لفتت لها أنظار العلماء والباحثين ،وهي تتواجد في برص المنازل.

يتواجد البرص في الأماكن الحارة، ينتشر في الصحاري، الحدائق العامة، والبيوت خاصة في فصل الصيف، يوجد أنواع كثيرة من الأبراص، والتي تصل إلى 700 نوع مختلف، وهناك أقاويل أنه البرص ينتشر حول العالم بحوالي 1400 نوع، يختلف البرص في شكله وحجمه، حيث يوجد منه ألوان، مثل الأخضر، الأحمر المنقط، البني، الرمادي، وغيرها، وهو صغير الحجم إلا أن هناك أنواع كبيرة الحجم يصل طولها إلى 14 و 15 سنتيمتر.

- و هي تحب سكن البيوت أو المنشآت والتواجد فيها، إلا أنّ تواجدها في المنزل قد يجعل سكانه عرضة للإصابة بالأمراض بسبب الجراثيم والميكروبات التي تحملها معها، كما قد يصبح البيت وكرماً لها بسبب وضعها لبيض في أماكن مخفية يصعب رؤيتها والتكاثر داخل البيت، فمن المهم القضاء على الابرص فور رؤيتها، وعدم إهمال ذلك
- بعد الفحص الميكروسكوبي الدقيق وجد العلماء ان في كل إصبع من اصابع اقدام الوزغ حوالي ٢ مليون شعيرة ميكرومتريّة الحجم وتنتهي كل شعيرة من هذه الشعيرات بمئات من الشعيرات النانوية الدقيقة جداً في حدود ١٠٠-٢٠٠ نانومتر. هذه الشعيرات النانوية صغيرة جداً لدرجة انها قادرة على الأتصال مع التركيب الجزيئي للأسطح التي يمشي عليها الوزغ، فتلتصق هذه الشعيرات النانوية ذات المساحة السطحية الكبيرة بشكل مثالي مع الأسطح بقوة ربط تدعى قوة فان دير فالس حيث هناك شحنات موجبة وسالبة بين الشعيرات وجزيئات السطح تجذب بعضها البعض فتبقي الوزغ ثابتاً بالجدران والاسطح.
- وفي كثير من الاحيان يسبب البرص اضرارا بالغة داخل المنازل والمنشآت الغذائية مثل:
- يتسبب في ايداء نفسي للإنسان بسبب شكله المقرز
  - يتسبب البرص في إفساد الطعام أو الأواني في حالة سقوطه فيها.
  - يتسبب البرص في صوت مزعج.
  - تسبب أحياناً في إشعال النيران في المنازل التي تستخدم الغاز للإضاءة، وعن جابر بن عبد الله، قال: "قال الرسول ﷺ: أطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت."
  - يتسبب في رائحة كريهة بسبب بيضه الكريه
  - يتسبب البرص في بعض الأمراض المعوية، حيث أنه ينقل الطفيليات والبكتيريا.
  - يسبب البرص العديد من الأمراض إذا مر على أحد أنواع الطعام، خاصة الملح.
  - يسبب في إفساد الأواني والطعام حال سقوطه او مروره عليه
  - يسبب البرص تلوث المفروشات مما يسهل معه انتقال الأمراض المعدية والبكتيريا.
  - بينت الدراسات العلمية الحديثة الضرر الذي يلحقه الوزغ بالإنسان، فهو ناقل لكثير من أنواع البكتريا والطفيليات، منها:
- 1- بكتيريا السالمونيلا (Salmonella)
- تنتقل بكتريا السالمونيلا للإنسان عن طريق براز الوزغ، ويظهر المرض على شكل أعراض النزلة المعوية الحادة، والحمى التيفودية الحادة.
- فيعاني المصاب من صداع شديد، يترافق معه آلام بطنية، وإسهال حاد يؤدي إلى الجفاف، بالإضافة إلى الدوار والغثيان والقي، وفقدان الشهية وحمى شديدة تنذر بوجود التهاب، ويتحول الالتهاب في مرحلة لاحقة إلى تسمم الدم والأنسجة؛ مما يؤدي إلى الموت.

وهناك دراسة أمريكية تبين أن عدد الأشخاص المصابين بالسالمونيلا من الأوزاغ والزواحف الأخرى في أمريكا يصل إلى 70 ألف شخص كل عام.

### 2- طفيل الكريبتوسبورديوم (Cryptosporidium)

ينتقل هذا الطفيل إلى الإنسان من خلال براز وقيء الوزغ الحامل للبيض المتحوصل (Oocyst)، وتظهر العدوى على شكل التهاب حاد بالمعدة والأمعاء، وقد يؤدي عند الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة كالأطفال وكبار السن إلى الموت.

وقد أجريت دراسة قامت بها الرابطة الأمريكية للأطباء البيطريين على أربعين وزغة من أوزاغ المنزل بينت أن 37 وزغة منهم مصابة بالطفيل.

### 3- طفيل البنتاستوميد (Pentastomid)

تعرف باسم الديدان اللسانية، وتنتقل عن طريق الأوزاغ أيضًا، وتسبب للإنسان الأمراض التنفسية.

### 4- الديدان الدبوسية (Enterobias vermicularis)

تنتقل عن طريق الوزغ، وتسبب التهاب أمعاء، وحكة حول منطقة الشرج.

- إذا تناول الشخص طعام فيه سم البرص، قد يؤدي ذلك إلى وفاته.

## الادارة المتكاملة لمكافحة البرص (الوزغ)

### أولا: الطرق الوقائية

- سد فتحات النوافذ لتجنب دخول البرص إلى المنزل
- تركيب سلك علي جميع النوافذ
- عدم ترك النوافذ أو الشبابيك مفتوحة ليلا
- عدم ترك الاطعمة مكشوفة والتخلص الدائم والمستمر من الفضلات
- الاهتمام البالغ بنظافة المنزل والتخلص باستمرار من القمامة

### ثانيا: استخدام المواد الطاردة

- الطرد المباشر والسماح له بالرحيل
- دهن نوافذ المنزل بزيت السيارات المحروق
- استخدام الشيح، حيث يمكن وضع كمية مناسبة من الشيح في قطعة من القماش ووضعها على النوافذ، لطرده البرص.
- يمكن استخدام شرائح البصل او رائحة الثوم بالمنزل لطرده البرص

- رش الزعفران في أركان المنزل، حيث أن البرص ينفر من رائحة الزعفران.
  - تبخير المنزل باللبان، ويجب غلق النوافذ جيداً، حيث أن البرص يكره رائحة اللبان ويمهرب أو يموت في الحال.
  - تبخير المنزل بالمستكة، حيث أن البرص يكره رائحة المستكة، ويمهرب أو يموت عند استنشاقها
  - استخدام الفلفل الحار المطحون في تبخير المنازل، حيث أن رائحة الفلفل الحار تعمل على طرد البرص من المنزل
  - تجهيز محلول النشا و رشه على البرص فور تواجده في المنزل، حيث أن النشا يعمل على ثقل حركة البرص، وبالتالي يسهل طرده.
  - توزيع قشر البيض في أركان المنزل، حيث أن البرص يخاف من قشر البيض، ويعتقد أنه حيات و ثعابين، والثعبان هو العدو اللدود للبرص.
  - استخدام العطور والروائح النفاذة ذات الرائحة القوية، حيث أثبتت الدراسات أن الروائح النفاذة تطرد البرص من المنزل، حيث أنه يصاب بالاختناق وصعوبة التنفس عند استنشاقها.
  - الحرص علي استخدام المنظفات والمطهرات المنزلية مثل الفينيك والنفثالين وغيرها
- ثالثاً: المكافحة الميكانيكية**
- القتل باليد
  - وضع لاصق الفئران على قطع من الكارتون، وتوزيعه في مختلف أركان البيت، حتى يلتصق بها البرص عند المرور بها.

### المكافحة الكيميائية

- رش المبيد الحشري ذات الفاعلية العالية والامنة علي البيئة في الأماكن التي يعتقد تواجد البرص أو الوزغ بها.
- عمل طعوم من الدقيق او غير ذلك و خلطها بالمبيدات مثيل مبيد اللانيت مثلاً مع اضافة بعض المواد الجاذبة مثل السكر او العسل الاسود او الفانيليا او غيرها وتصنيعها في صورة كور توضع او تلتص علي الحوائط بالقرب من مسار سير الابرص و تغير باستمرار حال جفافها.
- وردت أحاديث نبويّة شريفة عن الرسول الكريم محمد ﷺ يوصي فيها بقتل هذا النوع من الزواحف، وإنّ من يفعل ذلك سيكسب أجراً عظيماً وخاصّةً إذا قتله من المرّة الأولى، والسبب في ذلك أنّ الوزغ كان ينفخ على النار التي كانت تريد حرق سيّدنا إبراهيم عليه السلام كي تشتعل، وبذلك يتبيّن لنا أنّ هذا النوع من الزواحف يؤذي الإنسان.

## المراجع

### أولاً: المراجع العربية

- الديب، حسن (1990) الفئران و طرق مقاومتها. وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى. مصر، 125.
- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان (2019) مذكرة علم الحيوان الزراعي- قسم وقاية النبات- كلية الزراعة- جامعة سوهاج
- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان (2020) تقسيم افات حيوانية - قسم وقاية النبات- كلية الزراعة- جامعة سوهاج
- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان (2020) آفات حيوانية زراعية - قسم وقاية النبات- كلية الزراعة- جامعة سوهاج
- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان & بغدادى، سعودي عبدالوهاب (2019) القوارض (تصنيفها – صفاتها المورفولوجيا-سلوكياتها-مكافحتها) بمجلة الشبكة العراقية لنخيل التمر <https://www.iraqi-datepalms.net>
- دشيش، محمد عبدالفتاح طه (2001) القوارض حياة وسلوك، مبيدات ومكافحة وتأثيراتها علي البيئة. منشأة المعارف بالسكندرية، 238 صفحة.
- شهاب، عدوان (1996) حصر وتصنيف القوارض في ريف دمشق، ودراسة بيولوجيا فأر الحقل الاجتماعي *Microtus socilalis* ومكافحته كيميائياً ، رسالة ماجستير في وقاية النبات كلية الزراعة – جامعة دمشق.
- عبد الحميد، زيدان هندی (2007): المرشد في مكافحة آفات المنازل والصحة العامة. الطبعة الثانية، كانزا جروب. 656 صفحة

✚ لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وزارة الزراعة، جمهورية مصر العربية (2017) التوصيات

المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية.

✚ مكافحة الفئران في مصر- صادر عن الادارة العامة لمكافحة القوارض- مشروع مكافحة فأر

الحقل- القاهرة مايو 1994

ثانيا: المراجع الاجنبية

- ✚ Buckle, A.P 1994. Rodent Control Methods, Chemical, pp 127-160 [In:] Rodent pests and their control A.P. Buckle and R.H.Smith (Editors). Cab international, Cambridge. 405 pp.
- ✚ Desoky A. S. S. 2015. Management Strategies for Rodents within Different Ecosystems. PP. 87-167. In : NATURAL ECOSYSTEM AND CLIMATE CHANGE, Bharti, P.K. and K. Gajananda (eds.) Discovery Publishing House Pub., Pvt.Ltd.,New Delhi.(India).
- ✚ Desoky A. S. S. 2016. Rodents Of Economic Importance, ./ CHAPTER/ Free-Ebooks.net
- ✚ Desoky A. S. S. 2016. Studies on Certain Ectoparasites Associated with Some Farm Animals and their Control, Discovery THESIS The International journal, Discovery, 2016, 52(249), 1727-1932  
[http://discoveryjournals.com/discovery/current\\_issue/v52/n249/A6.pdf](http://discoveryjournals.com/discovery/current_issue/v52/n249/A6.pdf)
- ✚ [www. Google.com](http://www.Google.com)
- ✚ <https://kenanaonline.com>
- ✚ [www.thaqfya.com](http://www.thaqfya.com)
- ✚ [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
- ✚ [www.webteb.com](http://www.webteb.com)

تنويه: تم الاستعانة ببعض الصور التوضيحية عبر شبكة الإنترنت

## "وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

### صدق الله العظيم

الحمد لله له الشكر وله الحمد وله السناء الحسن، لقد وفقنا الله إلى هذا الموضوع، وإنني قد عرضت رأيي فقط، وأرجوا أن يكون وفقني الله في هذا الأمر، داعين الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته.

إلى روح أستاذي الفاضل الدكتور / خليفه حسين محب الجواد "شهيد العلم" رحمه الله



استاذ علم الحيوان الزراعي - قسم وقاية النبات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط

### الكاتب في سطور

الاسم: عبد العليم سعد سليمان دسوقي

الدرجة العلمية: استاذ مساعد علم الحيوان الزراعي بقسم وقاية النبات - كلية الزراعة -

جامعة سوهاج

التخصص العام: وقاية النبات

التخصص الدقيق: علم الحيوان الزراعي

[abdelalem2011@yahoo.com](mailto:abdelalem2011@yahoo.com)

### ثانيا: المؤهلات العلمية والتدرج العلمي:

1- بكالوريوس في العلوم الزراعية بقسم وقاية نبات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط 2002

2- ماجستير في العلوم الزراعية بقسم وقاية نبات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط 2007

3- دكتوراه في العلوم الزراعية بقسم وقاية نبات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط 2011

### ثالثا: التدرج الوظيفي:

1- معيد بقسم وقاية نبات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط (2002)

2- مدرس مساعد بقسم وقاية نبات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط (2007)

3- مدرس بقسم وقاية نبات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط (2011/12/28)



- 4- مدرس بقسم وقاية نبات - كلية الزراعة - جامعة سوهاج (2012/10/1)  
 5- استاذ علم الحيوان الزراعي المساعد بقسم وقاية نبات - كلية الزراعة - جامعة سوهاج 2017/1/23  
 رابعا: عضوفي الجمعيات الاتية:

- 1- عضو في الجمعية المصرية للحشرات.
  - 2- عضو في الجمعية المصرية الالمانية لعلم الحيوان.
  - 3- عضو في الجمعية العربية لوقاية النبات.
  - 4- Member of "Asian Council of Science Editors"
  - 5- عضو اللجنة الاستشارية للمؤتمرات الدولية بيونيدلبي – الهند
  - 6- عضوا في الجمعية الدولية للتنمية والاستدامة (ISDS)
  - 7- محكم دولي لأكثر من 100 مجلة دولية
- خامسا: الوظائف القيادية او الإشرافية
- 1- مدير فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج بداية من 7/11/2015 و حتى الان. و مدرب معتمد لدي الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة
  - 2- المشرف العلمي لمكافحة الآفات بجامعة سوهاج .
  - 3- مدير وحدة مكافحة الآفات بكلية الزراعة- جامعة سوهاج

#### سادسا: الجوائز

- حاصل علي جائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الزراعية والطب البيطري للعام الجامعي 2016/2015
- حاضر سيادته في العديد من الندوات وورش العمل والمؤتمرات على المستوى القومي والدولي
- ناقش سيادته العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه على المستوى القومي
- سيادته عضو تحرير ومحكم في العديد من المجالات العلمية الدولية
- لسيادته أكثر من 80 بحث دولي في مجال التخصص تم نشرها في مجلات دولية و عالمية ، منها ذات معامل تأثير عالي
- لسيادته العديد من المقالات و الكتب العلمية في العديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية – الكويت- قطر-السودان- سوريا – الاردن – فلسطين